

2015

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Viola cazorlensis



Jardín Botánico Torre Del Vinagre
P. N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Coto Ríos. Jaén



RED ANDALUZA
JARDINES BOTÁNICOS
EN ESPACIOS NATURALES



¿Dónde podemos encontrarla?

Muy extendida en Europa, donde llega en su límite septentrional hasta Islandia, y en Asia templada. En la Cuenca del Mediterráneo se hace rara. En Norteamérica es planta adventicia, también rara. En Andalucía se restringe a las provincias de Jaén (Sierras de Cazorla y Segura) y de Granada (Sierra Nevada y Sierras de Tejeda, Aljara, Huétor y Baza).

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Torre del Vinagre - Carretera del Tranco km. 48; 23478 Coto Ríos (Jaén) - Tfno: 953 71 30 29 - jbotanico.tvinagre.cmaot@juntadeandalucia.es

Hierba de dos hojas

Listera ovata (L.) R. Br.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJA												
FLOR												
FRUTO												

¿Dónde crece?

Margenes húmedas de bosques riparios, 700-1400 m (m-s). Es propia de suelos muy húmedos, al menos durante buena parte del año, con nivel del freático próximo a la superficie. Aunque descrita tanto de sustratos de origen calcáreo como granítico, en Andalucía se asienta preferentemente sobre los primeros.



¿Sabías qué?

Pertenece al grupo de plantas denominado como "bulbosas", caracterizadas por ser plantas herbáceas, perennes y monocotiledóneas, con un órgano subterráneo de reserva, lo que les permite adaptarse a condiciones ecológicas muy diversas. La época del año desfavorable la parte aérea de estas plantas desaparece, manteniéndose en reposo bajo tierra hasta que llega la estación de crecimiento favorable, donde se vuelven a desarrollar partiendo de las sustancias y yemas que alberga el órgano subterráneo de reserva.

En esta especie destaca el escaso número de poblaciones, su alto grado de aislamiento y su reducido tamaño poblacional. En algunos de los entornos forestales donde se ubica, existe una alta presión de herbivoría por ungulados. Por este motivo está incluida en la Lista Roja de Flora Vasculosa de Andalucía con la categoría DD (Datos insuficientes), siendo necesario un estudio continuo de su estado de conservación.

¿Cómo es?

Este geófito rizomatoso, posee un corto rizoma no estolonífero que emite raíces delgadas, fasciculadas. Está provista de un escapo con dos hojas subopuestas, de 3-12 x 2-9 cm, insertas en el tercio inferior del mismo, de suborbiculares a anchamente elípticas, amplexicaules, con nerviación prominente y sin manchas. En el escapo se pueden diferenciar dos zonas en función del punto de inserción de las hojas: la zona infra-foliar, de contorno cuadrangular con aristas comúnmente purpúreas, pigmentación blanquecina-verdosa y glabra, y la zona supra-foliar, de contorno cilíndrico, verde y muy densa en pelos glandulíferos. Las flores se reúnen en inflorescencias de tipo racimo de 4-25 cm, con pelos glandulíferos. Las flores son erecto-patentes, pedunculadas, sin espólon. Los sépalos son libres, ovales, obtusos, y junto con los pétalos laterales forman una galea, son verdes, a menudo con el margen amarillento o purpúreo. Los pétalos laterales son lineales, obtusos, de color verde amarillento o purpúreo. Labelo 4-14 x 2-4 mm lobulado, reflexo, verde amarillento; está dividido hasta la mitad en dos lóbulos oblongos paralelos, a veces divergente. Ovario glabro o con algunos pelos glandulíferos. El fruto es una capsula de hasta 7mm.

¿Quieres visitar el jardín?

Pincha aquí



Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO