

LACTARIUS

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA



Fundada en 1990 - . Decana en Andalucía

ÍNDICES - 1997

- [TAXONOMÍA](#)
- [ALFABÉTICO](#)
- [TAXONÓMICO](#)

ISSN: 1132-2365

ISSN-e: 2695-6810

**BIOLOGÍA VEGETAL
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
JAÉN (ESPAÑA)**

Boletines "LACTARIUS" desde 1992

RELACIÓN TAXONÓMICA de Setas de Otoño - 1997

Los nombres en negrita se corresponden con aquellas especies que figuraron en las distintas exposiciones organizadas por la Asociación Micológica "Lactarius" dentro de la provincia de Jaén y recolectados en la misma. El primer nombre corresponde al más aceptado por la comunidad internacional, el siguiente o los siguientes son sinónimos de este primero, siendo los más utilizados en determinadas zonas geográficas.

ESPECIE	TAXONOMIA
	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.
<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.
	Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Dill. ex Fr.
<i>Peziza celtica</i> (Bowd.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801
	Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Hypocreales</i> Familia: <i>Hypocreaceae</i> Género: <i>Hypomyces</i> (Fr.) Tul. & C.Tul.
<i>Hypomyces lateritius</i> (Fr.) Tul. & C.Tul. = <i>Byssonectria lateritia</i> (Fr.) Petch = <i>Hypocrea floccosa</i> Fr. = <i>Peckiella lateritia</i> (Fr.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Hypocreales</i> Familia: <i>Hypocreaceae</i> Género: <i>Hypomyces</i> (Fr.) Tul. & C.Tul.
	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
<i>Agaricus lanipes</i> (F.H.Møller & Jul.Schäff.) Hlaváček	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
<i>Agaricus sylvaticus</i> Schaeff. = <i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schuzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
	Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Coprinus comatus</i> (Müll.: Fr.) S. F. Gray. <i>var. radicosum</i> .	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797
	Género: <i>Cyathus</i> Haller, 1768
<i>Cyathus stercoreus</i> (Schwein.) De Toni = <i>Cyathia stercorea</i> (Schwein.) V.S.White = <i>Cyathodes lessueurii</i> (Tul. & C.Tul.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cyathus</i> Haller, 1768
	Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756
<i>Lepiota josserandii</i> Bon & Boiffard.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756
	Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini) Wasser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948
	Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729
<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729
	Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
<i>Amanita ceciliae</i> (Berk. & Broome) Bas.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
<i>Amanita lividopallescens</i> Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
	Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
<i>Cortinarius caesiocanescens</i> Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Cortinarius fulvo-ochraceus</i> Hry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
<i>Cortinarius prasinus</i> (Sch.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
<i>Cortinarius subargentatus</i> P. D. Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
	Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)
<i>Laccaria laccata</i> (Scop. ex Fr.) Berk. & Broome var. <i>moelleri</i> Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)
	Género: <i>Lichenomphalia</i> Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
<i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys = <i>Gerronema ericetorum</i> (Pers.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Lichenomphalia</i> Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
	Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836
<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836
	Género: <i>Megacollybia</i> Kotl. & Pouzar
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar = <i>Agaricus grammacephalus</i> Bull. ≡ <i>Agaricus platyphyllus</i> Pers. ≡ <i>Oudemansiella platyphylla</i> (Pers.) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Megacollybia</i> Kotl. & Pouzar
	Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvopluteus</i> Vizzini, Contu & Justo
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo = <i>Volvariella speciosa</i> var. <i>gloiocephala</i> (DC.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvopluteus</i> Vizzini, Contu & Justo
	Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.
	Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Coprinopsis lagopides</i> (P.Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo ≡ <i>Coprinus lagopides</i> P.Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.
	Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.
<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.
	Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Metr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
	Género: <i>Lepista</i> (Fr.) W.G.Sm.
<i>Lepista glaucocana</i> (Bres.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.
	Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897
<i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Sin g.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897
<i>Melanoleuca vulgaris</i> (Pat.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897
	Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude
<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude
	Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
<i>Boletus satanans</i> Lenz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
	Género: <i>Hortiboletus</i> Simonini, Vizzini & Gelardi

ESPECIE	TAXONOMIA
<p><i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi = <i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) M.M.Moser</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Hortiboletus</i> Simonini, Vizzini & Gelardi</p>
	<p>Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821</p>
<p><i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray = <i>Leccinum roseofractum</i> Watling</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821</p>
	<p>Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Clavulina</i> J.Schröt., 1888</p>
<p><i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J.Schröt. = <i>Clavaria cinerea</i> Bull. = <i>Ramaria cinerea</i> (Bull.) Quéf.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Clavulina</i> J.Schröt., 1888</p>
	<p>Género: <i>Hydnum</i> L.</p>
<p><i>Hydnum rufescens</i> Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Hydnum</i> L.</p>
	<p>Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Lentariaceae</i> Género: <i>Lentaria</i> Corner</p>
<p><i>Lentaria albovinacea</i> Pilát = <i>Clavaria albovinacea</i> Pilát, 1950</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Lentariaceae</i> Género: <i>Lentaria</i> Corner</p>
	<p>Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Schizopora</i> Velen.</p>
<p><i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.) Donk = <i>Agaricus versiporus</i> (Pers.) E.H.L.Krause = <i>Coriolus obliquus</i> (Schrad.) Pat. = <i>Daedalea mollis</i> Velen.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Schizopora</i> Velen.</p>
	<p>Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Clathrus</i> P.Micheli ex L.</p>
<p><i>Clathrus ruber</i> P.Micheli ex Pers. = <i>Clathrus ruber</i> Mich.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Clathrus</i> P.Micheli ex L.</p>
	<p>Género: <i>Colus</i> Cavalier & Séchier</p>

ESPECIE	TAXONOMIA
<p><i>Colus hirudinosus</i> Cavalier & Sechier = <i>Clathrus hirudinosus</i> (Cavalier & Séchier) Tul.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Colus</i> Cavalier & Séchier</p>
	<p>Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Picipes</i> Zmitr. & Kovalenko</p>
<p><i>Picipes rhizophilus</i> (Pat.) J.L.Zhou & B.K.Cui = <i>Polyporus rhizophilus</i> Pat.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Picipes</i> Zmitr. & Kovalenko</p>
	<p>Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.</p>
<p><i>Russula anthracina</i> var. <i>carnifolia</i>. Romag</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.</p>
<p><i>Russula aurata</i> (With.) ex Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.</p>
<p><i>Russula claroflava</i> Grove.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.</p>
<p><i>Russula densifolia</i> (secr.) Gill.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.</p>
	<p>Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.</p>
<p><i>Thelephora terrestris</i> Ehrh. = <i>Coniophora eradians</i> (Fr.) Fr. = <i>Hyphoderma terrestre</i> (Ehrh.) Wallr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.</p>
	<p>Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Calocera</i> (Fr.) Fr.</p>
<p><i>Tremella fimbriata</i> Pers ex Pers. = <i>Phaeotremella foliacea</i> (Pers.) Wedin, J.C.Zamora & Millanes = <i>Tremella foliacea</i> (Pers.ex S.f.Gray) Pers.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Phaeotremella</i> Rea</p>

ESPECIE	TAXONOMIA
	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Cribrariales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Lycogala</i> Adanson, 1763
<i>Lycogala flavofuscum</i> (Ehrenb.) Rostaf., 1873	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Cribrariales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Lycogala</i> Adanson, 1763

ÍNDICE ALFABÉTICO de Setas de Otoño – 1997

ESPECIE	TAXONOMIA
A	
001 <i>Agaricus lanipes</i> (F.H.Møller & Jul.Schäff.) Hlaváček	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
002 <i>Agaricus sylvaticus</i> Schaeff. = <i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schuzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
003 <i>Amanita ceciliae</i> (Berk. & Broome) Bas.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
004 <i>Amanita lividopallescens</i> Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
B	
005 <i>Boletus satanans</i> Lenz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
C	
006 <i>Clathrus ruber</i> P.Micheli ex Pers. = <i>Clathrus ruber</i> Mich.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Clathrus</i> P.Micheli ex L.
007 <i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J.Schröt. ≡ <i>Clavaria cinerea</i> Bull. = <i>Ramaria cinerea</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Clavulina</i> J.Schröt., 1888
008 <i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Metr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857

ESPECIE	TAXONOMIA
<p>009 <i>Colus hirudinosus</i> Cavalier & Sechier = <i>Clathrus hirudinosus</i> (Cavalier & Séchier) Tul.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Colus</i> Cavalier & Séchier</p>
<p>010 <i>Coprinopsis lagopides</i> (P.Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo ≡ <i>Coprinus lagopides</i> P.Karst.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.</p>
<p>011 <i>Coprinus comatus</i> (Müll.: Fr.) S. F. Gray. var. <i>radicosum</i>.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797</p>
<p>012 <i>Cortinarius caesiocanescens</i> Moser.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821</p>
<p>013 <i>Cortinarius fulvo-ochrascens</i> Hry.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821</p>
<p>014 <i>Cortinarius prasinus</i> (Sch.) Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821</p>
<p>015 <i>Cortinarius subargentatus</i> P. D. Orton.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821</p>
<p>016 <i>Cyathus stercoreus</i> (Schwein.) De Toni = <i>Cyathia stercorea</i> (Schwein.) V.S.White = <i>Cyathodes lessueurii</i> (Tul. & C.Tul.) Kuntze</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cyathus</i> Haller, 1768</p>
H	
<p>017 <i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.</p>
<p>018 <i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi = <i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) M.M.Moser</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Hortiboletus</i> Simonini, Vizzini & Gelardi</p>

ESPECIE	TAXONOMIA
<p>019 <i>Hydnum rufescens</i> Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Hydnum</i> L.</p>
<p><i>Hypomyces lateritius</i> (Fr.) Tul. & C.Tul. 020 = <i>Byssonectria lateritia</i> (Fr.) Petch = <i>Hypocrea floccosa</i> Fr. = <i>Peckiella lateritia</i> (Fr.) Maire</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Hypocreales</i> Familia: <i>Hypocreaceae</i> Género: <i>Hypomyces</i> (Fr.) Tul. & C.Tul.</p>
L	
<p>021 <i>Laccaria laccata</i> (Scop. ex Fr.) Berk. & Broome var. <i>moelleri</i> Singer.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)</p>
<p>022 <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray = <i>Leccinum roseofractum</i> Watling</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821</p>
<p>023 <i>Lentaria albovinacea</i> Pilát = <i>Clavaria albovinacea</i> Pilát, 1950</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Lentariaceae</i> Género: <i>Lentaria</i> Corner</p>
<p>024 <i>Lepiota josserandii</i> Bon & Boiffard.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756</p>
<p>025 <i>Lepista glaucocana</i> (Bres.) Sing.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.</p>
<p>026 <i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini) Wasser.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948</p>
<p>027 <i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys = <i>Gerronema ericetorum</i> (Pers.) Singer</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Lichenomphalia</i> Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys</p>
<p>028 <i>Lycogala flavofuscum</i> (Ehrenb.) Rostaf., 1873</p>	<p>Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Cribrariales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Lycogala</i> Adanson, 1763</p>

ESPECIE	TAXONOMIA
029 <i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729
M	
030 <i>Marasmius cohaerens</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836
031 <i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar = <i>Agaricus grammacephalus</i> Bull. ≡ <i>Agaricus platyphyllus</i> Pers. ≡ <i>Oudemansiella platyphylla</i> (Pers.) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Megacollybia</i> Kotl. & Pouzar
032 <i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Sin g.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897
033 <i>Melanoleuca vulgaris</i> (Pat.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897
P	
034 <i>Peziza celtica</i> (Bowd.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801
035 <i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.
036 <i>Picipes rhizophilus</i> (Pat.) J.L.Zhou & B.K.Cui = <i>Polyporus rhizophilus</i> Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Picipes</i> Zmitr. & Kovalenko
R	
037 <i>Russula anthracina</i> var. <i>carnifolia</i> . Romag	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
038 <i>Russula aurata</i> (With.) ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.

ESPECIE	TAXONOMIA
039 <i>Russula claroflava</i> Grove.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
040 <i>Russula densifolia</i> (secc.) Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.

S

041 <i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.) Donk = <i>Agaricus versiporus</i> (Pers.) E.H.L.Krause = <i>Coriolus obliquus</i> (Schrad.) Pat. = <i>Daedalea mollis</i> Velen.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Schizopora</i> Velen.
--	--

T

042 <i>Thelephora terrestris</i> Ehrh. = <i>Coniophora eradians</i> (Fr.) Fr. = <i>Hyphoderma terrestre</i> (Ehrh.) Wallr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.
043 <i>Tremella fimbriata</i> Pers ex Pers. = <i>Phaeotremella foliacea</i> (Pers.) Wedin, J.C.Zamora & Millanes = <i>Tremella foliacea</i> (Pers.ex S.f.Gray) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Phaeotremella</i> Rea
044 <i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude

V

045 <i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo = <i>Volvariella speciosa</i> var. <i>gloiocephala</i> (DC.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvopluteus</i> Vizzini, Contu & Justo
---	---

INDICE TAXONÓMICO de Setas de Otoño – 1997

ESPECIE

Reino: *Fungi*
 Filo: *Ascomycota*
 Clase: *Pezizomycetes*
 Orden: *Pezizales*
 Familia: *Helvellaceae*
 Género: *Helvella* L.

Helvella crispa (Scop.) Fr.

Familia: *Pezizaceae*
 Género: *Peziza* Dill. ex Fr.

Peziza celtica (Bowd.) Moser.

Clase: *Sordariomycetes*
 Orden: *Hypocreales*
 Familia: *Hypocreaceae*
 Género: *Hypomyces* (Fr.) Tul. & C.Tul.

Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C.Tul.
 ≡ *Byssonectria lateritia* (Fr.) Petch
 = *Hypocrea floccosa* Fr. ≡ *Peckiella lateritia* (Fr.) Maire

Reino: *Fungi*
 Filo: *Basidiomycota*
 Clase: *Agaricomycetes*
 Orden: *Agaricales*
 Familia: *Agaricaceae*
 Género: *Agaricus* Linnaeus, 1753

Agaricus lanipes (F.H.Møller & Jul.Schäff.) Hlaváček

Agaricus sylvaticus Schaeff.
 = *Agaricus haemorrhoidarius* Schuzer

Género: *Coprinus* Pers., 1797

Coprinus comatus (Müll.: Fr.) S. F. Gray. var.
radicosum.

Género: *Cyathus* Haller, 1768

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni
 = *Cyathia stercorea* (Schwein.) V.S.White
 = *Cyathodes lessueurii* (Tul. & C.Tul.) Kuntze

Género: *Lepiota* P.Browne, 1756

Lepiota josserandii Bon & Boiffard.

Género: *Leucoagaricus* Locq. ex Singer, 1948

Leucoagaricus leucothites (Vittadini) Wasser.

Género: *Lycoperdon* P.Micheli, 1729

Lycoperdon echinatum Pers.

Familia: *Amanitaceae*
 Género: *Amanita* Dill.ex Boehm., 1760

ESPECIE

Amanita ceciliae (Berk. & Broome) Bas.

Amanita lividopallescens Gill.

Familia: *Cortinariaceae*
 Género: *Cortinarius* (Pers.) Gray, 1821

Cortinarius caesiocanescens Moser.

Cortinarius fulvo-ochraceus Hry.

Cortinarius prasinus (Sch.) Fr.

Cortinarius subargentatus P. D. Orton.

Familia: *Hydnangiaceae*
 Género: *Laccaria* (Berkeley & Broome 1883)

Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Berk. & Broome var.
moelleri Singer.

Género: *Lichenomphalia* Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni,
 Moncalvo & Vilgalys
 = *Gerronema ericetorum* (Pers.) Singer

Familia: *Marasmiaceae*
 Género: *Marasmius* Fr., 1836

Marasmius cohaerens (Pers. ex Fr.) Fr.

Género: *Megacollybia* Kotl. & Pouzar

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar
 = *Agaricus grammacephalus* Bull.
 ≡ *Agaricus platyphyllus* Pers.
 ≡ *Oudemansiella platyphylla* (Pers.) M.M.Moser

Familia: *Pluteaceae*
 Género: *Volvopluteus* Vizzini, Contu & Justo

Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu &
 Justo
 = *Volvariella speciosa* var. *gloiocephala* (DC.) Singer

Familia: *Psathyrellaceae*
 Género: *Coprinellus* P.Karst.

Género: *Coprinopsis* P.Karst.

Coprinopsis lagopides (P.Karst.) Redhead, Vilgalys &
 Moncalvo
 ≡ *Coprinus lagopides* P.Karst.

Familia: *Strophariaceae*
 Género: *Pholiota* (Fr.) P.Kumm.

Pholiota astragalina (Fr.) Singer.

Familia: *Tricholomataceae*
 Género: *Clitocybe* (Fr.) Staude, 1857

Clitocybe lituus (Fr.) Metr.

ESPECIE

Género: *Lepista* (Fr.) W.G.Sm.

Lepista glaucocana (Bres.) Sing.

Género: *Melanoleuca* Pat., 1897

Melanoleuca rasilis (Fr.) Sin g.

Melanoleuca vulgaris (Pat.) Pat.

Género: *Tricholoma* (Fr.) Staude

Tricholoma stans (Fr.) Sacc.

Orden: *Boletales*
 Familia: *Boletaceae*
 Género: *Boletus* L.

Boletus satanans Lenz.

Género: *Hortiboletus* Simonini, Vizzini & Gelardi

Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi
 = *Xerocomus rubellus* (Krombh.) M.M.Moser

Género: *Leccinum* Gray, 1821

Leccinum scabrum (Bull.) Gray
 = *Leccinum roseofractum* Watling

Orden: *Cantharellales*
 Familia: *Cantharellaceae*
 Género: *Clavulina* J.Schröt., 1888

Clavulina cinerea (Bull.) J.Schröt.
 = *Clavaria cinerea* Bull.
 = *Ramaria cinerea* (Bull.) Quéf.

Género: *Hydnum* L.

Hydnum rufescens Fr.

Orden: *Gomphales*
 Familia: *Lentariaceae*
 Género: *Lentaria* Corner

Lentaria albovinacea Pilát
 = *Clavaria albovinacea* Pilát, 1950

Orden: *Hymenochaetales*
 Familia: *Schizoporaceae*
 Género: *Schizopora* Velen.

Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk
 = *Agaricus versiporus* (Pers.) E.H.L.Krause
 = *Coriolus obliquus* (Schrad.) Pat.
 = *Daedalea mollis* Velen.

Orden: *Phallales*
 Familia: *Phallaceae*
 Género: *Clathrus* P.Micheli ex L.

ESPECIE

Clathrus ruber P.Micheli ex Pers.
 = *Clathrus ruber* Mich.

Género: *Colus* Cavalier & Séchier

Colus hirudinosus Cavalier & Sechier
 = *Clathrus hirudinosus* (Cavalier & Séchier) Tul.

Orden: *Polyporales*
 Familia: *Polyporaceae*
 Género: *Picipes* Zmitr. & Kovalenko

Picipes rhizophilus (Pat.) J.L.Zhou & B.K.Cui
 = *Polyporus rhizophilus* Pat.

Familia: *Russulaceae*
 Género: *Russula* Pers.

Russula anthracina var. *carnifolia*. Romag

Russula aurata (With.) ex Fr.

Russula claroflava Grove.

Russula densifolia (secc.) Gill.

Orden: *Thelephorales*
 Familia: *Thelephoraceae*
 Género: *Thelephora* Ehrh. ex Willd.

Thelephora terrestris Ehrh.
 = *Coniophora eradians* (Fr.) Fr.
 = *Hyphoderma terrestre* (Ehrh.) Wallr.

Clase: *Dacrymycetes*
 Orden: *Dacrymycetales*
 Familia: *Dacrymycetaceae*
 Género: *Calocera* (Fr.) Fr.

Tremella fimbriata Pers ex Pers.
 = *Phaeotremella foliacea* (Pers.) Wedin, J.C.Zamora & Millanes
 = *Tremella foliacea* (Pers.ex S.f.Gray) Pers.

Reino: *Protozoa*
 Filo: *Mycetozoa*
 Clase: *Myxomycetes*
 Orden: *Cribariales*
 Familia: *Tubiferaceae*
 Género: *Lycogala* Adanson, 1763

Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf., 1873