

LACTARIUS

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA



Fundada en 1990 - . Decana en Andalucía

ÍNDICES - 1999

- [TAXONOMÍA](#)
- [ALFABÉTICO](#)
- [TAXONÓMICO](#)

ISSN: 1132-2365

ISSN-e: 2695-6810

**BIOLOGÍA VEGETAL
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
JAÉN (ESPAÑA)**

Boletines "LACTARIUS" desde 1992

RELACIÓN TAXONÓMICA de Setas de Otoño - 1999

Los nombres en negrita se corresponden con aquellas especies que figuraron en las distintas exposiciones organizadas por la Asociación Micológica "Lactarius" dentro de la provincia de Jaén y recolectados en la misma. El primer nombre corresponde al más aceptado por la comunidad internacional, el siguiente o los siguientes son sinónimos de este primero, siendo los más utilizados en determinadas zonas geográficas.

ESPECIE	TAXONOMIA
	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. Ex Pers.
<i>Morchella conica</i> (Pers.) Boudier	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. Ex Pers.
	Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Cheilymenia</i> Boud., 1885
<i>Cheilymenia fimicola</i> (Bagl.) Dennis = <i>Auriscalpium fimicola</i> (Bagl.) Kuntze = <i>Cheilymenia coprinaria</i> subsp. <i>minima</i> (Grove) Ramsb., 1913	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Cheilymenia</i> Boud., 1885
	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
<i>Agaricus semotus</i> (Fr.) Ricken	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
<i>Agaricus xanthoderma</i> Genev. for. <i>griseus</i> (Pearson) Bon & Cappelli.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
	Género: <i>Calvatia</i> Fr.
<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd = <i>Langermannia gigantea</i> (Batsch) Rostk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.

ESPECIE	TAXONOMIA
	Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729
<i>Lycoperdon foetidum</i> Bonorden.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729
	Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
<i>Amanita torrendii</i> Justo = <i>Torrendia pulchella</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
	Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
<i>Cortinarius caerulescens</i> (Schaeff.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
<i>Cortinarius cedretorum</i> Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
	Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Clitocella</i> Kluting, T.J.Baroni & Bergemann
<i>Entoloma serrulatum</i> (Pers.: Fr.) Hesler.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871
	Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836
<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836
	Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863
<i>Inocybe hirtella</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863
<i>Inocybe phaeocomis</i> (Pers.) Kuyper.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. = <i>Inocybe pudica</i> Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863
	Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.
<i>Lyophyllum leucophaetum</i> (Karst.) Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.
	Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Crinipellis</i> Pat., 1889
<i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schw.: Fr.) Kuyp. = <i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Crinipellis</i> Pat., 1889
	Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel
<i>Gymnopus hybridus</i> (Kühner & Romagn.) Antonín & Noordel. = <i>Collybia hybrida</i> (Kühner & Romagn.) Svrček & Kubička	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel
	Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Hohenbuehelia</i> Schulzer, 1866
<i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> (Fr.) Singer = <i>Acanthocystis atrocaeruleus</i> (Fr.) Konrad & Maubl. = <i>Acanthocystis atrocoerulea</i> (Fr.) Konrad & Maubl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Hohenbuehelia</i> Schulzer, 1866
	Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvariella</i> Speg., 1898
<i>Volvariella volvacea</i> (Bull. ex Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvariella</i> Speg., 1898
	Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.
<i>Coprinopsis erythrocephala</i> (Lév.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus erythrocephalus</i> (Lév.) Fr	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.
	Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872
<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872

ESPECIE	TAXONOMIA
	Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
<i>Clitocybe fragrans</i> (Con.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch) Quéf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
<i>Clitocybe rhizophora</i> (Vel.) Joss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
	Género: <i>Lepista</i> (Fr.) W.G.Sm.
<i>Lepista nuda</i> var. <i>tridentina</i> (Bull. ex Fr.) Cooke.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.
<i>Lepista oreadiformis</i> Vel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.
	Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier
<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Cost. & Dufour) Bours.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier
	Género: <i>Myxomphalia</i> Hora
<i>Myxomphalia maura</i> (Fr.) Hora ≡ <i>Agaricus maurus</i> Fr. = <i>Fayodia maura</i> (Fr.) Singer = <i>Gymnopus maurus</i> (Fr.) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Myxomphalia</i> Hora
	Género: <i>Ripartites</i> P.Karst.

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Ripartites metrodii</i> Huijism.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Ripartites</i> P.Karst.
	Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidia</i>
<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.) Fr. = <i>Auricularia truncata</i> (Fr.) Fuckel = <i>Exidia glandulosa</i> f. <i>lobata</i> Neuhoff	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidia</i>
	Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
<i>Boletus erytrophus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
<i>Boletus luridus</i> Schaeff. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
	Familia: <i>Coniophoraceae</i> Género: <i>Coniophora</i> DC.
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Coniophora arida</i> f. <i>hyphis-incrustatis</i> S.Lundell & J.A.Åberg	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Coniophoraceae</i> Género: <i>Coniophora</i> DC.
	Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Onnia</i> P.Karst.
<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Boletus tomentosus</i> (Fr.) Spreng. ≡ <i>Coltricia tomentosa</i> (Fr.) Murrill ≡ <i>Inonotus tomentosus</i> (Fr.) Teng	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Onnia</i> P.Karst.
	Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Fuscopostia</i>
<i>Fuscopostia fragilis</i> (Fr.) B.K.Cui, L.L.Shen & Y.C.Dai = <i>Postia fragilis</i> (Fr.) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Fuscopostia</i>
	Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Albatrellaceae</i> Género: <i>Albatrellus</i> Gray

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schw. ex Fr.) Kotl. & Pouz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Albatrellaceae</i> Género: <i>Albatrellus</i> Gray
	Familia: Russulaceae Género: Lactarius Pers., 1797
<i>Lactarius hepaticus</i> Plowr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797
	Género: Russula Pers.
<i>Russula fusconigra</i> Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
<i>Russula grisea</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
<i>Russula integra</i> (L.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
<i>Russula mustelina</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
<i>Russula violeipes</i> Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff. ex Secr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
<i>Russula illota</i> Romagnesi	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,
	Orden: Thelephorales Familia: Bankeraceae Género: Sarcodon Quélet ex P.Karst.

ESPECIE	TAXONOMIA
<p><i>Sarcodon laevigatum</i> (Fr. ex Sow) Quél.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quél.ex P.Karst.</p>
	<p>Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.</p>
<p><i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers. = <i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.</p>

ÍNDICE ALFABÉTICO de Setas de Otoño – 1999

ESPECIE	TAXONOMIA
A	
001 <i>Agaricus semotus</i> (Fr.) Ricken	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
002 <i>Agaricus xanthoderma</i> Genev. <i>for. griseus</i> (Pearson) Bon & Cappelli.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
003 <i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schw. ex Fr.) Kotl. & Pouz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Albatrellaceae</i> Género: <i>Albatrellus</i> Gray
004 <i>Amanita torrendii</i> Justo = <i>Torrendia pulchella</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
B	
005 <i>Boletus erytrophus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
006 <i>Boletus luridus</i> Schaeff. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.
C	
007 <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd = <i>Langermannia gigantea</i> (Batsch) Rostk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.
008 <i>Cheilymenia fimicola</i> (Bagl.) Dennis = <i>Auriscalpium fimicola</i> (Bagl.) Kuntze = <i>Cheilymenia coprinaria</i> subsp. <i>minima</i> (Grove) Ramsb., 1913	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Cheilymenia</i> Boud., 1885

ESPECIE	TAXONOMIA
009 <i>Clitocybe fragrans</i> (Con.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
010 <i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
011 <i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
012 <i>Clitocybe rhizophora</i> (Vel.) Joss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
013 <i>Clitocybe sinopica</i> (Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
014 <i>Coniophora arida</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Coniophora arida</i> f. <i>hyphis-incrustatis</i> S.Lundell & J.A.Åberg	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Coniophoraceae</i> Género: <i>Coniophora</i> DC.
015 <i>Coprinopsis erythrocephala</i> (Lév.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus erythrocephalus</i> (Lév.) Fr	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.
016 <i>Cortinarius caerulescens</i> (Schaeff.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
017 <i>Cortinarius cedretorum</i> Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821
018 <i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schw.: Fr.) Kuyp. = <i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Crinipellis</i> Pat., 1889

E

ESPECIE	TAXONOMIA
<p>019 <i>Entoloma serrulatum</i> (Pers.: Fr.) Hesler.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871</p>
<p>020 <i>Exidia glandulosa</i> (Bull.) Fr. = <i>Auricularia truncata</i> (Fr.) Fuckel = <i>Exidia glandulosa</i> f. <i>lobata</i> Neuhoff</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidia</i></p>
F	
<p>021 <i>Fuscopostia fragilis</i> (Fr.) B.K.Cui, L.L.Shen & Y.C.Dai = <i>Postia fragilis</i> (Fr.) Jülich</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Fuscopostia</i></p>
G	
<p>022 <i>Gymnopus hybridus</i> (Kühner & Romagn.) Antonín & Noordel. = <i>Collybia hybrida</i> (Kühner & Romagn.) Svrček & Kubička</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel</p>
H	
<p>023 <i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> (Fr.) Singer = <i>Acanthocystis atrocaeruleus</i> (Fr.) Konrad & Maubl. = <i>Acanthocystis atrocoerulea</i> (Fr.) Konrad & Maubl.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Hohenbuehelia</i> Schulzer, 1866</p>
<p>024 <i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836</p>
I	
<p>025 <i>Inocybe hirtella</i> Bres.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863</p>
<p>026 <i>Inocybe phaeocomis</i> (Pers.) Kuyper.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863</p>
<p>027 <i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. = <i>Inocybe pudica</i> Kühn.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863</p>
J	

ESPECIE	TAXONOMIA
L	
028 <i>Lactarius hepaticus</i> Plowr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797
029 <i>Lepista nuda</i> var. <i>tridentina</i> (Bull. ex Fr.) Cooke.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.
030 <i>Lepista oreadiformis</i> Vel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.
031 <i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Cost. & Dufour) Bours.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier
032 <i>Lycoperdon foetidum</i> Bonorden.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729
033 <i>Lyophyllum leucophaetum</i> (Karst.) Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.
M	
034 <i>Morchella conica</i> (Pers.) Boudier	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. Ex Pers.
035 <i>Myxomphalia maura</i> (Fr.) Hora ≡ <i>Agaricus maurus</i> Fr. = <i>Fayodia maura</i> (Fr.) Singer = <i>Gymnopus maurus</i> (Fr.) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Myxomphalia</i> Hora
O	
036 <i>Onnia tomentosa</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Boletus tomentosus</i> (Fr.) Spreng. ≡ <i>Coltricia tomentosa</i> (Fr.) Murrill ≡ <i>Inonotus tomentosus</i> (Fr.) Teng	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetales</i> Género: <i>Onnia</i> P.Karst.
P	

ESPECIE	TAXONOMIA
037 <i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872
R	
038 <i>Ripartites metrodii</i> Huijism.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Ripartites</i> P.Karst.
039 <i>Russula fusconigra</i> Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
040 <i>Russula grisea</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
041 <i>Russula illota</i> Romagnesi	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,
042 <i>Russula integra</i> (L.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
043 <i>Russula mustelina</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
044 <i>Russula violeipes</i> Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
045 <i>Russula xerampelina</i> (Schaeff. ex Secr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.
S	
046 <i>Sarcodon laevigatum</i> (Fr. ex Sow) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quél.ex P.Karst.

ESPECIE	TAXONOMIA
T	
<p>047 <i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers. = <i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.</p>
V	
<p>048 <i>Volvariella volvacea</i> (Bull. ex Fr.) Sing.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvariella</i> Speg., 1898</p>

INDICE TAXONÓMICO de Setas de Otoño – 1999

ESPECIE

Reino: *Fungi*
 Filo: *Ascomycota*
 Clase: *Pezizomycetes*
 Orden: *Pezizales*
 Familia: *Morchellaceae*
 Género: *Morchella* Dill. Ex Pers.

Morchella conica (Pers.) Boudier

Familia: *Pyrenomataceae*
 Género: *Cheilymenia* Boud., 1885

Cheilymenia fimicola (Bagl.) Dennis
 = *Auriscalpium fimicola* (Bagl.) Kuntze
 = *Cheilymenia coprinaria* subsp. *minima* (Grove)
 Ramsb., 1913

Reino: *Fungi*
 Filo: *Basidiomycota*
 Clase: *Agaricomycetes*
 Orden: *Agaricales*
 Familia: *Agaricaceae*
 Género: *Agaricus* Linnaeus, 1753

Agaricus semotus (Fr.) Ricken

Agaricus xanthoderma Genev. *for. griseus* (Pearson)
 Bon & Cappelli.

Género: *Calvatia* Fr.

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
 = *Langermannia gigantea* (Batsch) Rostk.

Género: *Lycoperdon* P.Micheli, 1729

Lycoperdon foetidum Bonorden.

Familia: *Amanitaceae*
 Género: *Amanita* Dill.ex Boehm., 1760

Amanita torrendii Justo
 = *Torrendia pulchella* Bres.

Familia: *Cortinariaceae*
 Género: *Cortinarius* (Pers.) Gray, 1821

Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr.

Cortinarius cedretorum Maire

Familia: *Entolomataceae*
 Género: *Clitocella* Kluting, T.J.Baroni & Bergemann

Entoloma serrulatum (Pers.: Fr.) Hesler.

Familia: *Hydnangiaceae*
 Género: *Hygrophorus* Fr., 1836

ESPECIE

Hygrophorus latitabundus Britzelm.

Familia: *Inocybaceae*
 Género: *Inocybe* (Fr.) Fr., 1863

Inocybe hirtella Bres.

Inocybe phaeocomis (Pers.) Kuyper.

Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc. = *Inocybe pudica* Kühn.

Familia: *Lyophyllaceae*
 Género: *Lyophyllum* P.Karst.

Lyophyllum leucophaetum (Karst.) Karst.

Familia: *Marasmiaceae*
 Género: *Crinipellis* Pat., 1889

Crinipellis scabella (Alb. & Schw.: Fr.) Kuyp.
 = *Crinipellis stipitaria* (Fr.) Pat.

Familia: *Omphalotaceae*
 Género: *Gymnopus* (Pers.) Roussel

Gymnopus hybridus (Kühner & Romagn.) Antonín & Noordel.
 = *Collybia hybrida* (Kühner & Romagn.) Svrček & Kubička

Familia: *Pleurotaceae*
 Género: *Hohenbuehelia* Schulzer, 1866

Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.) Singer
 = *Acanthocystis atrocaeruleus* (Fr.) Konrad & Maubl.
 = *Acanthocystis atrocoerulea* (Fr.) Konrad & Maubl.

Familia: *Pluteaceae*
 Género: *Volvariella* Speg., 1898

Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing.

Familia: *Psathyrellaceae*
 Género: *Coprinopsis* P.Karst.

Coprinopsis erythrocephala (Lév.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo
 = *Coprinus erythrocephalus* (Lév.) Fr

Género: *Psathyrella* (Fr.) Quél., 1872

Psathyrella lacrymabunda (Bull.) Moser.

Familia: *Tricholomataceae*
 Género: *Clitocybe* (Fr.) Staude, 1857

Clitocybe fragrans (Con.) P. Kumm.

Clitocybe obsoleta (Batsch) Quél.

ESPECIE

Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper.

Clitocybe rhizophora (Vel.) Joss.

Clitocybe sinopica (Fr.) Kumm.

Género: *Lepista* (Fr.) W.G.Sm.

Lepista nuda var. *tridentina* (Bull. ex Fr.) Cooke.

Lepista oreadiformis Vel.

Género: *Leucopaxillus* Boursier

Leucopaxillus paradoxus (Cost. & Dufour) Bours.

Género: *Myxomphalia* Hora

Myxomphalia maura (Fr.) Hora

= *Agaricus maurus* Fr.

= *Fayodia maura* (Fr.) Singer

= *Gymnopus maurus* (Fr.) Murrill

Género: *Ripartites* P.Karst.

Ripartites metodii Huijism.

Familia: *Auriculariaceae*

Género: *Exidia*

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

= *Auricularia truncata* (Fr.) Fuckel

= *Exidia glandulosa* f. *lobata* Neuhoff

Orden: *Boletales*

Familia: *Boletaceae*

Género: *Boletus* L.

Boletus erytrophus Fr.

Boletus luridus Schaeff. ex Fr.

Familia: *Coniophoraceae*

Género: *Coniophora* DC.

Coniophora arida (Fr.) P.Karst.

= *Coniophora arida* f. *hyphis-incrustatis* S.Lundell & J.A.Åberg

Orden: *Hymenochaetales*

Familia: *Hymenochaetaceae*

Género: *Onnia* P.Karst.

ESPECIE

Onnia tomentosa (Fr.) P.Karst.

= *Boletus tomentosus* (Fr.) Spreng.

= *Coltricia tomentosa* (Fr.) Murrill

= *Inonotus tomentosus* (Fr.) Teng

Orden: *Polyporales*

Familia: *Fomitopsidaceae*

Género: *Fuscopostia*

Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K.Cui, L.L.Shen & Y.C.Dai

= *Postia fragilis* (Fr.) Jülich

Orden: *Russulales*

Familia: *Albatrellaceae*

Género: *Albatrellus* Gray

Albatrellus confluens (Alb. & Schw. ex Fr.) Kotl. & Pouz.

Familia: *Russulaceae*

Género: *Lactarius* Pers., 1797

Lactarius hepaticus Plowr.

Género: *Russula* Pers.

Russula fusconigra Moser.

Russula grisea (Pers.) Fr.

Russula integra (L.) Fr.

Russula mustelina Fr.

Russula violeipes Quélet.

Russula xerampelina (Schaeff. ex Secr.) Fr.

Russula illota Romagnesi

Orden: *Thelephorales*

Familia: *Bankeraceae*

Género: *Sarcodon* Quélet ex P.Karst.

Sarcodon laevigatum (Fr. ex Sow) Quélet.

Familia: *Thelephoraceae*

Género: *Thelephora* Ehrh. ex Willd.

Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers.

= *Thelephora caryophyllea* (Schaeff.) Fr.