

# LACTARIUS

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA



Fundada en 1990 - . Decana en Andalucía

## EXPOSICIÓN JAÉN -2017

### ÍNDICES

- [TAXONOMÍA](#)
- [ALFABÉTICO](#)
- [TAXONÓMICO](#)

ISSN: 1132-2365

ISSN-e: 2695-6810

BIOLOGÍA VEGETAL  
FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES  
JAÉN (ESPAÑA)

## Boletines "LACTARIUS" desde 1992

### Relación taxonómica de Setas de Otoño - 2017

Los nombres en negrita se corresponden con aquellas especies que figuraron en las distintas exposiciones organizadas por la Asociación Micológica "Lactarius" dentro de la provincia de Jaén y recolectados en la misma.

El primer nombre corresponde al más aceptado por la comunidad internacional, el siguiente o los siguientes son sinónimos de este primero, siendo los más utilizados en determinadas zonas geográficas.

ESPECIE	TAXONOMIA
	<b>Reino: Fungi</b> <b>Filo: Basidiomycota</b> <b>Clase: Agaricomycetes</b> <b>Orden: Agaricales</b> <b>Familia: Agaricaceae</b> <b>Género: Agaricus Linnaeus, 1753</b>
<b><i>Agaricus bessadalanus</i></b> Bohus = <i>Agaricus bresadolianus</i> Bohus	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
<b><i>Agaricus xanthoderma</i></b> Genev.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
	Género: <b><i>Battarrea</i></b> Pers.
<b><i>Battarrea phalloides</i></b> (Dicks.) Pers. = <b><i>Battarraea stevenii</i></b> (Liboschitz.) Fries.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Battarrea</i> Pers.
	Género: <b><i>Coprinus</i></b> Pers., 1797
<b><i>Coprinus comatus</i></b> (Müell.: Fr.) Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797
	Género: <b><i>Lepiota</i></b> P.Browne, 1756
<b><i>Lepiota castanea</i></b> Quél. S. Canduso & Lanzoni.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756
<b><i>Lepiota laevigata</i></b> Lange. = <i>Lepiota oreadiformis</i> Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Lepiota oreadiformis</i> Velen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756
	Género: <b>Macrolepiota</b> Singer
<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Sing. = <i>Agaricus annulatus</i> Lightf. = <i>Agaricus antiquatus</i> Batsch = <i>Agaricus colubrinus</i> Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer
	Familia: <b>Amanitaceae</b> Género: <b>Amanita</b> Dill.ex Boehm., 1760
<i>Amanita muscaria</i> (Linneo ex Fr.) Hooker (1821) = <i>Agaricus puella</i> Bastch. = <i>Amanita muscaria</i> var. <i>aureola</i> (Kalch.) Quel.(1873) = <i>Agaricus pseudoauranticus</i> Bulliard.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
<i>Amanita vaginata</i> Fr.: Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
	Familia: <b>Hymenogastraceae</b> Género: <b>Galerina</b> Earle, 1909
<i>Galerina badipes</i> (Pers.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909
	Género: <b>Gymnopilus</b> P.Karst., 1879
<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Fr.) A.H. Smith = <i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D. Orton sensu Quadraccia	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Gymnopilus</i> P.Karst., 1879
	Familia: <b>Inocybaceae</b> Género: <b>Crepidotus</b> (Fr.) Staude
<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude
	Familia: <b>Omphalotaceae</b> Género: <b>Gymnopus</b> (Pers.) Roussel
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill = <i>Collybia dryophila</i> (Bull.) P.Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel
	Familia: <b>Pleurotaceae</b> Género: <b>Pleurotus</b> (Fr.) P.Kumm., 1871

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P.Kumm. = <i>Agaricus convivarum</i> Dunal = <i>Agaricus fuliginus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871
	Familia: <i>Schizophyllaceae</i> Género: <i>Schizophyllum</i> Fr., 1815
<i>Schizophyllum commune</i> Fr. = <i>Agaricus alneus</i> L. = <i>Agaricus alneus</i> Reichard = <i>Agaricus multifidus</i> Batsch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Schizophyllaceae</i> Género: <i>Schizophyllum</i> Fr., 1815
	Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889
<i>Agrocybe cylindrica</i> (D.C.: Fr.) Maire = <i>Agrocybe aegerita</i> (Brig.) Fayod	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889
	Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
<i>Clitocybe costata</i> (Kühner & Romagn.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
	Género: <i>Lepista</i> (Fr.) W.G.Sm.
<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer = <i>Rhodopaxillus sordidus</i> (Schum.: Fr.) Mre.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.
	Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude
<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers. ex Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude
<i>Tricholoma batschii</i> Gulden = <i>Tricholoma subnnulatum</i> (Batsch) Bres. = <i>Tricholoma fracticum</i> (Britz.) Kreisel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude
<i>Tricholoma striatum</i> Sacc. = <i>Tricholoma albobrunneum</i> P. P .	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude
	Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Auricularia</i> Bull., 1780

ESPECIE	TAXONOMIA
<p><i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél. = <i>Hirneola auricula-judae</i> subsp. lactea (Quél.) D.A.Reid, 1970</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Auricularia</i> Bull., 1780</p>
	<p>Orden: <b><i>Boletales</i></b> Familia: <b><i>Boletaceae</i></b> Género: <b><i>Leccinum</i></b> Gray, 1821</p>
<p><i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer ex Kalchbr.) Singer = <i>Boletus duriusculus</i> Schulz. = <i>Boletus nigrescens</i> Heinr.Huber, 1935</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821</p>
	<p>Familia: <b><i>Diplocystidiaceae</i></b> Género: <b><i>Astraeus</i></b> Morgan</p>
<p><i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan = <i>Astraeus hygrometricus f.decaryi</i> (Pat.) Pat.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Diplocystidiaceae</i> Género: <i>Astraeus</i> Morgan</p>
	<p>Familia: <b><i>Paxillaceae</i></b> Género: <b><i>Paxillus</i></b> Fr.</p>
<p><i>Paxillus involutus</i> (Batsch ex Fr.) Fr.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Paxillus</i> Fr.</p>
	<p>Familia: <b><i>Sclerodermataceae</i></b> Género: <b><i>Pisolithus</i></b> Alb.&amp; Schwein.</p>
<p><i>Pisolithus arhizus</i> (Scop. ex Pers.) Rauschert</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Pisolithus</i> Alb.&amp; Schwein.</p>
	<p>Familia: <b><i>Suillaceae</i></b> Género: <b><i>Suillus</i></b> Gray</p>
<p><i>Suillus mediterraneensis</i> (Jacquet. &amp; Blum) Redeuilh.</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray</p>
	<p>Orden: <b><i>Hymenochaetales</i></b> Familia: <b><i>Hymenochaetaceae</i></b> Género: <b><i>Fomitiporia</i></b> Murrill</p>
<p><i>Fomitiporia robusta</i> (P.Karst.) Fiasson &amp; Niemelä ≡ <i>Phellinus robustus</i> (P.Karst.) Bourdot &amp; Galzin</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fomitiporia</i> Murrill</p>
	<p>Género: <b><i>Fuscoporia</i></b> Murrill</p>

ESPECIE	TAXONOMIA
<i>Phellinus torulosus</i> (Pers.: Pers.) Boud.& Galz. = <i>Fuscoporia torulosa</i> (Pers.) T.Wagner & M.Fisch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fuscoporia</i> Murrill
	Género: <b>Inocutis</b> Fiasson & Niemelä
<i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä = <b>Inonotus tamaricis</b> (Pat.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Inocutis</i> Fiasson & Niemelä
	Género: <b>Inonotus</b> P.Karst., 1879
<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P.Karst. = <i>Agaricus velutinus</i> (With.) E.H.L.Krause, 1933 = <i>Boletus hirsutus</i> Scop. = <i>Boletus hirtus</i> Vent.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Inonotus</i> P.Karst., 1879
	Orden: <b>Polyporales</b> Familia: <b>Fomitopsidaceae</b> Género: <b>Laetiporus</b> Murrill, 1904
<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill = <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Bondartsev & Singer = <i>Lamnaoa fragrans</i> (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Laetiporus</i> Murrill, 1904
	Familia: <b>Ganodermataceae</b> Género: <b>Ganoderma</b> P.Karst., 1881
<i>Ganoderma lucidum</i> (Leys.: Fr.) Karst. = <i>Agarico-igniarium trulla</i> Paulet = <i>Agaricus lignosus</i> Lam. = <i>Boletus crustatus</i> J.J.Planer = <i>Boletus flabelliformis</i> Leys.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Ganodermataceae</i> Género: <i>Ganoderma</i> P.Karst., 1881
	Familia: <b>Meruliaceae</b> Género: <b>Phlebia</b> Fr.
<i>Merulius tremellosus</i> Schrad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.
	Familia: <b>Polyporaceae</b> Género: <b>Coriolopsis</b> Murrill, 1905
<i>Coriolopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden = <i>Boletus favus</i> Bull. = <i>Cerrena gallica</i> (Fr.) Zmitr = <i>Funalia extenuata</i> (Durieu & Mont.) Domański	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Coriolopsis</i> Murrill, 1905
	Género: <b>Fomes</b> (Fr.) Fr., 1849
<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J.J.Kickx	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Fomes</i> (Fr.) Fr., 1849

ESPECIE	TAXONOMIA
	Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Auriscalpiaceae</i> Género: <i>Lentinellus</i> P.Karst.
<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pegler. = <i>Lentinellus americanus</i> (Peck) Singer = <i>Lentinellus omphalodes</i> Pearson & Dennis	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Auriscalpiaceae</i> Género: <i>Lentinellus</i> P.Karst.
	Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797
<i>Lactarius controversus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797

ÍNDICE ALFABÉTICO de Setas de Otoño - 2017

ESPECIE	TAXONOMIA
<b>A</b>	
01 <i>Agaricus bessadalanus</i> Bohus = <i>Agaricus bresadolianus</i> Bohus	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
02 <i>Agaricus xanthoderma</i> Genev.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753
03 <i>Agrocybe cylindrica</i> (D.C.: Fr.) Maire = <i>Agrocybe aegerita</i> (Brig.) Fayod	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889
04 <i>Amanita muscaria</i> (Linneo ex Fr.) Hooker (1821) = <i>Agaricus puella</i> Bastch. = <i>Amanita muscaria</i> var. <i>aureola</i> (Kalch.) Quel.(1873) = <i>Agaricus pseudoauranticus</i> Bulliard.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
05 <i>Amanita vaginata</i> Fr.: Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex Boehm., 1760
06 <i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan = <i>Astraeus hygrometricus</i> f. <i>decaryi</i> (Pat.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Diplocystidiaceae</i> Género: <i>Astraeus</i> Morgan
07 <i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quéf. = <i>Hirneola auricula-judae</i> subsp. <i>lactea</i> (Quéf.) D.A.Reid, 1970	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Auricularia</i> Bull., 1780
<b>B</b>	
08 <i>Battarrea phalloides</i> (Dicks.) Pers. = <i>Battarraea stevenii</i> (Liboschitz.) Fries.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Battarrea</i> Pers.
<b>C</b>	



ESPECIE	TAXONOMIA
09 <i>Clitocybe costata</i> (Kühner & Romagn.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857
10 <i>Coprinus comatus</i> (Müell.: Fr.) Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797
11 <i>Corioloopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden = <i>Boletus favus</i> Bull. = <i>Cerrena gallica</i> (Fr.) Zmitr = <i>Funalia extenuata</i> (Durieu & Mont.) Domański	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Corioloopsis</i> Murrill, 1905
12 <i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude
<b>F</b>	
13 <i>Fomes fomentarius</i> (L.) J.J.Kickx	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Fomes</i> (Fr.) Fr., 1849
14 <i>Fomitiporia robusta</i> (P.Karst.) Fiasson & Niemelä ≡ <i>Phellinus robustus</i> (P.Karst.) Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fomitiporia</i> Murrill
<b>G</b>	
15 <i>Galerina badipes</i> (Pers.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909
16 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leys.: Fr.) Karst. = <i>Agarico-igniarius trulla</i> Paulet = <i>Agaricus lignosus</i> Lam. = <i>Boletus crustatus</i> J.J.Planer = <i>Boletus flabelliformis</i> Leys.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Ganodermataceae</i> Género: <i>Ganoderma</i> P.Karst., 1881
17 <i>Gymnopilus spectabilis</i> (Fr.) A.H. Smith = <i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P.D. Orton sensu Quadraccia	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Gymnopilus</i> P.Karst., 1879
18 <i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill = <i>Collybia dryophila</i> (Bull.) P.Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel

ESPECIE	TAXONOMIA
<b>I</b>	
19 <i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä = <i>Inonotus tamaricis</i> (Pat.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Inocutis</i> Fiasson & Niemelä
20 <i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P.Karst. = <i>Agaricus velutinus</i> (With.) E.H.L.Krause, 1933 = <i>Boletus hirsutus</i> Scop. = <i>Boletus hirtus</i> Vent.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Inonotus</i> P.Karst., 1879
<b>L</b>	
21 <i>Lactarius controversus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797
22 <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill = <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Bondartsev & Singer = <i>Lamnaoa fragrans</i> (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Laetiporus</i> Murrill, 1904
23 <i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer ex Kalchbr.) Singer = <i>Boletus duriusculus</i> Schulz. = <i>Boletus nigrescens</i> Heinr.Huber, 1935	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821
24 <i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pegler. = <i>Lentinellus americanus</i> (Peck) Singer = <i>Lentinellus omphalodes</i> Pearson & Dennis	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Auriscalpiaceae</i> Género: <i>Lentinellus</i> P.Karst.
25 <i>Lepiota castanea</i> Quél. S. Canduso & Lanzoni.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756
26 <i>Lepiota laevigata</i> Lange. = <i>Lepiota oreadiformis</i> Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756
27 <i>Lepiota oreadiformis</i> Velen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756
28 <i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer = <i>Rhodopaxillus sordidus</i> (Schum.: Fr.) Mre.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.

ESPECIE	TAXONOMIA
<b>M</b>	
29 <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Sing. = <i>Agaricus annulatus</i> Lightf. = <i>Agaricus antiquatus</i> Batsch = <i>Agaricus colubrinus</i> Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer
30 <i>Merulius tremellosus</i> Schrad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.
<b>P</b>	
31 <i>Paxillus involutus</i> (Batsch ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Paxillus</i> Fr.
32 <i>Phellinus torulosus</i> (Pers.: Pers.) Boud.& Galz. = <i>Fuscoporia torulosa</i> (Pers.) T.Wagner & M.Fisch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fuscoporia</i> Murrill
33 <i>Pisolithus arhizus</i> (Scop. ex Pers.) Rauschert	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Pisolithus</i> Alb.& Schwein.
34 <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P.Kumm. = <i>Agaricus convivarum</i> Dunal = <i>Agaricus fuliginus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871
<b>S</b>	
35 <i>Schizophyllum commune</i> Fr. = <i>Agaricus alneus</i> L. = <i>Agaricus alneus</i> Reichard = <i>Agaricus multifidus</i> Batsch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Schizophyllaceae</i> Género: <i>Schizophyllum</i> Fr., 1815
36 <i>Suillus mediterraneus</i> (Jacquet. & Blum) Redeuilh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray
<b>T</b>	
37 <i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers. ex Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude

ESPECIE	TAXONOMIA
<p>38 <i>Tricholoma batschii</i> Gulden                      = <i>Tricholoma subnnulatum</i> (Batsch) Bres.                      = <i>Tricholoma fracticum</i> (Britz.) Kreisel</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i>                      Filo: <i>Basidiomycota</i>                      Clase: <i>Agaricomycetes</i>                      Orden: <i>Agaricales</i>                      Familia: <i>Tricholomataceae</i>                      Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude</p>
<p>39 <i>Tricholoma striatum</i> Sacc.                      = <i>Tricholoma albobrunneum</i> P. P .</p>	<p>Reino: <i>Fungi</i>                      Filo: <i>Basidiomycota</i>                      Clase: <i>Agaricomycetes</i>                      Orden: <i>Agaricales</i>                      Familia: <i>Tricholomataceae</i>                      Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude</p>

## INDICE TAXONÓMICO de Setas de Otoño – 2017

### ESPECIE

Reino: *Fungi*  
 Filo: *Basidiomycota*  
 Clase: *Agaricomycetes*  
 Orden: *Agaricales*  
 Familia: *Agaricaceae*  
 Género: *Agaricus* Linnaeus, 1753

*Agaricus bessadalanus* Bohus  
 = *Agaricus bresadolianus* Bohus

*Agaricus xanthoderma* Genev.

Género: *Battarrea* Pers.

*Battarrea phalloides* (Dicks.) Pers.  
 = *Battarraea stevenii* (Liboschitz.) Fries.

Género: *Coprinus* Pers., 1797

*Coprinus comatus* (Müell.: Fr.) Gray

Género: *Lepiota* P.Browne, 1756

*Lepiota castanea* Quéf. S. Canduso & Lanzoni.

*Lepiota laevigata* Lange.  
 = *Lepiota oreadiformis* Lange

*Lepiota oreadiformis* Velen

Género: *Macrolepiota* Singer

*Macrolepiota procera* (Scop.: Fr.) Sing.  
 = *Agaricus annulatus* Lightf.  
 = *Agaricus antiquatus* Batsch  
 = *Agaricus colubrinus* Bull.

Familia: *Amanitaceae*  
 Género: *Amanita* Dill.ex Boehm., 1760

*Amanita muscaria* (Linneo ex Fr.) Hooker (1821)  
 = *Agaricus puella* Bastch.  
 = *Amanita muscaria* var. *aureola* (Kalch.) Quel.(1873)  
 = *Agaricus pseudoaurianticus* Bulliard.

*Amanita vaginata* Fr.: Bull.

Familia: *Hymenogastraceae*  
 Género: *Galerina* Earle, 1909

*Galerina badipes* (Pers.) Kühner

Género: *Gymnopilus* P.Karst., 1879

*Gymnopilus spectabilis* (Fr.) A.H. Smith  
 = *Gymnopilus junonius* (Fr.) P.D. Orton sensu  
 Quadraccia

Familia: *Inocybaceae*  
 Género: *Crepidotus* (Fr.) Staude

*Crepidotus mollis* (Schaeff.) Staude

### ESPECIE

Familia: *Omphalotaceae*  
 Género: *Gymnopus* (Pers.) Roussel

*Gymnopus dryophilus* (Bull.) Murrill  
 = *Collybia dryophila* (Bull.) P.Kumm.

Familia: *Pleurotaceae*  
 Género: *Pleurotus* (Fr.) P.Kumm., 1871

*Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P.Kumm.  
 = *Agaricus convivarum* Dunal  
 = *Agaricus fuliginus* Pers.

Familia: *Schizophyllaceae*  
 Género: *Schizophyllum* Fr., 1815

*Schizophyllum commune* Fr.  
 = *Agaricus alneus* L.  
 = *Agaricus alneus* Reichard  
 = *Agaricus multifidus* Batsch

Familia: *Strophariaceae*  
 Género: *Agrocybe* Fayod, 1889

*Agrocybe cylindrica* (D.C.: Fr.) Maire  
 = *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod

Familia: *Tricholomataceae*  
 Género: *Clitocybe* (Fr.) Staude, 1857

*Clitocybe costata* (Kühner & Romagn.)

Género: *Lepista* (Fr.) W.G.Sm.

*Lepista sordida* (Schumach.) Singer  
 = *Rhodopaxillus sordidus* (Schum.: Fr.) Mre.

Género: *Tricholoma* (Fr.) Staude

*Tricholoma albobrunneum* (Pers. ex Fr.) Kumm.

*Tricholoma batschii* Gulden  
 = *Tricholoma subnnulatum* (Batsch) Bres.  
 = *Tricholoma fracticum* (Britz.) Kreisel

*Tricholoma striatum* Sacc.  
 = *Tricholoma albobrunneum* P. P .

Orden: *Auriculariales*  
 Familia: *Auriculariaceae*  
 Género: *Auricularia* Bull., 1780

*Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quéf.  
 = *Hirneola auricula-judae* subsp. *lactea* (Quéf.)  
 D.A.Reid, 1970

Orden: *Boletales*  
 Familia: *Boletaceae*  
 Género: *Leccinum* Gray, 1821

*Leccinum duriusculum* (Schulzer ex Kalchbr.) Singer  
 = *Boletus duriusculus* Schulz.  
 = *Boletus nigrescens* Heinr.Huber, 1935

**ESPECIE**

Familia: *Diplocystidiaceae*  
 Género: *Astraeus* Morgan

*Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morgan  
 = *Astraeus hygrometricus* f.*decaryi* (Pat.) Pat.

Familia: *Paxillaceae*  
 Género: *Paxillus* Fr.

*Paxillus involutus* (Batsch ex Fr.) Fr.

Familia: *Sclerodermataceae*  
 Género: *Pisolithus* Alb. & Schwein.

*Pisolithus arhizus* (Scop. ex Pers.) Rauschert

Familia: *Suillaceae*  
 Género: *Suillus* Gray

*Suillus mediterraneus* (Jacquet. & Blum) Redeuilh.

Orden: *Hymenochaetales*  
 Familia: *Hymenochaetaceae*  
 Género: *Fomitiporia* Murrill

*Fomitiporia robusta* (P.Karst.) Fiasson & Niemelä  
 ≡ *Phellinus robustus* (P.Karst.) Bourdot & Galzin

Género: *Fuscoporia* Murrill

*Phellinus torulosus* (Pers.: Pers.) Boud.& Galz.  
 = *Fuscoporia torulosa* (Pers.) T.Wagner & M.Fisch.

Género: *Inocutis* Fiasson & Niemelä

*Inocutis tamaricis* (Pat.) Fiasson & Niemelä  
 = *Inonotus tamaricis* (Pat.) Maire

Género: *Inonotus* P.Karst., 1879

*Inonotus hispidus* (Bull.) P.Karst.  
 = *Agaricus velutinus* (With.) E.H.L.Krause, 1933  
 = *Boletus hirsutus* Scop.  
 = *Boletus hirtus* Vent.

**ESPECIE**

Orden: *Polyporales*  
 Familia: *Fomitopsidaceae*  
 Género: *Laetiporus* Murrill, 1904

*Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill  
 = *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Bondartsev & Singer  
 = *Lamnaoa fragrans* (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini

Familia: *Ganodermataceae*  
 Género: *Ganoderma* P.Karst., 1881

*Ganoderma lucidum* (Leys.: Fr.) Karst.  
 = *Agarico-igniarius trulla* Paulet  
 = *Agaricus lignosus* Lam.  
 = *Boletus crustatus* J.J.Planer  
 = *Boletus flabelliformis* Leys.

Familia: *Meruliaceae*  
 Género: *Phlebia* Fr.

*Merulius tremellosus* Schrad.

Familia: *Polyporaceae*  
 Género: *Coriolopsis* Murrill, 1905

*Coriolopsis gallica* (Fr.) Ryvarden  
 = *Boletus favus* Bull.  
 = *Cerrena gallica* (Fr.) Zmitr  
 = *Funalia extenuata* (Durieu & Mont.) Domański

Género: *Fomes* (Fr.) Fr., 1849

*Fomes fomentarius* (L.) J.J.Kickx

Orden: *Russulales*  
 Familia: *Auriscalpiaceae*  
 Género: *Lentinellus* P.Karst.

*Lentinellus micheneri* (Berk. & M. A. Curtis) Pegler.  
 = *Lentinellus americanus* (Peck) Singer  
 = *Lentinellus omphalodes* Pearson & Dennis

Familia: *Russulaceae*  
 Género: *Lactarius* Pers., 1797

*Lactarius controversus* (Pers. ex Fr.) Fr.