

LACTARIUS

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA



Fundada en 1990 -. Decana en Andalucía

ÍNDICE ALFABÉTICO GENERAL

CATÁLOGO MICOLÓGICO - JAÉN 1989 – 2021

ISSN: 1132-2365 / ISSN-e: 2695-6810

BIOLOGÍA VEGETAL

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

JAÉN (ESPAÑA)

Boletines “LACTARIUS” desde 1992

RELACIÓN ALFABÉTICA de Setas en Jaén (1989 – 2020)

En esta relación se recogen 1810 taxones diferenciados, estudiados en las distintas actividades celebradas por la *Asociación Micológica “Lactarius”* en la provincia de Jaén, durante 31 años, agrupados dentro de los nombres aceptados internacionamente y dentro de cada uno de ellos agrupando distintas variedades, bajo diversos sinónimos.

La presente relación ha sido recopilada a partir de los datos publicados en los distintos Boletines “Lactarius”, así como en la última relación aportada por D. Felipe Jiménez Antonio y basados en los especímenes guardados en distintos herbarios de miembros de la Asociación Micológica “Lactarius” de Jaén. En el apartado año se corresponden a:

2006.- Datos basados en: Delgado Aguilera, José & otros (2021): *Mixomicetos en Jaén*. (1998 – 2006). *Monográfico* [2, 7 – 201. Boletín “Lactarius”. Jaén

2013.- Datos basados en las dos publicaciones siguientes:

Moreno-Arroyo, Baldomero (2004): *Inventario Micológico Básico de Andalucía* (IMBA) 1ª edición. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla. (España)

Jiménez Antonio, Felipe (2013): Catálogo de hongos de la provincia de Jaén - 2013. *Lactarius* 22 [8; 116 – 148]. Jaén.

2013 y 2021.- Datos extraídos de las Exposiciones celebradas y artículos publicados en los distintos Boletines “Lactarius”. [1 – 29]

2021.- Ejemplares publicados en “Lactarius” y depositados en herbarios particulares de socios.

2022.- Ejemplares depositados en herbarios particulares de socios y no mencionados en los Boletines “Lactarius”

El primer nombre corresponde al más aceptado por la comunidad internacional, el siguiente o los siguientes son sinónimos de este primero, siendo los más utilizados en determinadas zonas geográficas.

Los nombres en negrita se corresponden con aquellos ejemplares que figuraron en las distintas exposiciones organizadas por la *Asociación Micológica “Lactarius”* dentro de la provincia de Jaén y recolectados en la misma, así como estudiados en los diferentes artículos en los Boletines “Lactarius”.

La clasificación micológica se ha realizado basándose principalmente en bases de datos de las siguientes páginas WEB:

[GBIF](#).-Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad

[MycoBank](#) Fichas micológicas científicas

[Wikipedia](#). Tanto es español como en inglés

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
A			
	<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. ex Fr.) Singer. = <i>Abortiporus biennis</i> subsp. <i>biennis</i>	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Abortiporus</i> Murrill	2013, 2021
	<i>Acanthophysium apricans</i> (Bourdot) G. Cunn. ≡ <i>Aleurodiscus apricans</i> Bourdot = <i>Corticium apricans</i> (Bourdot) Sacc. & Trotter = <i>Xylobolus apricans</i> (Bourdot) Sheng H. Wu, Boidin & C. Y. Chien	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Acanthophysium</i> (Pilát) G.Cunn.	2013, 2022
	<i>Adelphella babingtonii</i> (Berk. & Broome) Pfister, Matočec & I.Kušan = <i>Pachyella babingtonii</i> (Berk. & Broome) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Adelphella</i> Pfister, Matočec & I.Kušan, 2009	2013 -
	<i>Agaricus aridicola</i> Gempl, Geiser & Royse ex Mateos, J. Morales, J. A. Muñoz, Rey & C. Tovar = <i>Gyrophragmium dunalii</i> (Fr.) Zeller	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus arvensis</i> J. C. Schaeffer: Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus augustus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus benesi</i> (Pilát) Pilát.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus bisporus</i> (J. Lange) Imbach. = <i>Agaricus brunnescens</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus bitorquis</i> (Quél.) Sacc. = <i>Agaricus bitorquis</i> var. <i>validus</i> (F. H. Møller) Bon & Cappelli = <i>Agaricus coronatus</i> Fr. = <i>Hypholoma coronatum</i> (Quél.) Sacc. = <i>Pratella bitorquis</i> (Quél.) Bigeard & Guillemin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2022
	<i>Agaricus bresadolanus</i> Bohus = <i>Agaricus campestris</i> var. <i>radicatus</i> (Vittad.) Sacc. = <i>Agaricus romagnesii</i> Wasser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Agaricus brunneolus</i> (J. E. Lange) Pilát = <i>Agaricus porphyrizon</i> (J. E. Lange) Pilát ≡ <i>Psalliota brunneola</i> J. E. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus campestris</i> L. ex Fr. = <i>Agaricus campestris</i> var. <i>squamulosus</i> Rea	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus comtulus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus gennadii</i> (Chatin & Boud) P. D. Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus heinemannianus</i> Esteve -Rav.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus impudicus</i> (Rea) Pilát.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus iodosmus</i> Heinem. = <i>Agaricus xanthodermus</i> var. <i>pilatianus</i> Bohus	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus langei</i> (F. H. Møller) F. H. Møller	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus lanipes</i> (F. H. Møller & Jul. Schäff.) Hlaváček	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus litoralis</i> (Wakef. & A. Pearson) Pilát = <i>Agaricus maskae</i> Pilát. = <i>Agaricus spissicaulis</i> F. H. Møller	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus luteomaculatus</i> F. H. Møller = <i>Psalliota luteomaculata</i> F. H. Møller	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Agaricus lutosus</i> F. H. Møller = <i>Psalliota lutosus</i> F. H. Møller	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus minimus</i> (Roclem) Pilát. = <i>Agaricus semotus</i> var. <i>minimus</i> (Ricken) Wasser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus moelleri</i> Asser = <i>Agaricus meleagris</i> (Jul. Schäff.) Pilát. = <i>Agaricus praeclaresquamosus</i> A. E. Freeman	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus pequinii</i> (Boud.) Konrad & Maubl. = <i>Agaricus gennadii</i> var. <i>microsporus</i> (Bohus) Wasser ≡ <i>Chitonina pequinii</i> Boud. = <i>Clarkeina pequinii</i> (Boud.) Sacc. & P. Syd., 1902	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2022
	<i>Agaricus porphyrizon</i> P. D. Orton = <i>Agaricus arvensis</i> subsp. <i>purpurascens</i> Cooke, 1885	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus pseudolutosus</i> (G. Moreno, Esteve -Rav., Illana & Heykoop) G. Moreno, L. A. Parra, Esteve -Rav. & Heykoop = <i>Agaricus goossensiae</i> var. <i>pseudolutosus</i> G. Moreno, Esteve -Rav., Illana & Heykoop.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus pseudoprattensis</i> (Bohus) Wasser = <i>Agaricus pseudoprattensis</i> var. <i>niveus</i> Bohus ≡ <i>Psalliota pseudoprattensis</i> Bohus	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013
	<i>Agaricus semotus</i> (Fr.) Ricken	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus sylvaticus</i> Schaeff. = <i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schuzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus sylvicola</i> (Vittad.) Peck = <i>Agaricus essettei</i> Bon sin.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agaricus urinascens</i> (Jul. Schäff. & F. H. Møller) Singer = <i>Agaricus albertii</i> Bon. = <i>Agaricus excellens</i> F. H. Møller = <i>Agaricus macrosporus</i> (F. H. Møller & Jul. Schäff.) Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Agaricus vaporarius</i> (Persoon) Capelli.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Agaricus xanthodermus</i> Genev. = <i>Agaricus xanthoderma</i> var. <i>griseus</i> (A. Pearson) Bon & Cappelli = <i>Agaricus xanthoderma</i> var. <i>meleagrioides</i> (A. Pearson) Bon & Cappelli, 1983	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Agaricus</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Agrocybe cylindrica</i> (D. C.: Fr.) Maire = <i>Agrocybe cylindricus</i> D.C., 1815	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2021
	<i>Agrocybe dura</i> (Bolton) Singer ≡ <i>Agaricus durus</i> Bolton = <i>Dryophila dura</i> (Bolt.) Quél. = <i>Hylophila dura</i> (Bolton) Quél. = <i>Pholiota dura</i> f. <i>cutifracta</i> J. E. Lange = <i>Togaria dura</i> (Bolton) W. G. Sm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Agrocybe elatella</i> (P. Karst.) Vesterh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2021,
	<i>Agrocybe paludosa</i> (J. E. Lange) Kühner & Romagn. exBon * = <i>Pholiota paludosa</i> (J. E. Lange) S. Lundell = <i>Pholiota praecox</i> var. <i>paludosa</i> J. E. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Agrocybe pediades</i> (Fr.) Fayod = <i>Agrocybe semiorbicularis</i> (Bull. exSt. Amans) Fayod = <i>Agrocybe subpediades</i> (Murrill) Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2021
	<i>Agrocybe praecox</i> (Pers.: Fr.) Fayod = <i>Agaricus britzelmayrii</i> Schulzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2013, 2021
	<i>Agrocybe splendida</i> Cléménçon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Agrocybe splendidoides</i> Migl. & Coccia	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Agrocybe stepposa</i> Svrček	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Agrocybe vervactii</i> . (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Agrocybe</i> Fayod, 1889	2013, 2021
	<i>Albatrellus confluens</i> (Alb. & Schw. ex Fr.) Kotl. & Pouz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Albatrellaceae</i> Género: <i>Albatrellus</i> Gray	2013, 2021
	<i>Albatrellus subrubescens</i> (Murrill) Pouz = <i>Albatrellus ovinus</i> var. <i>subrubescens</i> (Murrill) L. G. Krieglst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Albatrellaceae</i> Género: <i>Albatrellus</i> Gray	2013, 2021
	<i>Aleuria aurantia</i> (Fr.) Fuckel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Aleuria</i> Fuckel	2013, 2021
	<i>Aleurodiscus disciformis</i> (DC.) Pat. = <i>Aleurocystidiellum disciformis</i> (DC.) Boidin, Terra & Lanq. = <i>Helvella disciformis</i> Vill. = <i>Hymenochaete disciformis</i> (DC.) W. G. Sm. = <i>Peniophora disciformis</i> (DC.) Cooke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Aleurodiscus</i> Rabenh. ex J.Schröt.	2013 -
	<i>Alnicola scolecina</i> (Fr.) Romafn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Alnicola</i> Kühner	2021
	<i>Amanita baccata</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amanita battarrae</i> (Boud.) Bon = <i>Amanita fusco-olivacea</i> (Contu) Romagn. = <i>Amanita inaurata</i> var. <i>umbrinolutea</i> Secr. exGillet = <i>Amanita umbrinolutea</i> (Secr. exGillet) Bataille = <i>Amanita umbrinolutea</i> var. <i>fuscoolivacea</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amanita beillei</i> (Beauseign.) Bon & Contu = <i>Armillaria beillei</i> (Beauseign.) Locq. = <i>Aspidella beillei</i> (Barla) E. J. Gilbert = <i>Lepidella beillei</i> Beauseign.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Amanita boudieri</i> Barla = <i>Agaricus moulinsii</i> (de Brond). ≡ <i>Amanita solitaria</i> var. <i>boudieri</i> (Barla) E. J. Gilbert = <i>Aspidella ampla</i> (Barla) E. J. Gilbert ≡ <i>Lepidella boudieri</i> (Barla) E. J. Gilbert & Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013
	<i>Amanita caesarea</i> (Scop. ex Fr.) Grév.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita ceciliae</i> (Berk. & Broome) Bas. = <i>Amanita strangulata</i> (Fr.) Roze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita cistetorum</i> Contu & Pacioni	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita citrina</i> (Schaeff.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita codinae</i> (Maire) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita crocea</i> (Quél.) Singer = <i>Amanita romagnesia</i> Tulloss, 2000 ≡ <i>Amanitopsis crocea</i> (Quél.) E. J. Gilbert	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amanita curtipes</i> E. J. Gilbert.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita decipiens</i> (Trimbach) Jacquet. ≡ <i>Amanita verna</i> var. <i>decipiens</i> Trimbach	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amanita echinocephala</i> (Vitt.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Amanita eliae</i> Quél. ≡ <i>Amanita gemmata</i> var. <i>eliae</i> (Quél.) E. J. Gilbert = <i>Amanita raymondii</i> Contu ≡ <i>Amanitaria eliae</i> (Quél.) E. J. Gilbert ≡ <i>Lepiota eliae</i> (Quél.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amanita excelsa</i> (Fr.) Bertill. = <i>Amanita spissa</i> (Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013
	<i>Amanita franchetii</i> (Boud.) Fayod.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita fulvoides</i> Neville y Poumarat	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2021
	<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertillon (1866) = <i>Amanita junquillea</i> f. <i>amici</i> (Gillet) Veselý	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2021
	<i>Amanita gracilior</i> Bas & Honrubia ≡ <i>Amanita baccata</i> var. <i>gracilior</i> (Bas & Honrubia) Aparici & Mahiques = <i>Amanita gracilior</i> var. <i>beilleioides</i> Neville & Poumarat	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amanita lividopallescens</i> Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita mairei</i> Foley	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita malleata</i> (Bon) Contu.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013
	<i>Amanita muscaria</i> (Linneo ex Fr.) Hooker (1821) = <i>Agaricus puella</i> Bastch. = <i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i> (Singer) Neville & Poumarat. = <i>Amanita muscaria</i> var. <i>formosa</i> (Pers.) Gonn & Rab. (1800) = <i>Agaricus pseudoaurianticus</i> Bulliard.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull. ex Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita pachyvolvata</i> (Bon) Krieglst. = <i>Amanita pachyvolvata</i> (Bon) Romagn. ≡ <i>Amanitopsis pachyvolvata</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2022
	<i>Amanita pantherina</i> (DC. ex Fr.) Krombh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita phalloides</i> (Vaill.: Fr.) Secr. = <i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i> Constantin & Dufour.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita ponderosa</i> Malençon & R. Heim ≡ <i>Amanita curtipes</i> var. <i>ponderosa</i> (Malençon & R. Heim) M. L. Castro	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amanita porphyria</i> Alb. & Schwein. = <i>Agaricus porphyrius</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2021
	<i>Amanita proxima</i> Dumée ≡ <i>Amanita ovoidea</i> var. <i>proxima</i> (Dumée) Bon & Courtec.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita rubescens</i> (Pers.: Fr.) Gray = <i>Agaricus magnificus</i> Fr. = <i>Agaricus rubescens</i> (Pers.) Fr. = <i>Agaricus verrucosus</i> Bull. = <i>Amanita annulosulfurea</i> (Gillet) Seyot = <i>Amanita magnifica</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita submembranacea</i> (Bon) Gröger = <i>Amanita subalpina</i> M. M. Moser = <i>Amanita submembranacea</i> var. <i>griseoargentata</i> Contu ≡ <i>Amanitopsis submembranacea</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2021
	<i>Amanita torrendii</i> Justo = <i>Torrendia pulchella</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Amanita vaginata</i> Fr.: Bull. = <i>Amanita vaginata</i> var. <i>alba</i> (Fr. Bull.) = <i>Amanita vaginata</i> var. <i>plumbea</i> (Fr. Bull.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill.ex. Boehm., 1760	2013, 2021
	<i>Amanita verna</i> (Bull.) Lam.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Amanita</i> Dill. ex. Boehm., 1760	2013 -
	<i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai = <i>Postia stiptica</i> (Pers.) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Anthoporia</i> Karasiński & Niemelä	2021
	<i>Amaropostia stiptica</i> (Pers.) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai = <i>Boletus albidus</i> Schaeff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Anthoporia</i> Karasiński & Niemelä	2013 -
	<i>Amaurodon viridis</i> (Alb. & Schwein.) J. Schröt. ≡ <i>Acia viridis</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst. ≡ <i>Caldesiella viridis</i> (Alb. & Schwein.) Pat. ≡ <i>Hydnum viride</i> (Alb. & Schwein.) Fr. = <i>Odontia viridis</i> (Alb. & Schwein.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Amaurodon</i> J.Schröt.	2013 -
	<i>Amphinema byssoides</i> (Pers.) J. Erikss. = <i>Amphinema sordescens</i> (P. Karst.) P. Karst. = <i>Amphinema tomentellum</i> (Bres.) M. P. Christ. = <i>Athelia lanuginosa</i> Pers. = <i>Coniophora byssoides</i> (Pers.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Amphinema</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Amylocorticiellum molle</i> (Fr.) Spirin & Zmitr. = <i>Corticium molle</i> (Fr.) Fr. = <i>Grandinia fugax</i> P. Karst. ≡ <i>Hypochniciellum molle</i> (Fr.) Hjortstam ≡ <i>Hypochnus mollis</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Amylocorticiales</i> Familia: <i>Amylocorticiaceae</i> Género: <i>Amylocorticiellum</i> Spirin & Zmitr.	2013 -
	<i>Amylocorticium subsulphureum</i> (P. Karst.) Pouzar ≡ <i>Corticium subsulphureum</i> P. Karst. = <i>Kneiffia subsulphurea</i> (P. Karst.) Bres. = <i>Terana subsulphurea</i> (P. Karst.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Amylocorticiales</i> Familia: <i>Amylocorticiaceae</i> Género: <i>Amylocorticium</i> Pouzar	2013 -
	<i>Amyloporia sinuosa</i> (Fr.) Rajchenb., Gorjón & Pildain ≡ <i>Antrodia sinuosa</i> (Fr.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Amyloporia</i> Singer	2013 -
	<i>Amyloxenasma grisellum</i> (Bourdot) Hjortstam & Ryvar den = <i>Aphanobasidium grisellum</i> (Bourdot) Jülich ≡ <i>Corticium grisellum</i> Bourdot = <i>Xenasma grisellum</i> (Bourdot) Liberta = <i>Xenasmateella grisella</i> (Bourdot) Oberw., 1966	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Amylocorticiales</i> Familia: <i>Amylocorticiaceae</i> Género: <i>Amyloxenasma</i> (Oberw.) Hjortstam & Ryvar den	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Anthoporia albobrunnea</i> (Romell) Karasiński & Niemelä ≡ <i>Antrodia albobrunnea</i> (Romell) Ryvarden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Anthoporia</i> Karasiński & Niemelä	2013 -
	<i>Anthracobia melaloma</i> (Alb. & Schwein.) Arnould = <i>Aleuria melaloma</i> (Alb. & Schwein.) Gillet = <i>Anthracobia melaloma</i> (Alb. & Schwein.) Boud	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Anthracobia</i> Boud., 1885	2013, 2021
	<i>Antrodia albida</i> (Fr.) Donk = <i>Agaricus serpens</i> (Fr.) E. H. L. Krause = <i>Antrodia serpens</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Cellularia albida</i> (Fr.) Kuntze = <i>Coriolellus albidus</i> (Fr.) Bondartsev	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Antrodia</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Antrodia heteromorpha</i> (Fr.) Donk = <i>Cellularia heteromorpha</i> (Fr.) Kuntze = <i>Coriolellus heteromorphus</i> (Fr.) Bondartsev & Singer = <i>Coriolus hexagoniformis</i> Murrill ≡ <i>Daedalea heteromorpha</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Antrodia</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Antrodia ramentacea</i> (Berk. & Broome) Donk ≡ <i>Bjerkandera ramentacea</i> (Berk. & Broome) Teixeira = <i>Cartilosoma ramentaceum</i> (Berk. & Broome) Teixeira = <i>Cartilosoma subsinuosum</i> (Bres.) Kotl. & Pouzar	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Antrodia</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Antrodiella pallescens</i> (Pilát) Niemelä & Miettinen = <i>Antrodia semisupina</i> Anon. ≡ <i>Coriolus pallescens</i> Pilát = <i>Coriolus pallescens</i> f. <i>resupinatus</i> Pilát = <i>Polyporus pallescens</i> Romell	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Antrodiella</i> Ryvarden & I.Johans.	2013 -
	<i>Arcyria cinerea</i> (Bull.) Pers. = <i>Trichia cinerea</i> Bull.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006
	<i>Arcyria denudata</i> (L.) Wettst., 1886 = <i>Clathrus denudatus</i> L.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006
	<i>Arcyria ferruginea</i> Sauter 1841	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006
	<i>Arcyria incarnata</i> (Pers.) Pers. (1796) = <i>Stemonitis incarnata</i> Pers.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Arcyria minuta</i> Buchet, 1927 = <i>Arcyria carnea</i> (G. Lister) G. Lister (1921)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006
	<i>Arcyria obvelata</i> (Oeder) Onsberg, 1978. = <i>Embolus obvelatus</i> Oeder = <i>Stemonitis amoena</i> Trentep., 1797	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006
	<i>Arcyria oerstedii</i> . Rostaf. (1875)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006
	<i>Arcyria pomiformis</i> (Leers) Rost. Sluzowce monogr. (Paryz) 271 (1875) = <i>Mucor pomiformis</i> Leers	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Arcyria</i>	2006
	<i>Armillaria cepestipes</i> Vel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Armillaria gallica</i> Marxmüller & Romag. = <i>Armillaria bulbosa</i> (Barla) Kile & Watling.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Armillaria lutea</i> Guillet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Armillaria mellea</i> (Vahl) P. Kumm. = <i>Agaricus annularis</i> Bull., 1788 = <i>Agaricus annularius</i> DC. = <i>Agaricus melleus</i> Vahl = <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Armillaria obscura</i> (Schaeff.) Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Armillaria ostoyae</i> (Romagn. HerinK.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Armillaria tabescens</i> (Scop.) Emel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Armillaria</i> (Fr.) Staude	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Arrhenia baeospora</i> (Singer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys = <i>Omphalina baeospora</i> Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Arrhenia</i> Fr., 1849	2013 -
	<i>Arrhenia lobata</i> (Pers.) Kühner & Lamoure ex Redhead.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Arrhenia</i> Fr., 1849	2021
	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr.) Redhead. = <i>Agaricus muscigenus</i> Bull. = <i>Arrhenia muscigena</i> (Bull.) Honrubia & Folgado = <i>Leptoglossum muscigenum</i> (Bull.) W. B. Cooke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Arrhenia</i> Fr., 1849	2013, 2021
	<i>Ascobolus ciliatus</i> Berk. = <i>Lasiobolus ciliatus</i> (W. Phillips) Mussat	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Ascobolaceae</i> Género: <i>Ascobolus</i> Pers., 1792	2013 -
	<i>Ascobolus furfuraceus</i> Pers. = <i>Ascobolus aerugineus</i> Fr. = <i>Ascobolus fimiputris</i> (Fr.) Quél. = <i>Ascobolus stercorarius</i> (Bull.) J. Schröt.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Ascobolaceae</i> Género: <i>Ascobolus</i> Pers., 1792	2013 -
	<i>Aspidella solitaria</i> (Bull.) E. J. Gilbert = <i>Amanita solitaria</i> (Bull. ex Fr.) Secr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Aspidella</i>	2021
	<i>Asterostroma cervicolor</i> (Berk. & M. A. Curtis) Massee = <i>Asterostroma cellare</i> Henn. = <i>Asterostroma ochroleucum</i> Bres. ex Torrend = <i>Corticium cervicolor</i> Berk. & M. A. Curtis = <i>Terana cervicolor</i> (Berk. & M. A. Curtis) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Lachnocladiaceae</i> Género: <i>Asterostroma</i> Massee	2013 -
	<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan = <i>Astraeus hygrometricus</i> f. <i>decaryi</i> (Pat.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Diplocystidiaceae</i> Género: <i>Astraeus</i> Morgan	2013, 2021
	<i>Athelia arachnoidea</i> (Berk.) Jülich = <i>Athelia bispora</i> (J. Schröt.) Donk = <i>Corticium bisporum</i> (J. Schröt.) Bourdot & Galzin = <i>Hyphoderma effusum</i> Fuckel, 1863 = <i>Pellicularia bispora</i> Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Athelia</i> Pers., 1818	2013 -
	<i>Athelia bombacina</i> (Link) Pers. = <i>Alytospodium bombacinum</i> (Link) Ehrenb. = <i>Sporotrichum bombacinum</i> Link	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Athelia</i> Pers., 1818	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Athelia cystidiolophoraa</i> Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Athelia</i> Pers., 1818	2013 -
	<i>Athelia decipiens</i> (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. = <i>Athelia caucasica</i> Parmasto = <i>Athelia sphaerospora</i> Jülich ≡ <i>Corticium decipiens</i> Höhn. & Litsch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Athelia</i> Pers., 1818	2013 -
	<i>Athelia epiphylla</i> Pers. ≡ <i>Asterostromella epiphylla</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. = <i>Athelia centrifuga</i> Anon. = <i>Corticium centrifugum</i> (Lév.) Bres. = <i>Fibularhizoctonia centrifuga</i> (Lév.) G. C. Adams & Kropp = <i>Hypochnus candidus</i> (Sacc.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Athelia</i> Pers., 1818	2013 -
	<i>Athelia fibulata</i> M. P. Christ.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Athelia</i> Pers., 1818	2013 -
	<i>Atheliachaete galactites</i> (Bourdot & Galzin) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin = <i>Phanerochaete galactites</i> (Bourdot & Galzin) J.Erikss. & Ryvarden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Atheliachaete</i> Spirin & Zmitr., 2011	2013 -
	<i>Atheliachaete sanguinea</i> (Fr.) Spirin & Zmitr. = <i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.) Pouzar	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Atheliachaete</i> Spirin & Zmitr., 2011	2013 -
	<i>Athelopsis glaucina</i> (Bourdot & Galzin) Oberw. ex Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Athelopsis</i> Oberw. ex Parmasto	2013 -
	<i>Aureoboletus gentilis</i> (Quelet) Pouzar = <i>Pulveroboletus gentilis</i> (Quelet) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boetales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Aureoboletus</i> Pouzar	2013, 2021
	<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Quél. = <i>Hirneola auricula-judae</i> subsp. <i>lactea</i> (Quél.) D. A. Reid, 1970	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Auricularia</i> Bull., 1780	2013, 2021
	<i>Auricularia mesenterica</i> (Dicks. ex Fr.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Auricularia</i> Bull., 1780	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Auriscalpium vulgare</i> Gray = <i>Auriscalpium auriscalpium</i> (L.) Banker, 1906	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Auriscalpiaceae</i> Género: <i>Auriscalpium</i> Gray	2013, 2021
B			
	<i>Badhamia dubia</i> Nann. -Bremek. (1968)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Badhamia</i> Berkeley, 1853	2006
	<i>Badhamia foliicola</i> Lister. (1897)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Badhamia</i> Berkeley, 1853	2006
	<i>Badhamia macrocarpa</i> (Ces.) Rostaf (1874) = <i>Physarum macrocarpum</i> Ces. (1855)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Badhamia</i> Berkeley, 1853	2006
	<i>Badhamia melanospora</i> Speg., 1880 = <i>Badhamia gracilis</i> (T. Macbr.) T. Macbr., 1934	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Badhamia</i> Berkeley, 1853	2006
	<i>Badhamia utricularis</i> (Bull.) Berk. = <i>Sphaerocarpus utricularis</i> Bull	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Badhamia</i> Berkeley, 1853	2006
	<i>Badhamiopsis ainoae</i> (Yamash.) T. E. = <i>Badhamia ainoae</i> Yamash.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Badhamia</i> Berkeley, 1853	2006
	<i>Baeospora myosura</i> (Fr.) Singer. ≡ <i>Agaricus myosurus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Baeospora</i> Singer	2013, 2021
	<i>Balsamia vulgaris</i> Vittad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Balsamia</i> Vittad.	2013 -
	<i>Basidiodendron caesiocinereum</i> (Höhn. & Litsch.) Luck-Allen = <i>Bourdotia caesiocinerea</i> (Höhn. & Litsch.) Bourdot & Galzin, 1938	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Incertae sedis</i> Género: <i>Basidiodendron</i>	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Basidiodendron cinereum</i> (Bres.) Luck-Allen ≡ <i>Bourdotia cinerea</i> (Bres.) Bourdot & Galzin = <i>Sebacina cinérea</i> Bres. = <i>Thelephora cinerea</i> (Bres.) Sacc. & P. Syd.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Incertae sedis</i> Género: <i>Basidiodendron</i>	2013 -
	<i>Basidiodendron eyrei</i> (Wakef.) Luck-Allen ≡ <i>Bourdotia eyrei</i> (Wakef.) Bourdot & Galzin = <i>Gloeocystidium croceotringens</i> Wakef. exBres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Incertae sedis</i> Género: <i>Basidiodendron</i>	2013 -
	<i>Basidiodendron rimulentum</i> (Bourdot & Galzin) Luck-Allen = <i>Bourdotia deminuta</i> var. <i>rimulenta</i> Bourdot & Galzin ≡ <i>Bourdotia rimulentum</i> Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Incertae sedis</i> Género: <i>Basidiodendron</i>	2013 -
	<i>Battarrea phalloides</i> (Dicks.) Pers. = <i>Battarraea stevenii</i> (Liboschitz.) Fries.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Battarrea</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Bisporella citrina</i> (Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter. = <i>Calycella chlaroflava</i> (Grev.) Boud. = <i>Calycella citrina</i> (Hedw.) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Rhytismatales</i> Familia: <i>Pezizellaceae</i> Género: <i>Bisporella</i>	2013, 2021
	<i>Bjerkandera adusta</i> (Fr.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Bjerkandera</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Boidinia furfuracea</i> (Bres.) Stalpers & Hjortstam = <i>Corticium granulosum</i> (Bres.) Stalpers & Hjortstam = <i>Gloeocystidiellum furfuraceum</i> (Bres.) Donk = <i>Gloeocystidium furfuraceum</i> (Bres.) Höhn. & Litsch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Boidinia</i> Stalpers & Hjortstam	2013 -
	<i>Bolbitius coprophilus</i> (Peck).	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Bolbitius</i> Fr.	2021
	<i>Bolbitius elegans</i> E. Horak, G. Moreno, A. Ortega & Esteve-Rav.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Bolbitius</i> Fr.	2013 -
	<i>Bolbitius titubans</i> (Bull.) Fr. = <i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Bolbitius</i> Fr.	2021
	<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod = <i>Boletopsis leucomelas</i> (Pers.) Fayod ≡ <i>Boletus leucomelas</i> Pers. ≡ <i>Caloporus leucomelas</i> (Pers.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Boletopsis</i> Fayod	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Boletus aereus</i> Bull.: Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2013, 2021
	<i>Boletus aestivalis</i> (Paul.) Fr. = <i>Boletus reticulatus</i> (Schaeff.) Boud	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2021
	<i>Boletus caucasicus</i> Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2021
	<i>Boletus edulis</i> Bull.: Fr. = <i>Boletus edulis</i> f. <i>citrinus</i> J. A. Muñoz = <i>Boletus venturii</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2021
	<i>Boletus erythropus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2013, 2021
	<i>Boletus fragrans</i> Vittadini.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Lanmaoa</i>	2013,
	<i>Boletus impolitus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2013, 2021
	<i>Boletus lupinus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Rubroboletus</i> Kuan Zhao & Zhu L. Yang	2013,
	<i>Boletus luridus</i> Schaeff. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2013, 2021
	<i>Boletus pulchrotinctus</i> Alessio	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Suillellus</i> Murrill	2013

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Boletus satanas</i> Lenz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2013, 2021
	<i>Botryobasidium isabellinum</i> (Fr.) D. P. Rogers = <i>Botryohypochnus isabellinus</i> (Fr.) Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Botryobasidiaceae</i> Género: <i>Botryobasidium</i> Donk	2013 -
	<i>Botryobasidium laeve</i> (J. Erikss.) Parmasto = <i>Botryobasidium pruinaum</i> subsp. <i>laeve</i> J. Erikss., 1958	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Botryobasidiaceae</i> Género: <i>Botryobasidium</i> Donk	2013 -
	<i>Botryobasidium pruinaum</i> (Bres.) J. Erikss. = <i>Botryobasidium botryoideum</i> (Overh.) Parmasto = <i>Botryobasidium coronatum</i> (Sacc.) Donk = <i>Corticium botryoideum</i> Overh. = <i>Corticium coronatum</i> (J. Schröt.) Höhn. & Litsch., 1906	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Botryobasidiaceae</i> Género: <i>Botryobasidium</i> Donk	2013 -
	<i>Botryobasidium vagum</i> (Berk. & M. A. Curtis) D. P. Rogers = <i>Botryobasidium botryosum</i> (Bres.) J. Erikss. = <i>Ceratobasidium vagum</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pilát = <i>Corticium botryosum</i> Bres. = <i>Pellicularia botryosum</i> Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Botryobasidiaceae</i> Género: <i>Botryobasidium</i> Donk	2013 -
	<i>Bovista aestivalis</i> (Bon.) Demoulin.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Bovista</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Bovista bovistoides</i> (Cooke & Massee) S. Ahmad = <i>Bovistella bovistoides</i> (Cooke & Massee) Lloyd = <i>Mycenastrum bovistoides</i> Cooke & Massee = <i>Scleroderma bovistoides</i> (Cooke & Massee) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Bovista</i> Pers., 1794	2022
	<i>Bovista dermoxantha</i> (Vittad.) DeToni	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Bovista</i> Pers., 1794	2013
	<i>Bovista plumbea</i> Pers: Pers = <i>Lycoperdon suberosum</i> (Fr.) Bonord	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Bovista</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Bovista pusilla</i> Batsch exPers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Bovista</i> Pers., 1794	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Butyriboletus appendiculatus</i> (Schaeff.) D. Arora & J. L. Frank = <i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Butyriboletus</i> D.Arora & J.L.Frank	2013,
	<i>Butyriboletus pseudoregius</i> (Heinr. Huber) D. Arora & J. L. Frank = <i>Boletus pseudoregius</i> (Heinr. Huber) Estadès	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Butyriboletus</i> D.Arora & J.L.Frank	2013 -
	<i>Byssomerulius corium</i> (Fr.) Parm. = <i>Auricularia papyrina</i> Bull. = <i>Boletus cellulosus</i> Wahlenb. = <i>Boletus purpurascens</i> DC. = <i>Meruliopsis corium</i> (Fr.) Ginns	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Byssomerulius</i> Parmasto	2013, 2021
	<i>Byssomerulius hirtellus</i> (Burt) Parmasto = <i>Meruliopsis hirtella</i> (Burt) Ginns = <i>Merulius hirtellus</i> Burt = <i>Merulius macedonicus</i> Pilát & Lindtner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Byssomerulius</i> Parmasto	2013 -
C			
	<i>Cabalodontia bresadolae</i> (Parmasto) Piątek = <i>Phlebia bresadolae</i> Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Cabalodontia</i> Piątek	2013 -
	<i>Cabalodontia queletii</i> (Bourdot & Galzin) Piątek = <i>Metulodontia queletii</i> (Bourdot & Galzin) Parmasto = <i>Odontia queletii</i> Bourdot & Galzin = <i>Phlebia queletii</i> (Bourdot & Galzin) M. P. Christ. = <i>Steccherinum queletii</i> (Bourdot & Galzin) Hallenb. & Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Cabalodontia</i> Piątek	2013 -
	<i>Caloboletus radicans</i> (Pers.) Vizzini = <i>Boletus radicans</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Caloboletus</i> Vizzini	2013 -
	<i>Calocera cornea</i> (Batsch) Fr. = <i>Calocera aculeiforme</i> (Bull.) Wallr. = <i>Calocera palmata</i> (Schumach.) Fr. = <i>Calocera striata</i> (Hoffm.) Fr. = <i>Calopposis damae-cornis</i> Lloyd	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Calocera</i> (Fr.) Fr.	2022
	<i>Calocera viscosa</i> (Pers. ex Fr.) Fr. = <i>Calocera cavarae</i> Bres. = <i>Calocera flammea</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Calocera</i> (Fr.) Fr.	2013, 2021
	<i>Calocybe carnea</i> (Bull.) Donk = <i>Agaricus carneus</i> Bull. = <i>Rugosomyces carneus</i> (Bull.: Fr.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Calocybe</i> Kühner ex Donk	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Calocybe constricta</i> (Fr.) Kühner ex Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Calocybe</i> Kühner ex Donk	2013, 2021
	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Donk = <i>Agaricus albellus</i> DC. = <i>Agaricus aromaticus</i> Roques ≡ <i>Agaricus gambosus</i> Fr. = <i>Agaricus georgii</i> Sowerby	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Calocybe</i> Kühner ex Donk	2013 -
	<i>Calocybe onychina</i> (Fr.) Donk ≡ <i>Agaricus onychinus</i> Fr. = <i>Gyrophila onychina</i> (Fr.) Quél. = <i>Rugosomyces onychinus</i> (Fr.) Raithehl. = <i>Tricholoma onychinum</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Calocybe</i> Kühner ex Donk	2013 -
	<i>Calomyxa metallica</i> (Berk.) Nieuwl. (1916) = <i>Physarum metallicum</i> Berk.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Dianemataceae</i> Género: <i>Calomyxa</i>	2006
	<i>Calvatia caelata</i> (Bull.) Thore.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.	2021
	<i>Calvatia cyathiformis</i> (Bosc.) Morgan	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Scop. ex Pers.) Perdeck.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Calvatia fragilis</i> (Vittad.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.	2021
	<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch) Lloyd = <i>Langermannia gigantea</i> (Batsch) Rostk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.	2021
	<i>Calvatia utriformis</i> (Bull.: Pers.) Jaap	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Calvatia</i> Fr.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Calyprella capula</i> (Holmsk.: Pers.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Calyprella</i>	2013,
	<i>Campylomyces heimii</i> (Malençon) Nakasone ≡ <i>Veluticeps heimii</i> Malençon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gloeophyllales</i> Familia: <i>Gloeophyllaceae</i> Género: <i>Campylomyces</i> Nakasone	2013 -
	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. = <i>Agaricus alectorolophoides</i> Schaeff. = <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>alborufescens</i> Malençon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Cantharellus</i> Adans.ex Fr., 1821	2013, 2021
	<i>Cantharellus cornucopioides</i> (L.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Cantharellus</i> Adans.ex Fr., 1821	2021
	<i>Cantharellus lutescens</i> Pers. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Cantharellus</i> Adans.ex Fr., 1821	2021
	<i>Cantharocybe gruberi</i> (A. H. Sm.) H. E. Bigelow & A. H. Sm. = <i>Cantharocybe gruberi</i> v. <i>luteosaturatus</i> ≡ <i>Clitocybe gruberi</i> A. H. Sm. = <i>Laccaria gruberi</i> (A. H. Sm.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Cantharocybe</i> H.E.Bigelow & A.H.Sm., 1973	2013 -
	<i>Cenangium ferruginosum</i> Fr. = <i>Cenangium abietis</i> (Pers.) Duby = <i>Peziza abietis</i> Pers. = <i>Triblidium pineum</i> var. <i>strobilina</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Cenangiaceae</i> Género: <i>Cenangium</i> Fr.	2013 -
	<i>Ceraceomyces serpens</i> (Tode) Ginns = <i>Byssomerulius farlowii</i> (Burt) Parmasto = <i>Ceraceomerulius serpens</i> (Tode) Ginns ≡ <i>Lilaceophlebia serpens</i> (Tode) Spirin & Zmitr. = <i>Merulius crustosus</i> (Pers.) Duby	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Amylocorticiales</i> Familia: <i>Amylocorticiaceae</i> Género: <i>Ceraceomyces</i> Jülich	2013 -
	<i>Ceraceomyces sublaevis</i> (Bres.) Jülich = <i>Athelia sublaevis</i> (Bres.) Parmasto = <i>Corticium sublaeve</i> Bres. = <i>Peniophora sublaevis</i> (Bres.) Höhn. & Litsch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Amylocorticiales</i> Familia: <i>Amylocorticiaceae</i> Género: <i>Ceraceomyces</i> Jülich	2013 -
	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (O. F. Müll.) T. Macbr., (1899) = <i>Byssus fruticulosa</i> O. F. Müll, 1777	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Protosteliomycetes</i> Orden: <i>Ceratiomycxales</i> Familia: <i>Ceratiomycxaceae</i> Género: <i>Ceratiomyxa</i>	2006

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Ceratobasidium cornigerum</i> (Bourdot) D. P. Rogers ≡ <i>Corticium cornigerum</i> Bourdot = <i>Corticium pervagum</i> Petch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Ceratobasidiaceae</i> Género: <i>Ceratobasidium</i> D.P.Rogers	2013 -
	<i>Cerioporus meridionalis</i> (A. David) Zmitr. & Kovalenko = <i>Polyporus meridionalis</i> (A. David) H. Jahn	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Cerioporus</i> Quél.	2013, 2021
	<i>Cerioporus squamosus</i> (Huds.) Quél. ≡ <i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Cerioporus</i> Quél.	2013, 2021
	<i>Cerioporus varius</i> (Pers.) Zmitr. & Kovalenko = <i>Polyporus varius</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Cerioporus</i> Quél.	2013 -
	<i>Ceriporia purpurea</i> (Fr.) Donk = <i>Gloeoporus purpureus</i> (Fr.) Zmitr. & Spirin = <i>Merulioporia purpurea</i> (Fr.) Bondartsev & Singer = <i>Physisporus purpureus</i> (Fr.) Gillet = <i>Poria purpurea</i> (Fr.) Sacc., 1888	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Ceriporia</i> Donk, 1933	2013 -
	<i>Cerrena unicolor</i> (Bull.) Murrill = <i>Agaricus cinereus</i> (Pers.) E. H. L. Krause = <i>Antrodia incana</i> (P. Karst.) P. Karst. = <i>Boletus lutescens</i> Pers., 1794	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Cerrena</i> Gray	2013, 2021
	<i>Chalciporus pierrhuguesii</i> (Boud.) Bon = <i>Chalciporus pierrhuguesii</i> (Boud.) Bataille	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Chalciporus</i> Bataille	2021
	<i>Chalciporus piperatus</i> (Bull.) Bataille = <i>Boletus amarellus</i> Quél. = <i>Boletus ferruginatus</i> Batsch, 1786	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Chalciporus</i> Bataille	2021
	<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk ≡ <i>Agaricus demisannulus</i> Secr. = <i>Armillaria irrorata</i> (Quél.) J. E. Lange = <i>Chamaemyces demisannulus</i> (Secr. ex Fr.) M. M. Moser = <i>Drosella fracidus</i> (Fr.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Chamaemyces</i> Battarra ex Earle	2013 -
	<i>Cheilymania theleboloides</i> (Alb. & schwein.) Boud var. <i>glabra</i> J. Moravec.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Cheilymania</i> Boud., 1885	2013,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cheilymenia fimicola</i> (Bagl.) Dennis = <i>Auriscalpium fimicola</i> (Bagl.) Kuntze = <i>Cheilymenia coprinaria</i> subsp. <i>minima</i> (Grove) Ramsb., 1913	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Cheilymenia</i> Boud., 1885	2013, 2021
	<i>Cheilymenia granulata</i> (Bull.) J. Moravec = <i>Coprobria granulata</i> (Bull.) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Cheilymenia</i> Boud., 1885	2021
	<i>Cheilymenia theleboloides</i> (Alb. & Schwein.) Boud. = <i>Cheilymenia ascoboloides</i> (Bertero) Boud. = <i>Cheilymenia hyphopila</i> (J. Moravec) J. Moravec = <i>Cheilymenia theleboloides</i> f. <i>densipilosa</i> J. Moravec = <i>Cheilymenia theleboloides</i> f. <i>glabra</i> J. Moravec	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Cheilymenia</i> Boud., 1885	2013 -
	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nyl.) Kanouse ex c. s. Ramamurthi, Korf & L. R. Batra.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Chlorociboriaceae</i> Género: <i>Chlorociboria</i>	2021,
	<i>Chlorophyllum agaricoides</i> (Czern.) Vellinga = <i>Endoptychum agaricoides</i> (Czern.) Hollós	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Chlorophyllum</i> Massee	2013, 2021
	<i>Choiromyces gangliiformis</i> Vittad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Choiromyces</i> Vittad.	2013 -
	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers.) Pouz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Gomphidiaceae</i> Género: <i>Chroogomphus</i> (Singer) O.K.Mill.	2013, 2021
	<i>Chroogomphus fulmineus</i> (R. Heim) Courtec.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Gomphidiaceae</i> Género: <i>Chroogomphus</i> (Singer) O.K.Mill.	2013, 2021
	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeff.) O. K. Mill. = <i>Agaricus gomphus</i> Pers. = <i>Agaricus rufescens</i> J. F. Gmel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Gomphidiaceae</i> Género: <i>Chroogomphus</i> (Singer) O.K.Mill.	2013, 2021
	<i>Clathrus ruber</i> P. Micheli exPers. = <i>Clathrus ruber</i> Mich.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Clathrus</i> P.Micheli ex L.	2013, 2021
	<i>Clavaria acuta</i> Sowerby	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Clavariaceae</i> Género: <i>Clavaria</i> P.Micheli, 1729	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
0210	<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Clavariaceae</i> Género: <i>Clavulinopsis</i>	2013
	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (Fr.) Donk. = <i>Clavaria herculeana</i> Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Clavariadelphaceae</i> Género: <i>Clavariadelphus</i> Donk	2013, 2021
	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Clavariadelphaceae</i> Género: <i>Clavariadelphus</i> Donk	2013, 2021
	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.) J. Schröt. ≡ <i>Clavaria cinérea</i> Bull. = <i>Ramaria cinerea</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Clavulina</i> J.Schröt., 1888	2013, 2021
	<i>Clavulina coralloides</i> (L.) J. Schröt. = <i>Clavulina cristata</i> (Fr.) Schröeter.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Clavulina</i> J.Schröt., 1888	2021
	<i>Clavulina rugosa</i> (Fr.) Schröter. = <i>Clavaria canaliculata</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Clavulina</i> J.Schröt., 1888	2013, 2021
	<i>Clavulinopsis corniculata</i> (Schaeff.: Fr.) Corner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Clavariaceae</i> Género: <i>Clavulinopsis</i>	2013
	<i>Climacocystis borealis</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar = <i>Abortiporus borealis</i> (Fr.) Singer = <i>Bjerkandera irpicoides</i> P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Climacocystis</i> Kotl. & Pouzar	2013, 2021
	<i>Clitocella popinalis</i> (Fr.) Kluting, T.J.Baroni & Bergemann ≡ <i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Clitocella</i> Kluting, T.J.Baroni & Bergemann	2013, 2021
	<i>Clitocybe albofragrans</i> (Harmaja) Kuyper ≡ <i>Lepista albofragrans</i> Harmaja	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staudé, 1857	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Clitocybe alkaliviolascens</i> Bellú.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe amarescens</i> Harmaja = <i>Clitocybe amarescens</i> var. <i>nitrophila</i> (Bon) E. Ludw. = <i>Clitocybe nitrophila</i> Bon ≡ <i>Lepista amarescens</i> (Harmaja) Harmaja	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013 -
	<i>Clitocybe brumalis</i> (Fr.) Quél. ≡ <i>Agaricus brumalis</i> Fr. = <i>Clitocybe brumalis</i> (Fr.) Kumm. = <i>Omphalia brumalis</i> (Fr.) Quél. = <i>Pseudolyophyllum brumale</i> (Fr.) Raithelhuber	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013 -
	<i>Clitocybe candicans</i> (Pers.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe cistophila</i> Bon & Contu.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe clavipes</i> (Persoon ex Fr.) Kummer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe compressipes</i> (Peck.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe costata</i> (Kühner & Romagn.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe dealbata</i> (Showerby: Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe deceptiva</i> Bigelow.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Clitocybe ditopa</i> (Fr. ex Fr.) Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe fimiphila</i> . Contu	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013 -
	<i>Clitocybe font-queri</i> (R. Heim)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe fragrans</i> (Con.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. ex Fr.) Quélet. = <i>Clitocybe geotropa</i> var. <i>máxima</i> (Bull. ex Fr.) Quélet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers. ex Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe inornata</i> (Sow. ex Fr.) Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe lenta</i> (Maire) Malençon & Bertault.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Metr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe maxima</i> (Fl. Wett ex Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe meridionalis</i> (Bon) P. Roux, 2008	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Clitocybe metachroa</i> (Fr.) P. Kumm. = <i>Clitocybe decembris</i> Singer = <i>Clitocybe mortuosa</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm. = <i>Lepista nebularis</i> (Fr.) Harmaja	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe odora</i> (Bull. ex Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe phyllophila</i> (Pers.) P. Kumm. = <i>Agaricus cerussatus</i> Fr. = <i>Clitocybe cerussata</i> (Fr.) Kummer. = <i>Clitocybe phyllophila</i> var. <i>ornamentalis</i> (Velen.) Raithelh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe rhizophora</i> (Vel.) Joss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.: Fr.) Kummer = <i>Agaricus dealbatus</i> Sowerby	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe sinopica</i> (Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe squamulosa</i> (Pers. ex Fr.) Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe squamulosoides</i> Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Clitocybe suaveolens</i> (Schumach.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe subalutacea</i> (Batsch.: Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe trullaeformis</i> (Fr.) Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybe umbilicata</i> (Schff. ex Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2021
	<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Clitocybe</i> (Fr.) Staude, 1857	2013, 2021
	<i>Clitocybula lenta</i> (Maire) Malençon & Bertault = <i>Collybia lenta</i> (Maire) Maire = <i>Leucoinocybe lenta</i> (Maire) Singer = <i>Mycena lenta</i> Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Clitocybula</i> (Singer) Singer ex Métrod	2013, 2021
	<i>Clitopaxillus alexandri</i> (Gillet) G. Moreno, Vizzini, Consiglio & P. Alvarado = <i>Clitocybe alexandri</i> (Gillet) Konrad	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pseudoclitocybaceae</i> Género: <i>Clitopaxillus</i> G. Moreno et al.	2013, 2021
	<i>Clitopilus cystidiatus</i> Hauskn & Noordel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Clitopilus</i> (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm.	2021,
	<i>Clitopilus geminus</i> (Paulet) Noordel. & Co-David = <i>Rhodocybe gemina</i> (Paulet) Kuyper & Noordel. = <i>Rhodocybe gemina</i> (Paulet) Kuyper & Noordel. = <i>Rhodocybe truncata</i> (Quél.) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Clitopilus</i> (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm.	2013, 2021
	<i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk. & Br.) P. D. Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Clitopilus</i> (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm.	2013,
	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. ex Fr.) Kummer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Clitopilus</i> (Fr. ex Rabenh.) P. Kumm.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Collybia cirrhata</i> (Schumach.) Quél. * = <i>Agaricus amanitae</i> Batsch = <i>Agaricus cirrhatus</i> (Pers.) Fr. = <i>Collybia amanitae</i> (Batsch) Kreisel = <i>Collybia cirrata</i> (Schumach.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Collybia</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Collybia fusipes</i> (Bull.: Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Collybia</i> (Fr.) Staude	2013,
	<i>Collybia marasmioides</i> (Britz.) Bresinsky & Stangl	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Collybia</i> (Fr.) Staude	2013,
	<i>Coltricia perennis</i> (L.) Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Coltricia</i> Gray	2013, 2021
	<i>Colus hirudinosus</i> Cavalier & Sechier = <i>Clathrus hirudinosus</i> (Cavalier & Séchier) Tul.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Colus</i> Cavalier & Séchier	2013, 2021
	<i>Comatricha alta</i> Preuss, 1851 = <i>Comatricha alta</i> var. <i>macrospora</i> Y. Yamam., 1998 ≡ <i>Comatricha nigra</i> subsp. <i>alta</i> (Preusz) G. Lister ≡ <i>Comatricha nigra</i> var. <i>alta</i> (Preuss) G. Lister, 1911	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Comatricha</i> Preuss, 1851	2013 -
	<i>Comatricha elegans</i> (Racib.) G. Lister, 1909 = <i>Rostafinskia elegans</i> Racib.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Comatricha</i> Preuss, 1851	2006
	<i>Comatricha laxa</i> Rostaf., 1874 = <i>Badhamia penetrans</i> Cooke & Ellis, 1876 = <i>Comatricha ellisiana</i> (Cooke) Ellis & Everh., 1891 = <i>Comatricha ellisii</i> Morgan, 1894	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Comatricha</i> Preuss, 1851	2006
	<i>Comatricha nigra</i> (Pers.) = <i>Stemonitis nigra</i> Pers.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Comatricha</i> Preuss, 1851	2006
	<i>Coniochaeta pulveracea</i> (Ehrh.) Munk = <i>Coniomela pulveracea</i> (Ehrh.) Kirschst. = <i>Psilosphaeria pulveracea</i> (Ehrh.) Stev. = <i>Rosellinia pulveracea</i> (Ehrh.) Fuckel = <i>Sphaeria pulveracea</i> Ehrenb.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Coniochaetales</i> Familia: <i>Coniochaetaceae</i> Género: <i>Coniochaeta</i> (Sacc.) Cooke, 1887	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Coniophora arida</i> f. <i>hyphis-incrustatis</i> S. Lundell & J. A. Åberg	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Coniophoraceae</i> Género: <i>Coniophora</i> DC.	2013, 2021
	<i>Coniophora olivacea</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Coniophora atrocineria</i> P. Karst. = <i>Coniophora brunneola</i> (Berk. & M. A. Curtis) Cooke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Coniophoraceae</i> Género: <i>Coniophora</i> DC.	2013, 2021
	<i>Coniothyrium glycines</i> (R.B.Stewart) Verkley & Gruyter = <i>Phoma glycinicola</i> Gruyter & Boerema	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Dothideomycetes</i> Orden: <i>Pleosporales</i> Familia: <i>Coniothyriaceae</i> Género: <i>Coniothyrium</i> Corda, 1840	2013 -
	<i>Conocybe ambigua</i> Watling = <i>Conocybe siliginea</i> var. <i>ambigua</i> Kühner = <i>Galera ambigua</i> (Kühner) J. E. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe apala</i> var. <i>apala</i> (Fr: Fr.) Arnolds	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013
	<i>Conocybe coprophila</i> (Kühner) Kühner ≡ <i>Galera coprophila</i> Kühner = <i>Pholiotina coprophila</i> (Kühner) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe deliquescens</i> Hauskn. & Krisai = <i>Galeropsis lateritia</i> (Watling) G.Moreno, Heykoop & Illana	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe dentatmarginata</i> Watling ≡ <i>Pholiotina dentatmarginata</i> (Watling) Enderle	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe farinacea</i> Watl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013
	<i>Conocybe filaris</i> (Fr.) Kühner * ≡ <i>Agaricus togularis</i> var. <i>filaris</i> Fr. = <i>Dryophila togularis</i> = <i>Galera pusilla</i> Quel. = <i>Pholiota pusilla</i> (Quél.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe fimetaria</i> Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Conocybe macrocephala</i> Kühner & Watling = <i>Conocybe abruptibulbosa</i> Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe pilosella</i> (Pers.) Kühner = <i>Agaricus pilosellus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2021
	<i>Conocybe pinetorum</i> Watling, Esteve-Raventós & G. Moreno	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2021
	<i>Conocybe pulchella</i> (Velen.) Hauskn. & Svrček = <i>Conocybe pseudopilosella</i> Kühner & Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe rickenii</i> (Jul. Schäff.) Kühner = <i>Conocybe rickenii</i> (Jul. Schäff.) Arnolds = <i>Conocybe siliginea</i> f. <i>rickenii</i> (Jul. Schäff.) Arnolds ≡ <i>Galera rickenii</i> Jul. Schäff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013 -
	<i>Conocybe rugosa</i> (Peck) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2021
	<i>Conocybe semiglobata</i> Kühn & Watl. Kühn. Ex	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013
	<i>Conocybe tenera</i> (Schaeff.) Fayod = <i>Agaricus tener</i> Schaeff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013, 2021
	<i>Contumyces rosellus</i> (M.M.Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni = <i>Marasmiellus rosellus</i> (M.M.Moser) Kuyper & Noordel = <i>Omphalina carnicolor</i> P.D.Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Rickenellaceae</i> Género: <i>Contumyces</i> Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni	2013 -
	<i>Coprinellus congregatus</i> (Bull.) P. Karst. = <i>Coprinus congregatus</i> (Bull.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Coprinellus curtus</i> (Kalchbr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson ≡ <i>Coprinus curtus</i> Kalchbr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinellus domesticus</i> (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson = <i>Coprinus domesticus</i> (Bolton) Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2013 - 2021
	<i>Coprinellus flocculosus</i> (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson = <i>Coprinus flocculosus</i> (DC.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinellus radians</i> (Fr.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson ≡ <i>Coprinus radians</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinellus silvaticus</i> (Peck) Gminder ≡ <i>Coprinus silvaticus</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinellus truncorum</i> (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus truncorum</i> (Scop.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2021
	<i>Coprinellus xanthothrix</i> (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson ≡ <i>Coprinus xanthothrix</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinellus</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinopsis acuminata</i> (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus acuminatus</i> (Romagn.) P. D. Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 - 2021
	<i>Coprinopsis cordispora</i> (T. Gibbs) Watling & M. J. Richardson * ≡ <i>Coprinopsis cordispora</i> (T. Gibbs) Gminder ≡ <i>Coprinus cordisporus</i> T. Gibbs = <i>Coprinus volvaceominimus</i> Crossl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinopsis erythrocephala</i> (Lév.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus erythrocephalus</i> (Lév.) Fr	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Coprinopsis gonophylla</i> (Quél.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo ≡ <i>Coprinus gonophyllus</i> Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinopsis lagopides</i> (P. Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo ≡ <i>Coprinus lagopides</i> P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 - 2021
	<i>Coprinopsis lagopus</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus lagopus</i> (Fr.) Fr. = <i>Coprinus lagopus</i> subsp. <i>macrospermus</i> Romagn., 1945	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 - 2021
	<i>Coprinopsis macrocephala</i> (Berk.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus macrocephalus</i> Berk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2021
	<i>Coprinopsis marcescibilis</i> (Britzelm.) Örstadius & E.Larss. = <i>Psathyrella marcescibilis</i> (Britzelm.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinopsis strossmayeri</i> (Schulzer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo ≡ <i>Coprinus strossmayeri</i> Schulzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 - 2021
	<i>Coprinopsis vermiculifer</i> (Joss. ex Dennis) Redhead, Vilgalys & Moncalvo = <i>Coprinus vermiculifer</i> Joss., 1944	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Coprinus alopecia</i> Lasch ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Coprinus comatus</i> (Müell.: Fr.) Gray = <i>Coprinus comatus</i> var. <i>radicosum</i> . (Müll.: Fr.) S. F. Gray.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. ex Fr.) S. F. Gray.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Coprinus lagopus</i> (Fr.) Fr. fo.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Coprinus niveus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Coprinus phlyctidosporus</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013,
	<i>Coprinus picaceus</i> (Bull. ex Fr.) Gray.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Coprinopsis</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Coprinus vosoustii</i> Pilát. ≡ <i>Coprinus sterquilinus</i> var. <i>vosoustii</i> (Pilát) Šebek = <i>Coprinus vosoustii</i> var. <i>steppicola</i> Kalamees	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Coprinus</i> Pers., 1797	2021
	<i>Coriolopsis gallica</i> (Fr.) Ryvarden = <i>Boletus favus</i> Bull. = <i>Cerrena gallica</i> (Fr.) Zmitr = <i>Funalia extenuata</i> (Durieu & Mont.) Domański = <i>Funalia gallica</i> (Fr.) Bondartsev & Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Coriolopsis</i> Murrill, 1905	2021
	<i>Corticium meridioroseum</i> Boidin & Lanq. = <i>Corticium medioroseum</i> Boidin & Lanq., 1983 ≡ <i>Laeticorticium meridioroseum</i> (Boidin & Lanq.) M. Dueñas & Tellería	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Corticium</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Corticium polygonioides</i> M. J. Larsen & Gilb.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Corticium</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Corticium roseum</i> Pers. ≡ <i>Aleurodiscus roseus</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. ≡ <i>Hyphoderma roseum</i> (Pers.) Fuckel, 1870 ≡ <i>Laeticorticium roseum</i> (Pers.) Donk ≡ <i>Lyomyces roseus</i> (Pers.) P. Karst. ≡ <i>Thelephora rosea</i> (Pers.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Corticium</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Cortinarius addamascenus</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.) Fr. ≡ <i>Agaricus alboviolaceus</i> Pers. = <i>Gomphos alboviolaceus</i> (Pers.) Kuntze = <i>Inoloma alboviolaceum</i> (Pers.) Kumm. = <i>Phlegmacium alboviolaceum</i> (Pers. ex Fr.) Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius alcalinophilus</i> Hry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius aleuriusmus</i> Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius anomaellus</i> (Fr.) Fr. = <i>Cortinarius azureus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius aprinus</i> Melot	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius araneosolvatus</i> (Bon & Gaugué) Melot = <i>Cortinarius diosmus</i> var. <i>araneosolvatus</i> Bon & Gaugué	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius arquatus</i> (Alb. & Schwein.) Fr. ≡ <i>Agaricus arquatus</i> Alb. & Schwein. = <i>Cortinarius cookianus</i> Rob. Henry = <i>Cortinarius xanthochrous</i> P. D. Orton = <i>Myxadium arquatum</i> (Alb. & Schwein.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius assiduus</i> (Mahiques, A. Ortega yBidaud)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius atratus</i> (Rodway) Gasparini = <i>Hymenogaster luteus</i> (Masse) G.Cunn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius atrovirens</i> Kalchbr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius aurilicis</i> Chevassut yTrescol	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius balteatocumatilis</i> Rob. Henry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius belleri</i> M. M. Moser = <i>Cortinarius longisporus</i> Beller	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius bovinus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers.) Fr..	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius caeruleus</i> (Schaeff.) Fr. = <i>Cortinarius caesiocyaneus</i> Britzelm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius caesiocanescens</i> Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius caesiocortinatus</i> Jul. Schäff. = <i>Cortinarius caesiocortinatus</i> f. <i>bulbolatens</i> (Chevassut & Rob. Henry) E. Campo & Vizzini	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius caesiostramineus</i> Rob. Henry = <i>Cortinarius caesiostramineus</i> var. <i>cadinos-aguirrei</i> Moënné-Locc. & A. Ortega	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius caligatus</i> Malençon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius callochrous</i> (Pers.) Gray = <i>Cortinarius calochrous</i> Pers., 1821 = <i>Cortinarius calochrous</i> var. <i>caroli</i> (Velen.) Nezd. ss. Brandr. et al. = <i>Cortinarius haasii</i> var. <i>quercus-ilicicola</i> A. Ortega, Suár. -Sant. & J. D. Reyes	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius caperatus</i> (Pers.) Fr. = <i>Rozites caperatus</i> (Pers.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius catharinae</i> Consiglio	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius cedretorum</i> Maire = <i>Cortinarius cedretorum</i> Maire var. <i>xerophyllum</i> . = <i>Cortinarius cedretorum</i> subsp. <i>cedretorum</i> Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius chrysolitus</i> Kauffman = <i>Dermocybe palustris</i> M. M. Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius cinereobrunneolus</i> Chevassut & Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.) Gray ≡ <i>Agaricus cinnamomeus</i> L. = <i>Agaricus fucatophyllus</i> Lasch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius cistohelvelloides</i> Bon ≡ <i>Cortinarius scobinaceus</i> var. <i>cistohelvelloides</i> (Bon) A. Ortega & Esteve-Rav.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius cistophilus</i> RobHenry & Contu	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius claroflavus</i> Rob. Henry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius coerulescentium</i> Rob. Henry = <i>Cortinarius caerulescentium</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius collinitus</i> (Sowerby) Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius contui</i> Rob. Henry & Contu	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius croceocoeruleus</i> (Pers.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.) Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius damascenus</i> Fr. = <i>Gomphos damascenus</i> (Fr.) Kuntze = <i>Hydrocybe damascena</i> (Fr.) Wünsche = <i>Hydrocybe damascena</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. ex Fr.) Fr. = <i>Cortinarius sertipes</i> Kühner = <i>Cortinarius flexipes</i> f. <i>sertipes</i> (Kühner) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr. = <i>Cortinarius berlesianus</i> Sacc. & Cuboni = <i>Cortinarius delibutus</i> f. <i>achromophyllus</i> Rob. Henry = <i>Cortinarius delibutus</i> f. <i>decurrentifolius</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius diffractusuavis</i> Chevassut & R. Henry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius dionysae</i> (Rob. Henry)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius diosmus</i> (Kühner)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius elatior</i> Fr. = <i>Agaricus elatus</i> Pers., 1801 = <i>Cortinarius elatior</i> f. <i>griseolividus</i> Reumaux = <i>Cortinarius elatior</i> var. <i>albipes</i> Miyauchi	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius erythrinus</i> (Fr.) Fr. = <i>Agaricus caesius</i> subsp. <i>erythrinus</i> Fr. = <i>Agaricus castaneus</i> var. <i>erythrinus</i> Fr. = <i>Cortinarius decipiens</i> var. <i>erythrinus</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius fasciatus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius flexipes</i> (Pers.) Fr. = <i>Agaricus flabellus</i> Fr. = <i>Cortinarius flabellus</i> (Fr.) Fr. = <i>Cortinarius flabellus</i> f. <i>biolens</i> Bidaud	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius fulvescens</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius fulvo-ochrascens</i> Hry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius furtimornatus</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius gentianeus</i> Bidaud ≡ <i>Cortinarius caesiostamineus</i> var. <i>gentianeus</i> (Bidaud) A. Ortega & Mahiques	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius glaucopus</i> (Schaeff.) Gray = <i>Agaricus defossus</i> Batsch ≡ <i>Agaricus glaucopus</i> Schaeff. = <i>Agaricus subcyaneus</i> Batsch = <i>Cortinarius fibrosipes</i> Britzelm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius harrisii</i> M. M. Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius hinnuleus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius holophaeus</i> Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius humolens</i> Brandrud = <i>Cortinarius claroflavus</i> Moser = <i>Phlegmacium claroflavum</i> (Moser) Moser ex Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius ianuarius</i> Franchi & M. Marchetti, 2006	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius infractus</i> (Pers.) Fr. = <i>Cortinarius infractus</i> Berk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius inocyboides</i> (Velen.) G. Garnier ≡ <i>Telamonia inocyboides</i> Velen.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius inolens</i> (H. Lindstr.) Bidaud ≡ <i>Cortinarius flexipes</i> var. <i>inolens</i> H. Lindstr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius inusitatus</i> A. Ortega, Bidaud, Suár. -Sant. & Vila	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius ionochlorus</i> Maire = <i>Cortinarius atrovirens</i> var. <i>ionochlorus</i> (Maire) Vizzini y Gasparini	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius lebretonii</i> Quél. ≡ <i>Cortinarius azureus</i> var. <i>lebretonii</i> (Quél.) Quél. ≡ <i>Cortinarius spilomeus</i> var. <i>lebretonii</i> (Quél.) Quél. ≡ <i>Gomphos lebretonii</i> (Quél.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius lilacinovelatus</i> Reumaux & Ramm	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius livido-ochraceus</i> (Berk.) Berk. = <i>Cortinarius elatior</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius mediterraneensis</i> Fernández-Brime. S., Vila, J. & Ortega, A.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius misermonitii</i> Chevassut & Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius mucifluoides</i> Rob. Henry exBidaud, Moëgne -Locc. & Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius mucifluus</i> Fr. = <i>Cortinarius pinicola</i> P. D. Orton ≡ <i>Gomphos mucifluus</i> (Fr.) Kuntze ≡ <i>Myxadium mucifluum</i> (Fr.) Wünsche	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.) Cooke.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius murellensis</i> Cors. Gut. Ballardara, Cadiñanos, Palazón y Mahiques	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius obscurocyaneus</i> (Secretan ex J. Schroter) Bid.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius olidoamarus</i> A. Favre = <i>Cortinarius olidoamarus</i> var. <i>valentinus</i> Mahiques & A. Favre	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius pallescens</i> Moëgne -Locc. & Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius pansa</i> Fr. = <i>Agaricus infractus</i> var. <i>pansa</i> (Fr.) Fr. = <i>Cortinarius glaucopus</i> var. <i>pansa</i> Fr. = <i>Phlegmacium pansa</i> (Fr.) Blytt	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius parasuaveolens</i> (Bon & Trescol) Bidaud	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius percomis</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius phoeniceus</i> (Bull.) Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius piceae</i> Frøslev, T. S. Jeppesen & Brandrud = <i>Cortinarius calochrous</i> var. <i>coniferarum</i> (M. M. Moser) Quadr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius praetermissus</i> Bergeron ex Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius prasinus</i> (Sch.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius purpurascens</i> Fr. = <i>Cortinarius subpurpurascens</i> (Batsch) Fr	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius quercilicis</i> A. Ortega, Suár. -Sant	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius rapaceotomentosus</i> Delaporte & Eyssart. = <i>Cortinarius rapaceotomentosus</i> var. <i>violaceotinctus</i> Delaporte & Eyssartier.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021,
	<i>Cortinarius rickenii</i> Rob. Henry ex Bidaud, Moënné-Locc. & Reumaux ≡ <i>Cortinarius rickenii</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius riederi</i> (Weinm.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius rigens</i> (Pers.) Fr. = <i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> (Pers.) Fr. = <i>Cortinarius rufo-olivaceus</i> var. <i>vinosus</i> Moënné-Locc. & Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius saginus</i> (Fr.) Fr. = <i>Cortinarius subtriumphans</i> Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius salor</i> (Fr.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius sancti-felicitis</i> Frøslev & T. S. Jeppesen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius sanguineus</i> (Wulfen) Gray = <i>Dermocybe sanguinea</i> (Wulfen) Wünsche	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius saniosus</i> (Fr.) Fr. ≡ <i>Agaricus saniosus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius saporatus</i> Britz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius scobinaceus</i> Maleçon & Bertault = <i>Cortinarius scobinaceus</i> var. <i>volvatus</i> Torrejón	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet = <i>Dermocybe semisanguinea</i> (Fr.) M. M. Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius sodagnitus</i> Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius sommerfeltii</i> Hoiland = <i>Cortinarius cinnamomeobadius</i> Henry sensu Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius splendens</i> Hry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius strenuipes</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius subargentatus</i> P. D. Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius subcaninus</i> (Maire)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius subcotoneus</i> Bidaud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius subelator</i> Bidaud, Moëgne-Loec. & Reumaux = <i>Cortinarius subelator</i> f. <i>ochraceoflavescens</i> Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius suberythrinus</i> Moëgne-Loec. = <i>Cortinarius suberythrinus</i> var. <i>geraniolens</i> Moëgne-Loec. & Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius subfulgens</i> P. D. Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius subglobispermus</i> Bidaud & Reumaux = <i>Cortinarius sulfurinus</i> R. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2022
	<i>Cortinarius subinsignis</i> Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius subsafranopes</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius subsordescens</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius subtribulosus</i> (Kizlik yTrescol)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius subvariiformis</i> Bidaud	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius sulphurinus</i> Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius talus</i> Fr. ≡ <i>Cortinarius melliolens</i> Jul. Schäff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius terpsichores</i> Melot = <i>Cortinarius terpsichores</i> var. <i>calosporus</i> Melot	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr.) Fr. = <i>Agaricus torvus</i> Bull. = <i>Cortinarius torvus</i> var. <i>nobilis</i> Peck = <i>Gomphos torvus</i> (Fr.) Kuntze = <i>Hydrocybe torva</i> (Fr.) M. M. Moser = <i>Telamonia torva</i> (Fr.) Wünsche	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius tricognandus</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013 -
	<i>Cortinarius triformis</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius trivialis</i> J. E. Lange = <i>Cortinarius collinitus</i> var. <i>repandus</i> (Ricken) R. Henry ≡ <i>Cortinarius collinitus</i> var. <i>trivialis</i> (J. E. Lange) A. H. Sm. = <i>Cortinarius trivialis</i> var. <i>rickenii</i> Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius uraceonemoralis</i> Niskanen, Liimat., Dima, Kytöv. Bojantchev y H. Lindstr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius van-campiae</i> Consiglio	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius varicolor</i> (Pers.: Fr.) Fr. = <i>Cortinarius variicolor</i> var. <i>nemorensis</i> Fr. = <i>Cortinarius nemorensis</i> (Fr.) J. E. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius variiformis</i> Malençon. ≡ <i>Cortinarius variiformis</i> var. <i>luteocingulatus</i> (Bidaud & Fillion) Bidaud ≡ <i>Cortinarius caligatus</i> f. <i>variiformis</i> (Malençon) A. Ortega & Mahiques	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius varius</i> (Schaeff.) Fr. = <i>Agaricus crustuliniformis</i> Bull. = <i>Agaricus dasypodius</i> Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius venetus</i> Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius vernus</i> H. Lindstr. & Melot	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius vibratilis</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Cortinarius violaceipes</i> Bidaud & Consiglio	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius viridocoeruleus</i> Chevassut & Rob. Henry = <i>Cortinarius versicolorum</i> Rob. Henry.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Cortinarius viscidoamarus</i> A. Ortega & Suár. Sant. & Vila,.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021,
	<i>Cortinarius xanthophylus</i> (Cooke) Rob. Henry	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cortinarius xerophilus</i> Rob. Henry & Contu = <i>Cortinarius subcaninus</i> var. <i>xerophilus</i> (Rob. Henry & Contu) A. Ortega.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Cortinarius</i> (Pers.) Gray, 1821	2021
	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers. = <i>Agaricus cinereus</i> Batsch = <i>Cantharellus cornucopiae</i> Wallr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Craterellus</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Craterium dictyosporum</i> (Rostaf.) H. Neubert, Nowotny & K. Baumann, 1995 ≡ <i>Badhamia dictyospora</i> Rostaf., 1876 = <i>Craterium obovatum</i> var. <i>dictyosporum</i> (Rostaf.) G. Moreno & Illana, 1993	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Craterium</i> Trentep., 1797	2006
	<i>Craterium leucocephalum</i> (Pers. Ex J. F. Gmel.) Ditmar, 1813 = <i>Stemonitis leucocephala</i> Pers.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Craterium</i> Trentep., 1797	2006
	<i>Craterium minutum</i> (Leers) Fries. = <i>Peziza minuta</i> Leers	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Craterium</i> Trentep., 1797	2006
	<i>Crepidotus applanatus</i> (Pers.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Crepidotus calolepis</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Crepidotus calolepis</i> var. <i>squamulosus</i> (Cout.) Senn-Irlet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Crepidotus caspari</i> Velen. = <i>Crepidotus lundellii</i> Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Crepidotus cesatii</i> (Rabenh.) Sacc. = <i>Agaricus variabilis</i> var. <i>sphaerosporus</i> Pat. = <i>Claudopus sphaerosporus</i> (Pat.) Sacc. = <i>Crepidotus sphaerosporus</i> (Pat.) J.E.Lange = <i>Crepidotus cesatii</i> var. <i>gothoburgensis</i> Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Crepidotus herbarum</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Crepidotus luteolus</i> Sacc. = <i>Agaricus luteolus</i> Lambotte = <i>Claudopus terricola</i> Britzelm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.) Staude	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers. ex Fr.) Gray.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Crepidotus</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Cribraria argillacea</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1794 = <i>Cribraria vulgaris</i> var. <i>argillacea</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) Amo, 1870	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Cribrariaceae</i> Género: <i>Cribraria</i> Pers.	2006
	<i>Cribraria aurantiaca</i> Schrad. (1797)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Cribrariaceae</i> Género: <i>Cribraria</i> Pers.	2006
	<i>Cribraria cancellata</i> (Batsch) Nann. -Bremek. 1975	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Cribrariaceae</i> Género: <i>Cribraria</i> Pers.	2006
	<i>Cribraria oregana</i> H. C. Gilbert, (1932) = <i>Cribraria montana</i> Nann. -Bremek., 1973	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Cribrariaceae</i> Género: <i>Cribraria</i> Pers.	2006
	<i>Cribraria violacea</i> . Rex.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Cribrariaceae</i> Género: <i>Cribraria</i> Pers.	2006
	<i>Crinipellis mauretanica</i> Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Crinipellis</i> Pat., 1889	2021
	<i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schw.: Fr.) Kuyp. = <i>Crinipellis stipitaria</i> (Fr.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Crinipellis</i> Pat., 1889	2013, 2021
	<i>Crinipellis subtomentosa</i> (Peck) Singer = <i>Crinipellis mauretanica</i> Maire = <i>Crinipellis subtomentosa</i> var. <i>mauretanica</i> (Maire) Singer & Hauskn. ≡ <i>Marasmius subtomentosus</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Crinipellis</i> Pat., 1889	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cristinia helvetica</i> (Pers.) Parmasto = <i>Corticium helveticum</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. = <i>Grandinia terrestris</i> (P.Karst.) P.Karst. = <i>Odontia terrestris</i> P.Karst. = <i>Stereum helveticum</i> (Pers.) E.H.L.Krause	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Stephanosporaceae</i> Género: <i>Cristinia</i> Parmasto	2013 -
	<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly = <i>Crucibulum crucibuliforme</i> (Schaeff.) Hoffm. = <i>Crucibulum laeve</i> var. <i>cyathiforme</i> Cejp	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Crucibulum</i> Tul. & C.Tul.	2021
	<i>Crustoderma corneum</i> (Bourdot & Galzin) Nakasone = <i>Phlebia cornea</i> (Bourdot & Galzin) Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Crustoderma</i> Parmasto	2013 -
	<i>Crustoderma dryinum</i> (Berk. & M.A.Curtis) Parmasto = <i>Coniophora crocea</i> P.Karst. = <i>Coniophora dryina</i> (Berk. & M.A.Curtis) Burt = <i>Coniophora laeticolor</i> (P.Karst.) P.Karst. = <i>Coniophorella laeticolor</i> (P.Karst.) Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Crustoderma</i> Parmasto	2013 -
	<i>Cuphomphyllus pratensis</i>	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Cuphomphyllus</i> (Donk) Bon	2013 -
	<i>Cuphomphyllus niveus</i> (Fr.) Bon. = <i>Cuphomphyllus niveus</i> for. <i>roseipes</i> (Masse) M. Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Cuphomphyllus</i> (Donk) Bon	2013, 2021
	<i>Cuphomphyllus pratensis</i> (Fr.) Bon = <i>Hygrocybe pratensis</i> (Pers.) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Cuphomphyllus</i> (Donk) Bon	2013 -
	<i>Cuphomphyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko = <i>Camaromphyllus niveus</i> (Scop.) P. Karst. = <i>Hygrocybe virginea</i> (Wulfen) P. D. Orton & Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Cuphomphyllus</i> (Donk) Bon	2013, 2021
	<i>Cyanosporus subcaesius</i> (A.David) B.K.Cui, L.L.Shen & Y.C.Dai = <i>Postia subcaesia</i> (A.David) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Cyanosporus</i>	2013 -
	<i>Cyathipodia villosa</i> (Hedw. ex O. Kuntze) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cyathus olla</i> Batsch ex Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cyathus</i> Haller, 1768	2013, 2021
	<i>Cyathus stercoreus</i> (Schwein.) DeToni = <i>Cyathia stercorea</i> (Schwein.) V. S. White = <i>Cyathodes lessueurii</i> (Tul. & C. Tul.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cyathus</i> Haller, 1768	2013, 2021
	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.: Pers.) Willd.: Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cyathus</i> Haller, 1768	2021
	<i>Cyclocybe aegerita</i> (V. Brig.) Vizzini = <i>Agrocybe aegerita</i> (V. Brig.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Cyclocybe</i> Velen.	2013 -
	<i>Cystidiopostia hibernica</i> (Berk. & Broome) B.K.Cui, L.L.Shen & Y.C.Dai = <i>Postia hibernica</i> (Berk. & Broome) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Cystidiopostia</i>	2013 -
	<i>Cystoagaricus sylvestris</i> (Gillet) Örstadius & E.Larss. = <i>Psathyrella populina</i> (Britzelm.) Kits van Wav.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Cystoagaricus</i> Singer	2013 -
	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scopoli ex Fr.) Fayod. = <i>Cystoderma amianthinum</i> var. <i>rugosorreticulatus</i> (F. Lorinser) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystoderma</i> Fayod1889	2013, 2021
	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fayod = <i>Agaricus carcharias</i> Pers. = <i>Agaricus granulatus</i> var. <i>carcharias</i> (Pers.) Fr. = <i>Armillaria carcharias</i> (Pers.) Kauffman = <i>Cystoderma carcharias</i> f. <i>album</i> (Fr.) A.H.Sm. & Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystoderma</i> Fayod1889	2013 -
	<i>Cystoderma cinnabarinum</i> (Alb. & Schwein.) Fayod.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystoderma</i> Fayod1889	2021
	<i>Cystoderma granucorum</i> (Batsch.) Fayod.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystoderma</i> Fayod1889	2021
	<i>Cystoderma jasonis</i> (Cooke & Massee) Harmaja ≡ <i>Agaricus jasonis</i> Cooke & Massee = <i>Armillaria jasonis</i> (Cooke & Massee) Sacc. = <i>Cystoderma amianthinum</i> var. <i>longisporum</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystoderma</i> Fayod1889	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Cystoderma terryi</i> (Berk. & Br.) Harmaja = <i>Cystoderma cinnabarinum</i> (Alb. & Schw. ex Secr.) Fayod	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystoderma</i> Fayod1889	2013, 2021
	<i>Cystodermella granulosa</i> (Batsch) Harmaja = <i>Cystoderma granulorum</i> (Batsch) Fayod	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystoderma</i> Fayod1889	2013 -
	<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon = <i>Agaricus seminudus</i> Lasch = <i>Agaricus seminudus</i> var. <i>lilacinus</i> Quél. = <i>Cystoderma seminudum</i> (Lasch) Fayod = <i>Cystolepiota morieri</i> (Gillet) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Cystolepiota</i> Singer	2013 -
	<i>Cyrtidiella nitidula</i> (P.Karst.) Zmitr. = <i>Phlebia nitidula</i> (P.Karst.) Ryvarden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Cyrtidiella</i> Pouzar	2013 -
	<i>Cytospora populina</i> (Pers.) Rabenh. = <i>Valsa ambiens</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Diaporthales</i> Familia: <i>Valsaceae</i> Género: <i>Cytospora</i> Ehrenb., 1818	2013 -
D			
	<i>Dacrymyces chrysocomus</i> (Bull.) Tul. = <i>Guepiniopsis chrysocoma</i> (Bull.) Brasf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Dacrymyces</i> Nees, 1816	2013 -
	<i>Dacrymyces ovisporus</i> Bref. = <i>Dacryomyces ovisporus</i> Bref.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Dacrymyces</i> Nees, 1816	2013 -
	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees = <i>Arrhytidia involuta</i> var. <i>bolivensis</i> Lowy = <i>Calloria stillata</i> (Nees) Fr. = <i>Dacrymyces abietinus</i> (Pers. ex Pers.) Schroet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Dacrymyces</i> Nees, 1816	2013, 2021
	<i>Dacrymyces variisporus</i> McNabb = <i>Dacrymyces variesporus</i> Mc Nabb	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Dacrymyces</i> Nees, 1816	2013 -
	<i>Dacryobolus karstenii</i> (Bres.) Oberw. ex Parmasto = <i>Lloydella karstenii</i> (Bres.) Höhn. & Litsch. = <i>Peniophora crassa</i> Peck = <i>Phanerochaete karstenii</i> (Bres.) P.Karst. = <i>Stereum karstenii</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Dacryobolus</i> Fr.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Dacryobolus sudans</i> (Alb. & Schwein.) Fr. = <i>Gloeocystidium exsudans</i> (P.Karst.) P.Karst. = <i>Grandinia agardhii</i> (Fr.) Fr. = <i>Hydnum agardhii</i> Fr. = <i>Hydnum sudans</i> Alb. & Schwein.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Dacryobolus</i> Fr.	2013 -
	<i>Daedalea quercina</i> (L.) Pers. = <i>Agarico-suber daedaleum</i> Paulet = <i>Agaricus antiquus</i> Willd. = <i>Agaricus dubius</i> Schaeff., 1774	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Daedalea</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolton) J.Schröt. = <i>Agaricus confragosus</i> (Bolton) Murrill = <i>Boletus angustatus</i> Sowerby = <i>Boletus labyrinthiformis</i> Bull. ex St.-Amans = <i>Daedalea intermedia</i> Berk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Daedaleopsis</i> J.Schröt.	2013 -
	<i>Daedaleopsis nitida</i> (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva = <i>Hexagonia nitida</i> Durieu & Mont.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Daedaleopsis</i> J.Schröt.	2013, 2021
	<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer = <i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bull.) Bondartsev & Singer = <i>Lenzites tricolor</i> Bourd. & Galz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Daedaleopsis</i> J.Schröt.	2021
	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton) Ces. & DeNot. = <i>Daldinia atra</i> (Schaeff.) KnutWöldecke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Xylariales</i> Familia: <i>Hypoxylaceae</i> Género: <i>Daldinia</i> Ces. & De Not., 1863	2013, 2021
	<i>Deconica crobula</i> (Fr.) Romagn. = <i>Psilocybe crobula</i> (Fr.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Deconica</i> (W.G.Sm.) P.Karst.	2013 -
	<i>Dendrocorticium ionides</i> (Bres.) M.J.Larsen & Gilb. = <i>Laeticorticium jonides</i> (Bres.) Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Dendrocorticium</i> M.J.Larsen & Gilb.	2013 -
	<i>Dendrocorticium polygonioides</i> (P.Karst.) M.J.Larsen & Gilb. = <i>Laeticorticium polygonioides</i> (P.Karst.) Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Dendrocorticium</i> M.J.Larsen & Gilb.	2013 -
	<i>Dentiporus albidoides</i> (A. David & Dequatre) Audet = <i>Antrodia albidoides</i> A. David & Dequatre	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Dentiporus</i>	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Diachea leucopodia</i> (Bull.) Rost. af. Mon. 190. (1874) = <i>Trichia leucopodia</i> Bull., (1791)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Diachea</i> Fr., 1825	2006
	<i>Dianema harveyi</i> Rex, 1891 = <i>Dianema harveyi</i> var. <i>verruculatum</i> Y.Yamam., 2000	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Dianemataceae</i> Género: <i>Dianema</i> Rex	2013 -
	<i>Dichomitus squalens</i> (P. Karst.) D. A. Reid ≡ <i>Bjerkandera squalens</i> (P. Karst.) P. Karst. = <i>Coriolellus anceps</i> (Peck) Parmasto ≡ <i>Coriolellus squalens</i> (P. Karst.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Dichomitus</i> D.A.Reid	2013, 2021
	<i>Diderma asteroides</i> (Lister & G.Lister) G.Lister, 1911 ≡ <i>Chondrioderma asteroides</i> Lister & G.Lister, 1902 = <i>Diderma asteroides</i> var. <i>luteum</i> Meyl., 1921 = <i>Diderma nigrum</i> Kowalski, 1968	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Diderma</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Diderma cinereum</i> Morgan , 1984 ≡ <i>Chondrioderma cinereum</i> (Morgan) Torrend, 1908	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Diderma</i> Pers., 1794	2006
	<i>Diderma hemisphaericum</i> (Bull.) Hornem (1829) = <i>Reticularia hemisphaerica</i> Bull.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Diderma</i> Pers., 1794	2006
	<i>Diderma trevelyanii</i> (Grev.) Fr. Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 105 (1829) = <i>Lepidoderma trevelyanii</i> (Grev.) Poulain & Mar. Mey.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Diderma</i> Pers., 1794	2006
	<i>Diderma umbilicatum</i> Pers. 1801 ≡ <i>Cionium umbilicatum</i> (Pers.) Spreng., 1827	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Diderma</i> Pers., 1794	2006
	<i>Didymium clavus</i> (Alb. & Schwein.) Rabenh, 1844 = <i>Physarum clavus</i> Alb. & Schwein.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Didymium difforme</i> (Pers.) S. F. Gray, Nat. Arr. Buit. Pl. 1: 571. (1821)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Didymium dubium</i> Rst., Mon. 152. (1874.)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Didymium eximium</i> Peck, Ann.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Didymium laxifilum</i> (G. Lister & Ross) Lister,	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Didymium melanospermum</i> (Pers.) T.Macbr., 1899 = <i>Cionium farinaceum</i> (Schrad.) Gray, 1821 = <i>Cionium lobatum</i> Spreng., 1827 ≡ <i>Diderma melanospermum</i> (Pers.) Fr. = <i>Didymium calcipes</i> (Y.Yamam. & Shuang L.Chen) Oltra, 2011	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Didymium minus</i> (Lister) Morgan, 1894 ≡ <i>Didymium farinaceum</i> subsp. <i>minus</i> A. Lister	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Didymium nigripes</i> (Link) Fries, (1829).	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Didymium squamulosum</i> (Alb. & Schwein.) Fr. & Palmquist, 1818 = <i>Chondrioderma cookei</i> Rostaf., 1876 = <i>Cionium squamulosum</i> (Alb. & Schwein.) Spreng., 1827	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Didymium</i> Schrad., 1797	2006
	<i>Discina ancilis</i> (Pers.) Sacc. = <i>Gyromitra perlata</i> (Fr.) Harmaja	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Discinaceae</i> Género: <i>Discina</i> (Fr.) Fr.	2013 -
	<i>Disciseda bovista</i> (Klotzsch) Henn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Disciseda</i> Czern., 1845	2013
	<i>Ditiola radicata</i> Alb. & Schwein.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Dacrymycetes</i> Orden: <i>Dacrymycetales</i> Familia: <i>Dacrymycetaceae</i> Género: <i>Ditiola</i> Fr.	2013 -
E			
	<i>Echinoderma asperum</i> (Pers.) Bon = <i>Cystolepiota aspera</i> (Pers.) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Echinoderma</i> (Bon) Bon	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Echinoderma echinaceum</i> (J. E. Lange) Bon = <i>Cystolepiota echinacea</i> (J. E. Lange) Knudsen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Echinoderma</i> (Bon) Bon	2021
	<i>Echinostelium minutum</i> deBary, 1874 = <i>Heimerleia hyaline</i> Höhn., 1903	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Echinosteliales</i> Familia: <i>Echinosteliaceae</i> Género: <i>Echinostelium</i> deBary ex Rostaf	2006
	<i>Efibula avellanea</i> (Bres.) Sheng H.Wu = <i>Phanerochaete avellanea</i> (Bres.) J.Erikss. & Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Efibula</i> Sheng H.Wu, 1990	2013 -
	<i>Efibula tuberculata</i> (P.Karst.) Zmitr. & Spirin = <i>Phanerochaete tuberculata</i> (P.Karst.) Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Efibula</i> Sheng H.Wu, 1990	2013 -
	<i>Elaphomyces anthracinus</i> Vittad. = <i>Elaphomyces anthracinus</i> f. <i>talosporus</i> A.Paz & Lavoise = <i>Elaphomyces plumbeus</i> Hesse = <i>Elaphomyces uliginosus</i> Hesse ≡ <i>Lycoperdastrum anthracinum</i> (Vittad.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Eurotiomycetes</i> Orden: <i>Eurotiales</i> Familia: <i>Elaphomycetaceae</i> Género: <i>Elaphomyces</i> Nees	2013 -
	<i>Enerthenema papillatum</i> (Pers.) Rost., 1876	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Enerthenema</i> Bowman	2006
	<i>Entoloma atrocoeruleum</i> Nordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma caelestinum</i> (Fr.) Hesler	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma cephalotrichum</i> (P.D.Orton) Noordel. = <i>Alboleptonia cephalotricha</i> (P.D.Orton) P.D.Orton = <i>Claudopus niveus</i> Velen. = <i>Eccilia nivea</i> Velen. ≡ <i>Leptonia cephalotricha</i> P.D.Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma chalybeum</i> (Pers.) Noordel. = <i>Entoloma chalybeum</i> var. <i>lazulinum</i> (p.) Noordel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Entoloma cistophilum</i> Trimbach.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma clandestinum</i> (Fr.) Noordel. = <i>Agaricus clandestinus</i> Fr. = <i>Agaricus mammosus</i> f. <i>tenuior</i> Fr. = <i>Latzinaea clandestina</i> (Fr.) Kuntze = <i>Rhodophyllus clandestinus</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma clypeatum</i> (L. ex Fr.) Kummer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma corvinum</i> (Kühner) Noordeloos.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma eulividum</i> Noordeloos.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma favrei</i> Noordel. = <i>Leptonia cinerascens</i> Velen.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma griseoluridum</i> (Kühner) M.M. Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma hebes</i> (Romagn.) Trimbach.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schumach.) M. M. Moser = <i>Nolanea hirtipes</i> (Schumach.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler = <i>Rhodophyllus euchlorus</i> (Lasch.: Fr.) Quél = <i>Agaricus carneovirescens</i> Jungh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma juncinum</i> (Kühner & Romagn.) Noordel. = <i>Nolanea juncea</i> Largent = <i>Nolanea juncina</i> (Kühner & Romagn.) P.D.Orton = <i>Rhodophyllus junceus</i> J.E.Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Entoloma lampropus</i> (Fr.) Hesler	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma lazulinellum</i> (Fr.) Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma lividoalbum</i> (Kühn. & Romagn.) Kub.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma lividum</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma luteum</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma mougeotii</i> (Fr.) Hesler = <i>Agaricus mougeotii</i> (Fr.) Fr. = <i>Eccilia mougeotii</i> (Fr.) Quél. = <i>Entoloma mougeotii</i> var. <i>fuscomarginatum</i> Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma nitens</i> (Velen.) Noordel. = <i>Entoloma nitens</i> var. <i>defibulatum</i> (Singer) Garrido ≡ <i>Nolanea nitens</i> Velen. = <i>Rhodophyllus nitens</i> (Velen.) Kühner & Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma phaeocyathus</i> Noordel. = <i>Eccilia tristis</i> Bres. = <i>Rhodophyllus rusticoides</i> subsp. ss Einhell. et al.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma pleopodium</i> (Bull.) Noordel. = <i>Entoloma icterinum</i> (Fr.) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma politum</i> (Fr.) Donk = <i>Eccilia pernitrosa</i> (P.D.Orton) P.D.Orton = <i>Leptonia pernitrosa</i> P.D.Orton = <i>Rhodophyllus politus</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma prunuloides</i> (Fr.) Quél. = <i>Entoloma autumnale</i> Velen. = <i>Entoloma inocybiforme</i> Bon = <i>Entoloma inopiliforme</i> Bon = <i>Rhodophyllus prunuloides</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) P.-Kumm. = <i>Entoloma nidorosum</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021
	<i>Entoloma rugosum</i> (Malençon) Bon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2021,
	<i>Entoloma saundersii</i> (Fr.) Sacc. = <i>Entoloma saundersii</i> var. <i>hiemale</i> (Lazzari & P. Blanco) Cetto.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma sericatum</i> (Britzelm.) Sacc. = <i>Rhodophyllus sericatus</i> (Britzelm.) J.Favre = <i>Rhodophyllus svrcekii</i> Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma sericeoides</i> (J.E.Lange) Noordel. = <i>Rhodophyllus sericeoides</i> J.E.Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull.) Quél. = <i>Entoloma sericeum</i> var. <i>cinereoopacum</i> Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma serrulatum</i> (Pers.: Fr.) Hesler.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Entoloma sinuatum</i> (Bull.) P.Kumm = <i>Entoloma eulividum</i> Noordel. = <i>Entoloma lividum</i> (Bull.) Quél. = <i>Rhodophyllus sinuatus</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Entoloma undatum</i> (Gillet) M.M.Moser = <i>Eccilia sericeonitida</i> P.D.Orton = <i>Entoloma sericeonitidum</i> (P.D.Orton) Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Entolomataceae</i> Género: <i>Entoloma</i> P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Erysiphe adunca</i> (Wallr.) Fr. = <i>Uncinula adunca</i> (Wallr.) Lév.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotimycetes</i> Orden: <i>Erysiphales</i> Familia: <i>Erysiphaceae</i> Género: <i>Erysiphe</i> R.Hedw. ex DC. 1805	2013 -
	<i>Erysiphe pisi</i> DC	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotimycetes</i> Orden: <i>Erysiphales</i> Familia: <i>Erysiphaceae</i> Género: <i>Erysiphe</i> R.Hedw. ex DC. 1805	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Erysiphe trifolii</i> Grev. = <i>Microsphaera trifolii</i> (Grev.) U.Braun = <i>Microsphaera trifolii</i> var. <i>trifolii</i> (Grev.) U.Braun	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotimycetes</i> Orden: <i>Erysiphales</i> Familia: <i>Erysiphaceae</i> Género: <i>Erysiphe</i> R.Hedw. ex DC. 1805	2013 -
	<i>Eutypa flavovirens</i> (Pers.) Tul. & C.Tul. = <i>Diatrype flavovirens</i> (Pers.) Fr. = <i>Hypoxyton flavovirens</i> (Pers.) J.Kickx f. = <i>Nemania flavovirescens</i> (Hoffm.) Gray = <i>Peripherostoma multiceps</i> (Sowerby) Gray	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Xylariales</i> Familia: <i>Diatrypaceae</i> Género: <i>Eutypa</i> Tul. & C.Tul., 1863	2013 -
	<i>Exidia glandulosa</i> (Bull.) Fr. = <i>Auricularia truncata</i> (Fr.) Fuckel = <i>Exidia glandulosa</i> f. <i>lobata</i> Neuhoff	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidia</i>	2021
	<i>Exidia recisa</i> (Ditmar) Fr. = <i>Exidia gelatinosa</i> (Bull.) Duby = <i>Exidia impressa</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidia</i>	2013, 2021
	<i>Exidia saccharina</i> (Alb. & Schwein.) Fr. = <i>Tremella spiculosa</i> var. <i>saccharina</i> Alb. & Schwein.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidia</i>	2013 -
	<i>Exidia thuretiana</i> (Lév.) Fr. = <i>Exidia albida</i> (Huds.) Bref.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidia</i>	2013 -
	<i>Exidiopsis calcea</i> (Pers.) K.Wells = <i>Sebacina calcea</i> (Pers.) Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Exidiaceae</i> Género: <i>Exidiopsis</i> (Bref.) Möller	2013 -
	<i>Exidiopsis effusa</i> (Bref. ex Sacc.) Möller = <i>Myxarium laccatum</i> (Bourdot & Galzin) D.A.Reid	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidiopsis</i>	2013 -
	<i>Exidiopsis effusa</i> Bref. = <i>Exidiopsis quercina</i> Vuill. = <i>Sebacina effusa</i> (Bref. ex Sacc.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Exidiaceae</i> Género: <i>Exidiopsis</i> (Bref.) Möller	2013 -
	<i>Exidiopsis leucophaea</i> (Bres.) K.Wells = <i>Eichleriella leucophaea</i> Bres. = <i>Hirneolina leucophaea</i> (Bres.) Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Auriculariaceae</i> Género: <i>Exidiopsis</i>	2013 -
F			

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Faerberia carbonaria</i> (Alb. & Schwein.) Pouzar = <i>Cantharellus anthracophilus</i> Lév. = <i>Cantharellus carbonarius</i> (Alb. & Schwein.) Fr. = <i>Cantharellus leucophaeus</i> (Pers.) Nouel Malengie = <i>Cantharellus radicosus</i> Berk. & Broome	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Faerberia</i> Pouzar	2013 -
	<i>Fibricium rude</i> (P.Karst.) Jülich = <i>Corticium greschikii</i> Bres. = <i>Fibricium greschikii</i> (Bres.) J.Erikss. = <i>Gloeocystidium rude</i> (P.Karst.) Höhn. & Litsch. = <i>Peniophora greschikii</i> (Bres.) Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Repetobasidiaceae</i> Género: <i>Fibricium</i> J.Erikss.	2013 -
	<i>Fibricium subceraceum</i> (Hallenb.) Bernicchia = <i>Fibrodontia subceracea</i> Hallenb.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Repetobasidiaceae</i> Género: <i>Fibricium</i> J.Erikss.	2013 -
	<i>Fibrodontia gossypina</i> Parmasto = <i>Hyphodontia gossypina</i> (Parmasto) Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Fibrodontia</i> Parmasto	2013 -
	<i>Fibroporia vaillantii</i> (DC.) Parmasto = <i>Antrodia vaillantii</i> (DC.) Ryvarden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Fibroporia</i> Parmasto	2013 -
	<i>Fibulomyces mutabilis</i> (Bres.) Jülich = <i>Athelia mutabilis</i> (Bres.) Park. -Rhodes	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Fibulomyces</i> Jülich	2013 -
	<i>Fischerula macrospora</i> Mattir.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Fischerula</i> Mattir.	2013 -
	<i>Fistulina hepatica</i> (Schaeff.) With. = <i>Agarico -carnis lingua -bovis</i> Paulet = <i>Boletus buglossum</i> Retz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Fistulinaceae</i> Género: <i>Fistulina</i> Bull., 1791	2013, 2021
	<i>Flammulaster carpophilus</i> (Fr.) Earle exVellinga = <i>Agaricus carpophilus</i> Fr. = <i>Armillaria rhombospora</i> (G. F. Atk.) Kauffman = <i>Cystoderma rhombosporum</i> (G. F. Atk.) A. H. Sm. & Singer = <i>Flammulaster carpophiloides</i> (Kühner) Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Flammulaster</i> Earle	2021
	<i>Flammulina velutipes</i> (Curt.: Fr.) Singer = <i>Agaricus atropes</i> Schumach. = <i>Agaricus fuscipes</i> Vahl	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Flammulina</i> P.Karst.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) J. J. Kickx	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Fomes</i> (Fr.) Fr., 1849	2013, 2021
	<i>Fomitiporia robusta</i> (P. Karst.) Fiasson & Niemelä ≡ <i>Phellinus robustus</i> (P. Karst.) Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fomitiporia</i> Murrill	2013, 2021
	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Sw.) P. Karst. = <i>Antrodia serpens</i> var. <i>tuber</i> P. Karst. = <i>Antrodia tuber</i> (P. Karst.) P. Karst. = <i>Boletus ellipticus</i> Pers., 1800	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Fomitopsis</i> P.Karst., 1881	2013, 2021
	<i>Fuligo cinerea</i> (Schwein.) Morgan, 1896 = <i>Aethaliopsis stercoriformis</i> Zopf, 1885 = <i>Badhamia coadnata</i> Rostaf., 1874 ≡ <i>Enteridium cinereum</i> Schwein., 1832	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Fuligo</i> Haller, 1768	2013,
	<i>Fuligo septica</i> (L.) Wiggers, 1780 = <i>Mucor septicus</i> L.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Fuligo</i> Haller, 1768	2006
	<i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Schröd.) Murrill = <i>Acia ferruginosa</i> (Schröd.) P.Karst. = <i>Agaricus ferruginosus</i> (Schröd.) E.H.L.Krause = <i>Asterostroma ochrostromum</i> Burt = <i>Boletus salicinus</i> Pers., 1792	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fuscoporia</i> Murrill	2013 -
	<i>Fuscoporia torulosa</i> (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. = <i>Agarico -igniarius tegularium</i> Paulet ≡ <i>Boletus torulosus</i> Pers. = <i>Boudiera rubripora</i> (Quél.) Lázaro Ibiza	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fuscoporia</i> Murrill	2021
	<i>Fuscopostia fragilis</i> (Fr.) B. K. Cui, L. L. Shen & Y. C. Dai = <i>Postia fragilis</i> (Fr.) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Fuscopostia</i>	2021
	<i>Fuscopostia leucomallella</i> (Murrill) B.K.Cui, L.L.Shen & Y.C.Dai = <i>Postia leucomallella</i> (Murrill) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Fuscopostia</i>	2013 -
G			
	<i>Galerina ampullaceocystis</i> P.D.Orton = <i>Galerina pseudocamerina</i> Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Galerina atkinsoniana</i> A.H.Sm. ≡ <i>Galerina atkinsoniana</i> (A.H.Sm.) Krieglst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2013 -
	<i>Galerina badipes</i> (Pers.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021
	<i>Galerina hypnorum</i> (Schränk: Fr.) Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021
	<i>Galerina laevis</i> (Pers.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021
	<i>Galerina marginata</i> (Fr.) Kühner.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2013, 2021
	<i>Galerina mycenoides</i> (Fr.) Kühner.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021
	<i>Galerina pseudobadipes</i> Joss. ex Sm. & Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2013,
	<i>Galerina similis</i> Kühn	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021,
	<i>Galerina sphagnorum</i> (Pers.) Kühner.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021
	<i>Galerina stylifera</i> . (G. F. Atk.) A. H. Sm. & Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021
	<i>Galerina uncialis</i> (Britzelm.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Galerina vittiformis</i> (Fr.) Singer = <i>Galerina vittiformis</i> var. <i>pachyspora</i> A.H.Sm. & Singer = <i>Galerula hypni</i> (Batsch) Murrill = <i>Galerula hypnorum</i> (Batsch) Maire = <i>Galerula muricellospora</i> G.F.Atk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Galerina</i> Earle, 1909	2013, 2021
	<i>Galeropsis desertorum</i> Velen. & Dvořák	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Galeropsis</i> Velen.	2013 -
	<i>Ganoderma adpersum</i> (Schultz.) Donk. = <i>Ganoderma australe</i> s.Ryvarden et al. = <i>Ganoderma europaeum</i> Steyaert ≡ <i>Polyporus adpersus</i> Schulzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Ganodermataceae</i> Género: <i>Ganoderma</i> P.Karst., 1881	2013,
	<i>Ganoderma applanatum</i> (Pers.) Pat. = <i>Agaricus flabelliformis</i> Scop. = <i>Boletus fomentarius</i> var. <i>applanatus</i> (Pers.) Pers. ≡ <i>Elfvingia applanata</i> (Pers.) P. Karst. ≡ <i>Fomes applanatus</i> (Pers.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Ganodermataceae</i> Género: <i>Ganoderma</i> P.Karst., 1881	2013, 2021
	<i>Ganoderma australe</i> (Fr.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Ganodermataceae</i> Género: <i>Ganoderma</i> P.Karst., 1881	2013, 2021
	<i>Ganoderma lucidum</i> (Leys.: Fr.) Karst. = <i>Agarico -igniarius trulla</i> Paulet = <i>Agaricus lignosus</i> Lam. = <i>Boletus crustatus</i> J. J. Planer = <i>Boletus flabelliformis</i> Leyss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Ganodermataceae</i> Género: <i>Ganoderma</i> P.Karst., 1881	2013, 2021
	<i>Ganoderma resinaceum</i> (Boud.) inPat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Ganodermataceae</i> Género: <i>Ganoderma</i> P.Karst., 1881	2013, 2021
	<i>Gastrocybe iberica</i> G.Moreno, Illana & Heykoop	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Gastrocybe</i> Watling	2013 -
	<i>Gautieria morchelliformis</i> Vittad. = <i>Gautieria morchellaeformis</i> Vittad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Gautieria</i> Vittad.	2013 -
	<i>Geastrum berkeleyi</i> Massee = <i>Geastrum berkeleyi</i> var. <i>continentale</i> V.J.Staněk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gastrales</i> Familia: <i>Gastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Geastrum campestre</i> (Morg.) Amer = <i>Geaster campestre</i> Morgan = <i>Geastrum asperum</i> Morgan	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Geastrum corollinum</i> (Batsch) Hollós = <i>Geastrum recolligens</i> (With.) Desv.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Geastrum elegans</i> Vittad. = <i>Geastrum badium</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Geastrum fimbriatum</i> (Fr.) E. Fischer = <i>Geastrum sessile</i> (Sow.) Pouzar	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Geastrum floriforme</i> Vittad. = <i>Geaster floriforme</i> Vittad. = <i>Geastrum delicatum</i> Morgan	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Geastrum minimum</i> Schwein. ≡ <i>Geaster minimus</i> (Schwein.) Fr. = <i>Geastrum cesatii</i> Rabenh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Geastrum nanum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Geastrum quadrifidum</i> Pers. Ex Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013,
	<i>Geastrum rufescens</i> Pers. = <i>Geastrum vulgatum</i> Vittad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2021
	<i>Geastrum striatum</i> DC. = <i>Geaster bryantii</i> Berk. = <i>Geaster coronatus</i> var. <i>bryantii</i> (Berk.) Quél. ≡ <i>Geaster striatus</i> (DC.) Fr. = <i>Geastrum bryantii</i> Berk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Geastrum triplex</i> (Jungh.) Fischer = <i>Geaster pillodii</i> Roze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Geastrum vulgatum</i> Vittad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Geastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Geastrum</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Genea cerebriformis</i> (Harkn.) Gilkey = <i>Genabea cerebriformis</i> (Harkn.) Trappe	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Genea</i> Vittad.	2013 -
	<i>Genea lobulata</i> (Mor.-Arr., J.Gómez & Calonge) P.Alvarado & Mor.-Arr. ≡ <i>Genea sphaerica</i> f. <i>lobulata</i> Mor.-Arr., J.Gómez & Calonge	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Genea</i> Vittad.	2013 -
	<i>Genea sphaerica</i> Tul. & C.Tul. = <i>Genea sphaerica</i> var. <i>lazzarii</i> G.Gross ≡ <i>Genea verrucosa</i> var. <i>sphaerica</i> (Tul. & C.Tul.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Genea</i> Vittad.	2013 -
	<i>Genea verrucosa</i> Vittad. = <i>Genea kunzeana</i> Zobel = <i>Genea perlata</i> Corda	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Genea</i> Vittad.	2013 -
	<i>Geoglossum montanum</i> Nannf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Geoglossomycetes</i> Orden: <i>Geoglossales</i> Familia: <i>Geoglossaceae</i> Género: <i>Geoglossum</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Geoglossum umbratile</i> Sacc. = <i>Geoglossum nigrum</i> var. <i>heterosporum</i> Mains	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Geoglossomycetes</i> Orden: <i>Geoglossales</i> Familia: <i>Geoglossaceae</i> Género: <i>Geoglossum</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Geopora arenicola</i> (Lév.) Kers = <i>Lachnea arenicola</i> (Lév.) Gillet = <i>Lachnea arenicola</i> var. <i>bloxamii</i> W.Phillips = <i>Lachnea lanuginosa</i> var. <i>arenicola</i> (Lév.) Quél. ≡ <i>Peziza arenicola</i> Lév.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopora</i> Harkn.	2013 -
	<i>Geopora cooperi</i> Harkness.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopora</i> Harkn.	2013, 2021
	<i>Geopora foliacea</i> (Schff.) S. Ahmad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopora</i> Harkn.	2013, 2021
	<i>Geopora sumneriana</i> (Cooke) Torre	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopora</i> Harkn.	2013,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Geopyxis carbonaria</i> (Alb. & Schwein.) Sacc. = <i>Aleuria carbonaria</i> (Alb. & Schwein.) Gillet = <i>Geopyxis carbonaria</i> var. <i>sessilis</i> Grelet = <i>Geopyxis vulcanalis</i> (Peck) Sacc. = <i>Peziza carbonaria</i> Alb. & Schwein.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopyxis</i> (Pers.) Sacc.	2013 -
	<i>Geopyxis foetida</i> Velen.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopyxis</i> (Pers.) Sacc.	2021,
	<i>Geopyxis majalis</i> (Fr.) Sacc. = <i>Aleuria majalis</i> (Fr.) Gillet = <i>Peziza majalis</i> Fr. = <i>Scypharia majalis</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopyxis</i> (Pers.) Sacc.	2013 -
	<i>Geotropa arenicola</i> (Lev.) Kers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Geopora</i> Harkn.	2021
	<i>Gliophorus psittacinus</i> (Schaeff.) Herink = <i>Hygrocybe psittacina</i> (Schaeff.) P.Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Gliophorus</i> Herink	2013 -
	<i>Gloeocystidiellum leucoxanthum</i> (Bres.) Boidin = <i>Corticium leucoxanthum</i> Bres. = <i>Gloeocystidium leucoxanthum</i> (Bres.) Höhn. & Litsch. = <i>Megalocystidium leucoxanthum</i> (Bres.) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Gloeocystidiellum</i> Donk	2013 -
	<i>Gloeocystidiellum luridum</i> (Bres.) Boidin = <i>Corticium luridum</i> Bres. = <i>Gloeocystidium luridum</i> (Bres.) Boidin = <i>Megalocystidium luridum</i> (Bres.) Jülich = <i>Vesiculomyces luridus</i> (Bres.) Boidin & Lanq.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Gloeocystidiellum</i> Donk	2013 -
	<i>Gloeocystidiellum porosum</i> (Berk. & M.A.Curtis) Donk = <i>Corticium letendrei</i> (P.Karst.) P.Karst. = <i>Corticium porosum</i> Berk. & M.A.Curtis = <i>Corticium stramineum</i> Bres. = <i>Gloeocystidium letendrei</i> (P.Karst.) Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Gloeocystidiellum</i> Donk	2013 -
	<i>Gloeodontia columbiensis</i> Burt ex Burds. & Lombard = <i>Gloeodontia columbiensis</i> Burt	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Gloeodontiaceae</i> Género: <i>Gloeodontia</i> Boidin	2013 -
	<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Bull.) P.Karst. = <i>Agaricus abietinus</i> Bull. = <i>Agaricus asserculorum</i> Schrad. = <i>Cellularia abietina</i> (Bull.) Kuntze = <i>Daedalea abietina</i> (Bull.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gloeophyllales</i> Familia: <i>Gloeophyllaceae</i> Género: <i>Gloeophyllum</i> P.Karst., 1882	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Wulfen) P. Karst. = <i>Agaricus asserculorum</i> Batsch = <i>Agaricus boletiformis</i> Sowerby ≡ <i>Agaricus sepiarius</i> Wulfen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gloeophyllales</i> Familia: <i>Gloeophyllaceae</i> Género: <i>Gloeophyllum</i> P.Karst., 1882	2013, 2021
	<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Pers.) Murrill = <i>Agaricus trabeus</i> Pers. = <i>Bjerkandera testacea</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Cellularia mollis</i> (Heufler ex Kalchbr.) Kuntze, 1898	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gloeophyllales</i> Familia: <i>Gloeophyllaceae</i> Género: <i>Gloeophyllum</i> P.Karst., 1882	2013, 2021
	<i>Gloeoporus pannocinctus</i> (Romell) J.Erikss. ≡ <i>Gelatoporia pannocincta</i> (Romell) Niemelä	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Gloeoporus</i> Mont.	2013 -
	<i>Gloeoporus taxicola</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden = <i>Boletus rufus</i> Schrad., 1792 ≡ <i>Caloporus taxicola</i> (Pers.) Ryvarden ≡ <i>Ceriporia taxicola</i> (Pers.) Komarova	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Gloeoporus</i> Mont.	2013, 2021
	<i>Gloiothele citrina</i> (Pers.) Ginns & G.W.Freeman = <i>Vesiculomyces citrinus</i> (Pers.) E.Hagstr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Gloiothele</i> Bres.	2013 -
	<i>Golovinomyces sordidus</i> (L.Junell) V.P.Heluta = <i>Erysiphe sordida</i> Junell	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Erysiphales</i> Familia: <i>Erysiphaceae</i> Género: <i>Golovinomyces</i> (U.Braun) V.P.Heluta	2013 -
	<i>Gomphidius glutinosus</i> (Schaeff.: Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Gomphidiaceae</i> Género: <i>Gomphidius</i> Fr.	2013,
	<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr. = <i>Agaricus glutinosus</i> var. <i>roseus</i> (Nees) Fr. = <i>Agaricus roseus</i> Nees = <i>Gomphidius glutinosus</i> var. <i>roseus</i> (Fr.) Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Gomphidiaceae</i> Género: <i>Gomphidius</i> Fr.	2013 -
	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray = <i>Agaricus frondosus</i> (Dicks.) Schrank = <i>Boletus cristatus</i> Gouan = <i>Boletus elegans</i> Bolton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Grifolaceae</i> Género: <i>Grifola</i> Gray	2021
	<i>Gymnopilus arenophilus</i> . A. Ortega & Esteve -Raventos.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Gymnopilus</i> P.Karst., 1879	2013, 2021
	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. ex Fr.) Murr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Gymnopilus</i> P.Karst., 1879	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Gymnopilus spectabilis</i> (Fr.) A. H. Smith = <i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.) P. D. Orton sensuQuadraccia	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Gymnopilus</i> P.Karst., 1879	2013, 2021
	<i>Gymnopilus suberis</i> (Maire) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Gymnopilus</i> P.Karst., 1879	2013, 2021
	<i>Gymnopus alkalivirens</i> (Singer) Halling ≡ <i>Collybia alkalivirens</i> Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013 -
	<i>Gymnopus aquosus</i> (Bull.) Antolin & Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2021,
	<i>Gymnopus benoistii</i> (Boud.) Antonín & Noordel. = <i>Collybia benoistii</i> Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013, 2021
	<i>Gymnopus brassicolens</i> (Romagn.) Antonín & Noordel. = <i>Micromphale brassicolens</i> (Romagn.) P. D. Orton ≡ <i>Micromphale cauvetii</i> Maire & Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013, 2021
	<i>Gymnopus confluens</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. = <i>Collybia confluens</i> (Pers.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2021
	<i>Gymnopus dryophilus</i> (Bull.) Murrill = <i>Collybia dryophila</i> (Bull.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013, 2021
	<i>Gymnopus erythropus</i> (Pers.) Antonín, Halling & Noordel. = <i>Collybia erythropus</i> (Pers.) P. Kumm. = <i>Collybia kuehneriana</i> Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013, 2021
	<i>Gymnopus foetidus</i> (Sowerby) P. M. Kirk ≡ <i>Micromphale foetidum</i> (Sowerby) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2021
	<i>Gymnopus hariolorum</i> (Bull.) Antonín, Halling & Noordel. = <i>Collybia hariolorum</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Gymnopus hybridus</i> (Kühner & Romagn.) Antonín & Noordel. = <i>Collybia hybrida</i> (Kühner & Romagn.) Svrček & Kubička	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2021
	<i>Gymnopus impudicus</i> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. = <i>Collybia impudica</i> (Fr.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013, 2021
	<i>Gymnopus terginus</i> (Fr.) Antonín & Noordel. = <i>Collybia tergina</i> (Fr.) S. Lundell	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013 -
	<i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Pucciniomycetes</i> Orden: <i>Pucciniales</i> Familia: <i>Pucciniaceae</i> Género: <i>Gymnosporangium</i> R.Hedw. ex DC., 1805	2013 -
	<i>Gyromitra esculenta</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Discinaceae</i> Género: <i>Gyromitra</i> Fr., 1849	2013, 2021
	<i>Gyromitra infula</i> (Schff.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Discinaceae</i> Género: <i>Gyromitra</i> Fr., 1849	2013, 2021
	<i>Gyromitra tasmanica</i> (Berkeley) Berk & Cooke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Discinaceae</i> Género: <i>Gastrum</i> Pers., 1794	2013,
	<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.) Quél. = <i>Boletus castaneus</i> Bull. = <i>Boletus castaneus</i> Bull. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Gyroporaceae</i> Género: <i>Gyroporus</i> Quél.	2021
H			
	<i>Hebeloma anthracophilum</i> Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hebeloma candidipes</i> Bruchet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hebeloma cistophilum</i> Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bulliard ex Fries) Quélet. = <i>Agaricus crustuliniformis</i> Bull. = <i>Agaricus diffractus</i> Fr. = <i>Agaricus elatus</i> var. <i>longicaudus</i> (Pers.) Pers. = <i>Agaricus longicaudus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma cylindrosporum</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hebeloma eburneum</i> (Malencon)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hebeloma fastibile</i> (Fr.) P. Kumm	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hebeloma hiemale</i> Bres. ≡ <i>Hebelomatis hiemale</i> (Bres.) Locquin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. = <i>Hebeloma edurum</i> Métrod ex Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Hebeloma malenconii</i> Bellú & Lanzoni = <i>Hebeloma pallidum</i> Malençon nonKummer)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma populinum</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Hebeloma porphyrosporum</i> Maire (*) ≡ <i>Sarcoloma porphyrosporum</i> (Maire) Locquin = <i>Sarcoloma sarcophyllum</i>	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hebeloma pusillum</i> J. E. Lange.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma pyrophilum</i> G. Moreno & M. M. Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull.) Ricken.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hebeloma sarcophyllum</i> (Peck) Sacc. = <i>Agaricus sarcophyllus</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma senescens</i> (Fr.) Berk. & Br. = <i>Hebeloma edurum</i> Metrod exBon = <i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hebeloma sinapizans</i> (PauL. ex Fr.) Gillet s. Kühner & Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma strophosum</i> (Fr.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hebeloma submelinoides</i> (Kühner) Kühner ≡ <i>Alnicola submelinoides</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Hebeloma truncatum</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hebeloma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Helvella acetabulum</i> (L.) Quél. ≡ <i>Acetabula acetabulum</i> (L.) Underw. & Earle = <i>Acetabula barlae</i> Boud. = <i>Acetabula sulcata</i> (Pers.) Fuckel = <i>Acetabula vulgaris</i> Fuckel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2022
	<i>Helvella atra</i> J. König ≡ <i>Leptopodia atra</i> (J. König) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Helvella costifera</i> Nannf. = <i>Acetabula ancilis</i> Boud. = <i>Discina costata</i> (Fr.) Sacc. ≡ <i>Paxina costifera</i> (Nannf.) Stangl ≡ <i>Peziza costata</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -
	<i>Helvella crispa</i> (Scop.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013, 2021
	<i>Helvella elastica</i> Bull. = <i>Elvela klotzschiana</i> Corda = <i>Helvella albida</i> Pers. = <i>Helvella cinerea</i> Villars ≡ <i>Leptopodia elastica</i> (Bull.) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -
	<i>Helvella ephippium</i> Lév. = <i>Helvella atra</i> var. <i>murina</i> (Boud.) Keissl. = <i>Helvella ephippium</i> Lev. = <i>Helvella murina</i> (Boud.) Sacc. & Traverso	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -
	<i>Helvella fibrosa</i> (Wallr.) Korf = <i>Helvella villosa</i> (Hedw.) Dissing & Nannf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -
	<i>Helvella fusca</i> Gillet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013, 2021
	<i>Helvella helvellula</i> (Durieu & Mont.) Dissing = <i>Acetabula helvellula</i> (Durieu & Mont.) Maire = <i>Geopyxis helvellula</i> (Durieu & Mont.) Sacc. = <i>Helvella nana</i> Quéf. ≡ <i>Peziza helvellula</i> Durieu & Mont.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -
	<i>Helvella lacunosa</i> Afz. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013, 2021
	<i>Helvella leucomelaena</i> (Pers.) Nannf. = <i>Acetabula debeauxii</i> (Roum.) Sacc., 1889 ≡ <i>Acetabula leucomelaena</i> (Pers.) Sacc. ≡ <i>Paxina leucomelaena</i> (Pers.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -
	<i>Helvella leucopus</i> Pers. = <i>Helvella leucopus</i> var. <i>populina</i> I.Arroyo & Calonge = <i>Leptopodia ludovicæ</i> Kickx	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Helvella pezizoides</i> Afzel. = <i>Aleuria helvelloides</i> Gillet = <i>Helvella cookeiana</i> (Boud.) Sacc. & Traverso = <i>Helvella ephippium</i> Cooke = <i>Helvella helvelloides</i> (Fr.) Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2022
	<i>Helvella sulcata</i> H. Lacunosa -Afzel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013, 2021
	<i>Helvella unicolor</i> (Boud.) Dissing ≡ <i>Acetabula unicolor</i> Boud. = <i>Leptopodia venosa</i> Fr. = <i>Paxina unicolor</i> (Boud.) Courtec.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Helvella</i> L.	2013 -
	<i>Hemileccinum depilatum</i> (Redeuilh) Šutara ≡ <i>Boletus depilatus</i> (Redeuilh) Šutara*	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Hemileccinum</i> Šutara	2013 -
	<i>Hemimycena lactea</i> (Pers.) Singer = <i>Hemimycena delicatella</i> (Peck) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Hemimycena</i> Singer	2013, 2021
	<i>Hemistropharia albocrenulata</i> (Peck) Jacobsson & E.Larss. = <i>Pholiota albocrenulata</i> (Peck) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Hemistropharia</i> Jacobsson & E.Larss.	2013 -
	<i>Hemitrichia clavata</i> (Pers.) Rostaf. = <i>Trichia clavata</i> Pers.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Hemitrichia</i> Rostafinski, 1873	2006
	<i>Hemitrichia minor</i> G. Lister = <i>Perichaena minor</i> (G. Lister) Hagelst.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Hemitrichia</i> Rostafinski, 1873	2006
	<i>Henningsomyces candidus</i> (Pers. ExSchleich.) O. Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Henningsomyces</i>	2013,
	<i>Hericium cirrhatum</i> (Pers.) Nikol. ≡ <i>Creolophus cirrhatus</i> (Pers.) P. Karst	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Hericiaceae</i> Género: <i>Hericium</i> Pers.	20133, 2021
	<i>Hericium clathroides</i> (Pall.) Pers. = <i>Dryodon clathroides</i> (Pall.) P. Karst. ≡ <i>Hydnum clathroides</i> Pall. = <i>Hydnum coralloides</i> var. <i>clathroides</i> (Pall.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Hericiaceae</i> Género: <i>Hericium</i> Pers.	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers. = <i>Clavaria caput-medusae</i> Bull., 1788 = <i>Clavaria conferta</i> Paulet = <i>Clavaria erinaceus</i> (Bull.) Paulet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Hericiaceae</i> Género: <i>Hericium</i> Pers.	2013 -
	<i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref. = <i>Boletus annosus</i> (Fr.) Spreng. = <i>Boletus cryptarum</i> Bull. = <i>Boletus epiphegus</i> Schumach. = <i>Cunninghamella meineckella</i> A.J.Olson = <i>Fomes annosus</i> (Fr.) Cooke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Bondarzewiaceae</i> Género: <i>Heterobasidion</i> Bref.	2013 -
	<i>Heteroradulum deglubens</i> (Berk. & Broome) Spirin & Malysheva = <i>Eichleriella deglubens</i> (Berk. & Broome) D.A.Reid	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Exidiaceae</i> Género: <i>Heteroradulum</i> Lloyd ex Spirin & Malysheva	2013 -
	<i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i> (Fr.) Singer = <i>Acanthocystis atrocaeruleus</i> (Fr.) Konrad & Maubl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Hohenbuehelia</i> Schulzer, 1866	2013, 2021
	<i>Hohenbuehelia geogenia</i> (D. C. ex Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Hohenbuehelia</i> Schulzer, 1866	2013, 2021
	<i>Hohenbuehelia mastrucata</i> (Fr.) Singer ≡ <i>Agaricus mastrucatus</i> Fr. = <i>Calathinus mastrucatus</i> (Fr.) Quél. = <i>Geopetalum mastrucatum</i> (Fr.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Hohenbuehelia</i> Schulzer, 1866	2013, 2021
	<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.) Schulz	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Hohenbuehelia</i> Schulzer, 1866	2021
	<i>Homophron spadiceum</i> (P.Kumm.) Örstadius & E.Larss. = <i>Psathyrella spadicea</i> (P.Kumm.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Homophron</i> (Britzelm.) Örstadius & E.Larss.	2013 -
	<i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi = <i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) M. M. Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Hortiboletus</i> Simonini, Vizzini & Gelardi	2021
	<i>Hortiboletus rubellus</i> (Krombh.) Simonini, Vizzini & Gelardi ≡ <i>Xerocomus rubellus</i> (Krombh.) Quél. = <i>Xerocomus versicolor</i> E.-J.Gilber (*)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Hortiboletus</i> Simonini, Vizzini & Gelardi	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Humaria hemisphaerica</i> (F.H.Wigg.) Fuckel = <i>Lachnea hemisphaerica</i> (F.H.Wigg.) Gillet = <i>Mycolachnea hemisphaerica</i> (F.H.Wigg.) Maire = <i>Patella albida</i> (Schaeff.) Saev. = <i>Peziza hemisphaerica</i> F.H.Wigg.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Humaria</i> Fuckel, 1870	2013 -
	<i>Hydnellum conrescens</i> (Pers ex Schw) Banker = <i>Calodon fasciatus</i> (Peck) Pat. = <i>Calodon zonatus</i> (Batsch) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Hydnellum</i> P.Karst.	2021,
	<i>Hydnellum ferrugineum</i> (Fr.: Fr.) P. Karst. = <i>Hydnum ferrugineum</i> (Fr.: Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Hydnellum</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Hydnellum peckii</i> Banker = <i>Calodon diabolus</i> (Banker) Snell = <i>Calodon peckii</i> (Banker) Snell & E. A. Dick = <i>Hydnellum diabolus</i> Banker	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Hydnellum</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Hydnellum scrobiculatum</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Calodon zonatum</i> var. <i>scrobiculatum</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Hydnellum</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Hydnopolyporus fimbriatus</i> (Cooke) D.A.Reid = <i>Abortiporus fimbriatus</i> (Cooke) O.Fidalgo & M.Fidalgo = <i>Beccaria caespitosa</i> Cooke = <i>Clavaria sparassoides</i> Speg. = <i>Cotylidia hartmannii</i> (Mont.) A.L.Welden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meripilaceae</i> Género: <i>Hydnopolyporus</i> D.A.Reid	2013 -
	<i>Hydnum albidum</i> Peck = <i>Dentinum albidum</i> (Peck) Snell	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Hydnum</i> L.	2013 -
	<i>Hydnum repandum</i> L. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Hydnum</i> L.	2013, 2021
	<i>Hydnum rufescens</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Hydnum</i> L.	2013, 2021
	<i>Hydropus floccipes</i> (Fr.) Singer = <i>Agaricus floccipes</i> Fr. = <i>Collybia floccipes</i> (Fr.) Gillet = <i>Hemimycena floccipes</i> (Fr.) Singer = <i>Hydropus floccipes</i> f. <i>luteipes</i> (A.Ortega & M.Zea) Pérez-De-Greg.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Hydropus</i> Kühner ex Singer	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Clem.) Singer. = <i>Hygrocybe konradii</i> Haller	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i> R. Haller.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2021
	<i>Hygrocybe ceracea</i> (Wulfen) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2021
	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr.) Wünsche ≡ <i>Agaricus chlorophanus</i> Fr. = <i>Godfrinia chlorophana</i> (Fr.) Herink = <i>Hygrocybe euroflavescens</i> Kühner = <i>Hygrophorus chlorophanus</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Hygrocybe citrinovirens</i> (Lge.) Schaef.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2021
	<i>Hygrocybe conica</i> (Scop. ex Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Hygrocybe insipida</i> (J. E. Lange) M. M. Moser = <i>Gliophorus insipidus</i> (J. E. Lange) Kovalenko	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2021
	<i>Hygrocybe minutula</i> (Peck) Murrill = <i>Hygrocybe minutula</i> (J.E.Lange ex S.Lundell) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Gliophorus reae</i> (Maire) Herink = <i>Hygrocybe mucronella</i> var. <i>mite</i> (Kühner) E.Ludw. = <i>Hygrocybe reae</i> (Maire) J.E.Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Hygrocybe nitrata</i> (Pers.) Wünsche ≡ <i>Agaricus nitratus</i> Pers. = <i>Camarophyllus nitratus</i> (Pers.) Ricken = <i>Hygrophorus nitratus</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Hygrocybe persistens</i> (Britzelm) Singer = <i>Hygrocybe persistens</i> var. <i>langei</i> . (Britzelm) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hygrocybe reae</i> (Maire) J. E. Lange.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2021
	<i>Hygrocybe russocoriacea</i> (Berk. & Jos. K. Mill.) P. D. Orton & Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2021
	<i>Hygrocybe substrangulata</i> (P. D. Orton) P. D. Orton & Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrocybe</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013,
	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire = <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen) Maire ex Martin-Sans = <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> for. <i>pallida</i> Peck.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Hygrophoropsidaceae</i> Género: <i>Hygrophoropsis</i> (J.Schröt.) Maire ex Martin-Sans	2013, 2021
	<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fr.) Fr. ≡ <i>Agaricus agathosmus</i> Fr. = <i>Agaricus cerasinus</i> Berk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus arbustivus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus aurantiacus</i> Henn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus aureus</i> (Arrh.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus camarophyllus</i> (Alb. & Schwein.) Dumée, Grandjean & Maire = <i>Hygrophorus calophyllus</i> P.Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013 -
	<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch) Fr. = <i>Hygrophorus chrysodon</i> var. <i>cistophilus</i> Pérez deGreg., Roqué & Macau	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hygrophorus cossus</i> (Sowerby) Fr. ≡ <i>Agaricus cossus</i> Sowerby = <i>Hygrophorus cossus</i> var. <i>quercetorum</i> (P. D. Orton) Bon, Migl. & Cherubini	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus dichrous</i> (Kühner) Romagnesi.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus discoideus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus discoxanthus</i> (Fr.) Rea	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull. ex Fr.) Fr. = <i>Hygrophorus eburneus</i> var. <i>quercetorum</i> (Bull.: Fr.) Fr. Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.) Fr. = <i>Hygrophorus aureus</i> (Arrh.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus leucophaeo -ilicis</i> Bon & Chevassut.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus ligatus</i> . Fr. = <i>Hygrophorus flavodiscus</i> Frost = <i>Hygrophorus gliocyclus</i> Fr. ≡ <i>Limacium gliocyclus</i> (Fr.) ≡ <i>Limacium ligatum</i> (Fr.) Wünsche	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus limacinus</i> Scop. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus nemoreus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus penarioides</i> Jacobsson & E.Larss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2022
	<i>Hygrophorus penarius</i> Fr. ≡ <i>Limacium penarium</i> (Fr.) Wünsche	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus persoonii</i> (Arnolds)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus poetarum</i> Heim.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> (Maire) Malençon & Bertault = <i>Hygrophorus eburneus</i> var. <i>pseudodiscoideus</i> Maire = <i>Hygrophorus pseudodiscoideus</i> var. <i>cistophilus</i> Bon & G. Rioussset	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i> Bon & Chevassut.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. Ex Fr.) Kauffman	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Hygrophorus virgineus</i> (Wulfen) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Hygrophorus</i> Fr., 1836	2021
	<i>Hymenochaete cinnamomea</i> (Pers.) Bres. = <i>Coltricia cinnamomea</i> (Pers.) Murr. = <i>Coniophora cinnamomea</i> (Pers.) Masee = <i>Corticium cinnamomeum</i> (Pers.) Fr. = <i>Hymenochaete arida</i> (P.Karst.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Hymenochaete</i> Lév., 1846	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hymenochaete fuliginosa</i> (Fr.) Lév. = <i>Hymenochaete fuliginosum</i> (Fr.) Bres. = <i>Hymenochaete fusca</i> (P.Karst.) Sacc. & P.Syd.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Hymenochaete</i> Lév., 1846	2013 -
	<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks.) Lév. = <i>Auricularia ferruginea</i> Bull. ≡ <i>Helvella rubiginosa</i> Dicks. = <i>Hymenochaete ferruginea</i> (Bull.) Bres., 1890	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Hymenochaete</i> Lév., 1846	2013, 2021
	<i>Hymenogaster citrinus</i> Vittad. ≡ <i>Gautieria citrina</i> (Vittad.) Bougher & Castellano = <i>Hymenogaster citrus</i> Corda = <i>Hymenogaster olivaceus</i> f. <i>citrus</i> (Corda)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hymenogaster</i> Vittad.	2013 -
	<i>Hymenogaster griseus</i> Vittad. = <i>Hymenogaster populetorum</i> Tul.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hymenogaster</i> Vittad.	2013 -
	<i>Hymenopellis hispanica</i> (G.Moreno & Esteve-Rav.) R.H.Petersen ≡ <i>Oudemansiella xeruloides</i> var. <i>hispanica</i> G.Moreno & Esteve-Rav.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Hymenopellis</i> R.H.Petersen	2013 -
	<i>Hymenopellis radicata</i> (Relhan) R. H. Petersen = <i>Oudemansiella radicata</i> (Relhan) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Hymenopellis</i> R.H.Petersen	2013, 2021
	<i>Hymenopellis xeruloides</i> (Bon) R.H.Petersen ≡ <i>Oudemansiella xeruloides</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Hymenopellis</i> R.H.Petersen	2013 -
	<i>Hymenoscyphus calyculus</i> (Fr.) W.Phillips = <i>Hymenoscyphus conscriptus</i> (P.Karst.) P.Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Helotiaceae</i> Género: <i>Hymenoscyphus</i> Gray, 1821	2013 -
	<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> (Bull.) Gray = <i>Ciboria fructigena</i> (Bull.) Killerm. = <i>Helotium fructigenum</i> (Bull.) Fuckel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Helotiaceae</i> Género: <i>Hymenoscyphus</i> Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Hymenoscyphus phyllogenus</i> (Rehm) Kuntze ≡ <i>Helotium phyllogenum</i> Rehm ≡ <i>Phialea phyllogena</i> (Rehm) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Helotiaceae</i> Género: <i>Hymenoscyphus</i> Gray, 1821	2013 -
	<i>Hymenoscyphus serotinus</i> (Pers.) W.Phillips = <i>Hymenoscyphus calyculus</i> Breitenb. & Kränzl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Helotiaceae</i> Género: <i>Hymenoscyphus</i> Gray, 1821	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hyphoderma malenconii</i> (Manjón & G.Moreno) Manjón, G.Moreno & Hjortstam ≡ <i>Dendrothele malenconii</i> Manjón & G.Moreno	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Hyphoderma</i> Wallr., 1833	2013 -
	<i>Hyphoderma multicystidium</i> (Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Tellería = <i>Crustoderma sabinicum</i> var. <i>disporum</i> M.Dueñas & Tellería ≡ <i>Fibricium multicystidium</i> Hjortstam & Ryvarden = <i>Hyphoderma multicystidium</i> var. <i>disporum</i> (M.Dueñas & Tellería) Tellería	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Hyphoderma</i> Wallr., 1833	2013 -
	<i>Hyphoderma obtusifforme</i> J.Erikss. & Å.Strid	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Hyphoderma</i> Wallr., 1833	2013 -
	<i>Hyphoderma roseocreum</i> (Bres.) Donk ≡ <i>Corticium roseocreum</i> Bres. = <i>Gloeocystidium roseocreum</i> (Bres.) Brinkmann = <i>Hyphoderma roseocreum</i> var. <i>minutisporum</i> Priyanka & Dhingra	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Hyphoderma</i> Wallr., 1833	2013 -
	<i>Hyphoderma setigerum</i> (Fr.) Donk ≡ <i>Corticium berkeleyi</i> Cooke = <i>Corticium latitans</i> P.Karst. = <i>Corticium myxosporum</i> P.Karst. = <i>Fibricium subtestaceum</i> (Litsch.) Y.Hayashi	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Hyphoderma</i> Wallr., 1833	2013 -
	<i>Hyphoderma sibiricum</i> (Parmasto) J.Erikss. & Å.Strid = <i>Hyphoderma sibiricus</i> Parmasto ≡ <i>Radulomyces sibiricus</i> Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Hyphoderma</i> Wallr., 1833	2013 -
	<i>Hyphodermella corrugata</i> (Fr.) J.Erikss. & Ryvarden ≡ <i>Grandinia corrugata</i> Fr. = <i>Hydnochaete laeta</i> Rick = <i>Metulodontia junquillea</i> (Quél.) Parmasto = <i>Odontia coloradensis</i> Overh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Hyphodermella</i> J.Erikss. & Ryvarden	2013 -
	<i>Hyphodermella densa</i> Melo & Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Hyphodermella</i> J.Erikss. & Ryvarden	2013 -
	<i>Hyphodontia arguta</i> (Fr.) J.Erikss. = <i>Acia arguta</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Grandinia arguta</i> (Fr.) Jülich = <i>Hyphodontia lageniformis</i> Sang H.Lin & Z.C.Chen = <i>Irpex fimbriaeformis</i> Berk. & M.A.Curtis	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Hyphodontia</i> J.Erikss., 1958	2013 -
	<i>Hyphodontia quercina</i> (Pers.) J.Erikss. = <i>Basidioradulum quercinum</i> (Pers.) H.Furuk. = <i>Grandinia quercina</i> (Pers.) Jülich = <i>Hydnum candidum</i> Willd. = <i>Hydnum fallax</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Hyphodontia</i> J.Erikss., 1958	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Hypholoma capnoides</i> (Fr.) P.Kumm. ≡ <i>Agaricus capnoides</i> Fr. = <i>Dryophila capnoides</i> (Fr.) Quél. = <i>Naematoloma capnoides</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Psilocybe capnoides</i> (Fr.) Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Hypholoma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Hypholoma ericaeum</i> (Pers. ex Fr.) Kühner.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Hypholoma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. ex Fr.) Kummer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Hypholoma</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Hypholoma</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Hypochnella violacea</i> Auersw. ex J.Schröt. (1888) = <i>Hypochnus violaceus</i> (Auersw. ex J.Schröt.) Sacc. (1888)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Hypochnella</i> J.Schröt. (1888)	2013 -
	<i>Hypomyces lateritius</i> (Fr.) Tul. & C. Tul. ≡ <i>Byssonectria lateritia</i> (Fr.) Petch = <i>Hypocrea floccosa</i> Fr. ≡ <i>Peckiella lateritia</i> (Fr.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Hypocreales</i> Familia: <i>Hypocreaceae</i> Género: <i>Hypomyces</i> (Fr.) Tul. & C.Tul.	2021
	<i>Hysterangium clathroides</i> Vittad. = <i>Hymenogaster clathroides</i> var. <i>cistophilum</i> Tul. & C.Tul. = <i>Hysterangium cistophilum</i> (Tul. & C.Tul.) Zeller & C.W.Dodge = <i>Hysterangium stoloniferum</i> var. <i>mutabile</i> Bucholtz	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hysterangiales</i> Familia: <i>Hysterangiaceae</i> Género: <i>Hysterangium</i> Vittad.	2013 -
I			
	<i>Imperator rhodopurpureus</i> (Smotl.) Assyov. & all ≡ <i>Boletus rhodopurpureus</i> Smotl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Imperator</i> Koller et al.	2013 -
	<i>Infundibulicybe meridionalis</i> (Bon) Pérez-De-Greg. = <i>Clitocybe meridionalis</i> (Bon) P.Roux ≡ <i>Clitocybe squamulosoides</i> var. <i>meridionalis</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Infundibulicybe</i> Harmaja	2022
	<i>Inocutis tamaricis</i> (Pat.) Fiasson & Niemelä = <i>Inonotus tamaricis</i> (Pat.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaeae</i> Género: <i>Inocutis</i> Fiasson & Niemelä	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Inocybe acuta</i> Boud. = <i>Inocybe striata</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe amblyspora</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 186	2013 -
	<i>Inocybe amethystina</i> Kuyp.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe asterospora</i> Quél. = <i>Agaricus asterosporus</i> Quél. = <i>Astrosporina asterospora</i> (Quél.) Rea = <i>Inocybe asterospora</i> f. <i>velata</i> Bon & Carteret	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe atripes</i> G. F. Atk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021
	<i>Inocybe bresadolana</i> Bon = <i>Inocybe fuscidula</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe cookei</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe cryptocystis</i> D.E.Stuntz	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe dulcamara</i> (Pers.) P. Kumm. = <i>Agaricus dulcamarus</i> Alb. & Schwein. = <i>Agaricus uniformis</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe eutheloides</i> Peck (*) ≡ <i>Inocybe eutheles</i> var. <i>eutheloides</i> (Peck) Reumaux	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Inocybe flocculosa</i> (Berk.) Sacc. & S. Kuyper. = <i>Inocybe flocculosa</i> var. <i>crocifolia</i> (Herink) Kuyper	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe fraudans</i> (Britzelm.) Sacc. ≡ <i>Agaricus fraudans</i> Britzelm. = <i>Inocybe corydalina</i> var. <i>albidopallens</i> J. E. Lange = <i>Inocybe explanata</i> (Britzelm.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe geophylla</i> (Bull.) P. Kumm. = <i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (Fr. ex Fr.) Kumm. (Pers.) Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe godeyi</i> Gillet = <i>Agaricus trinii</i> var. <i>rubescens</i> (Gillet) Pat. = <i>Inocybe rickenii</i> Kallenb. = <i>Inocybe rubescens</i> Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe grammopodia</i> Malençon = <i>Inocybe grammopodia</i> var. <i>paleoveneta</i> Bizio & A.Castellan	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe griseolilacina</i> J.E.Lange = <i>Inocybe griseolilacina</i> var. <i>furcaticystidiata</i> E.Ludw.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe heimii</i> Bon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021,
	<i>Inocybe hirtella</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe laeta</i> (Alessio)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe lanatopurpurea</i> Esteve-Rav. & G.Moreno	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2022
	<i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.) P.Kumm. ≡ <i>Agaricus lanuginosus</i> Bull. = <i>Astrosporina lanuginosa</i> (Bull.) J.Schröt. = <i>Inocybe hirsuta</i> var. <i>lanuginosa</i> (Bull.) Quél. = <i>Inocybe sabuletorum</i> R.Heim	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Inocybe leptocystis</i> G.F.Atk. = <i>Inocybe hygrophila</i> J.Favre	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe leucoblema</i> Kühner.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021
	<i>Inocybe mixtilis</i> (Britzelm.) Sacc. ≡ <i>Agaricus mixtilis</i> Britzelm. = <i>Inocybe mixtilis</i> var. <i>aurata</i> Alessio	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe muricellata</i> Bres. = <i>Inocybe scabella</i> var. <i>minor</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe napipes</i> (J. E. Lange)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britz.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe oblectabilis</i> (Britzelm.) Sacc. ≡ <i>Agaricus oblectabilis</i> Britzelm. = <i>Inocybe hiulca</i> f. <i>major</i> Bres. = <i>Inocybe oblectabilis</i> var. <i>odora</i> Shchukin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe obscura</i> (Pers.) Guillet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021
	<i>Inocybe obscurobadia</i> (J. Favre) Grund & D. E. Stuntz ≡ <i>Inocybe furfurea</i> var. <i>obscurobadia</i> J. Favre = <i>Inocybe tenuicystidiata</i> E. Horak & Stangl	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe ochroalba</i> Bruyl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe patouillardii</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Inocybe pelargonium</i> Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021,
	<i>Inocybe phaeocomis</i> (Pers.) Kuyper.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021
	<i>Inocybe phaeodisca</i> Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe phaeoleuca</i> Kühner = <i>Inocybe phaeoleuca</i> var. <i>dolomitica</i> Bizio & Bon = <i>Inocybe phaeoleuca</i> var. <i>grandispora</i> Franchi & M. Marchetti ≡ <i>Inocybe splendens</i> var. <i>phaeoleuca</i> (Kühner) Kuyper	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe praetervisa</i> Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe pseudodestructa</i> Stangl & Veselsky	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021,
	<i>Inocybe pseudoorbata</i> Esteve-Raventós -García Blanco.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021,
	<i>Inocybe pusio</i> P. Karst. ≡ <i>Inocybe obscura</i> subsp. <i>pusio</i> (P. Karst.) Heim = <i>Inocybe obscura</i> var. <i>obscurissima</i> R. Heim	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe pyriodora</i> (Bull. ex Fr.) Kumm. = <i>Inocybe bongardii</i> Donadini & Rioussat	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021
	<i>Inocybe roseipes</i> Malençon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe rufoloides</i> Bon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Inocybe rufula</i> Malençon ex Alessio ≡ <i>Inocybe rufula</i> Malençon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe splendens</i> R. Heim.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe squamata</i> J. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 186	2013,
	<i>Inocybe subtrivialis</i> Esteve-Rav., M.Villarreal & Heykoop	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013 -
	<i>Inocybe tenebrosa</i> Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2021,
	<i>Inocybe terrifera</i> (Fr.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Broome) Sacc. = <i>Inocybe pudica</i> Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inocybe</i> (Fr.) Fr., 1863	2013, 2021
	<i>Inonotus cuticularis</i> (Bull.) P. Karst. = <i>Boletus cuticularis</i> Bull. = <i>Inonotus perplexus</i> (Peck) Murrill = <i>Polyporus cuticularis</i> (Bull.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Inonotus</i> P.Karst., 1879	2021
	<i>Inonotus hispidus</i> (Bull.) P. Karst. = <i>Agaricus velutinus</i> (With.) E. H. L. Krause, 1933 = <i>Boletus hirsutus</i> Scop. = <i>Boletus hirtus</i> Vent.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Inonotus</i> P.Karst., 1879	2013, 2021
	<i>Inonotus triqueter</i> P. Karst. = <i>Onnia triqueter</i> (Fr.) Imazeki	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Inonotus</i> P.Karst., 1879	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Inosperma adaequatum</i> (Britzelm.) Matheny & Esteve -Rav. = <i>Inocybe adaequata</i> (Britzelm.) Sacc. = <i>Inocybe jurana</i> (Pat.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inosperma</i> (Kühner) Matheny & Esteve -Rav., 2019	2013, 2021
	<i>Inosperma bongardii</i> (Weinm.) Matheny & Esteve-Rav. = <i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inosperma</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav., 2019	2013, 2021
	<i>Inosperma erubescens</i> (A.Blytt) Matheny & Esteve-Rav. ≡ <i>Inocybe erubescens</i> A.Blytt	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inosperma</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav., 2019	2013 -
	<i>Inosperma pisciodorum</i> (Donadini & Rioussset) Matheny & Esteve-Rav. = <i>Inocybe bongardii</i> var. <i>pisciodora</i> (Donadini & Rioussset) Kuyper	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inosperma</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav., 2019	2013 -
	<i>Inosperma quietiodor</i> (Bon) Matheny & Esteve-Rav. ≡ <i>Inocybe quietiodor</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Inosperma</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav., 2019	2013 -
	<i>Irpex lacteus</i> (Fr.) Fr. = <i>Boletus cinerascens</i> Schwein. = <i>Boletus tulipiferae</i> Schwein.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Irpex</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karst. = <i>Boletus benzoinus</i> Wahlenb. = <i>Boletus rubiginosus</i> Schrad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Ischnoderma</i> P.Karst.	2013, 2021
J			
	<i>Jimgerdemannia flammicorona</i> (Trappe & Gerd.) Trappe, Desirò, M.E.Sm., Bonito & Bidartondo ≡ <i>Endogone flammicorona</i> Trappe & Gerd.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Zygomycota</i> Clase: <i>Endogonacetes</i> Orden: <i>Endogonales</i> Familia: <i>Endogonaceae</i> Género: <i>Jimgerdemannia</i> Trappe, Desirò, M.E.Sm., Bonito & Bidartondo, 2017	2013 -
K			
	<i>Kneiffia subalutacea</i> (P.Karst.) Bres. ≡ <i>Hyphodontia subalutacea</i> (P.Karst.) J.Erikss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Kneiffia</i> Fr., 1836	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Kneiffiella cineracea</i> (Bourdot & Galzin) Jülich & Stalpers ≡ <i>Hyphodontia cineracea</i> (Bourdot & Galzin) J.Erikss. & Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Kneiffiella</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Kurtia argillacea</i> (Bres.) Karasiński ≡ <i>Hyphoderma argillaceum</i> (Bres.) Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Kurtia</i>	2013 -
L			
	<i>Laccaria affinis</i> Contu. = <i>Laccaria affinis</i> var. <i>sardoa</i> Bon & contu = <i>Laccaria affinis</i> for. <i>macrocistidia</i> Migli. & Lavo. contu (1989). = <i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck = <i>Laccaria laccata</i> var. <i>rosella</i> (Batsch) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)	2013, 2021
	<i>Laccaria bicolor</i> (Maire) Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)	2013, 2021
	<i>Laccaria fraterna</i> (Cooke & Masee) Pegler.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)	2013, 2021
	<i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) Berk. & Broo. = <i>Clitocybe laccata</i> Quélet = <i>Laccaria amethystina</i> (Bolt. & Hooker) Murr. = <i>Laccaria laccata</i> var. <i>lutea</i> (J.C.Buxb.) Bon = <i>Laccaria laccata</i> var. <i>moelleri</i> Singer = <i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)	2021
	<i>Laccaria lateritia</i> Malençon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)	2013, 2021
	<i>Laccaria proxima</i> (Boudier) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)	2013, 2021
	<i>Laccaria tortilis</i> (Bolt.) S. F. Gray.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hydnangiaceae</i> Género: <i>Laccaria</i> (Berkeley & Broome 1883)	2013, 2021
	<i>Lachnella alboviolascens</i> (Alb. & Schwein.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Niaceae</i> Género: <i>Lachnella</i>	2013,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lachnum deflexum</i> (Graddon) R.Galán = <i>Cistella deflexa</i> (Graddon) Raitv. ≡ <i>Dasyscyphus deflexus</i> Graddon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Lachnaceae</i> Género: <i>Lachnum</i> Retz., 1769	2013 -
	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull.) Pat. = <i>Lacrymaria velutina</i> (Pers.) Konrad & Maubl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Lacrymaria</i> Pat.	2021
	<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelm. = <i>Lactarius acerrimus</i> f. <i>scrobipileus</i> Bidaud & Fillion ≡ <i>Lactifluus acerrimus</i> (Britzelm.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2022
	<i>Lactarius atlanticus</i> Bon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius aurantiacus</i> (Pers.) Gray = <i>Lactarius mitissimus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius azonites</i> (Builliard) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013,
	<i>Lactarius camphoratus</i> (Bulliard ex Fr.) Fr. = <i>Lactarius cimicarius</i> (Batsch.) Gillet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius chrysorrheus</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius cistophilus</i> Bon & Trimbach	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius controversus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius decipiens</i> Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lactarius deliciosus</i> (Linn.) Gray = <i>Agaricus deliciosus</i> var. <i>lamelliporus</i> Barla	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius giennensis</i> (Mor.-Arr., J.Gómez & Calonge) Pierotti ≡ <i>Zelleromyces giennensis</i> Mor.-Arr., J.Gómez & Calonge	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013 -
	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius lacunarum</i> Romagn. exHora.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius mairei</i> Malençon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius mediterraneensis</i> Llistos. & Bellù = <i>Lactarius mediterraneensis</i> f. <i>citrina</i> Llistos. & Bellù	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius obscuratus</i> (Lasch) Fr. = <i>Agaricus obnubilus</i> Lasch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius pallidus</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius rubrocinctus</i> Fr. = <i>Lactarius iners</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013 -
	<i>Lactarius rufus</i> (Scop.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lactarius ruginosus</i> Romag.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius salmonicolor</i> R. Heim & Leclair	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paul ex Fr.) Fr. = <i>Lactarius sanguifluus</i> var. <i>violaceus</i> (Barla) Basso	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius subdulcis</i> (Pers.: Fries) S. f. Gray = <i>Lactarius sphagneti</i> (Fr.) Neuhoﬀ exGröger	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius subumbonatus</i> Lindgr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius tesquorum</i> Maleçon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius vinosus</i> (Quél.) Bataille	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius volemus</i> (Fr.) Fr. = <i>Agaricus ichoratus</i> Batsch = <i>Agaricus lactifluus</i> L.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2021
	<i>Lactarius zonarius</i> Bull. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lactarius zugazae</i> G. Moreno, Montoya, Bandala & Heykoop	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactarius</i> Pers., 1797	2013, 2021
	<i>Lactifluus rugatus</i> (Kühner & Romagn.) Verbeke = <i>Lactarius rugatus</i> Kühner & Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Lactifluus</i> (Pers.) Roussel	2013, 2021
	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Murrill = <i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull.) Bondartsev & Singer = <i>Lamnaoa fragrans</i> (Vittad.) Vizzini, Gelardi & Simonini	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Laetiporus</i> Murrill, 1904	2013, 2021
	<i>Lamproderma scintillans</i> (Ber & Br.) Morgan. (1894) = <i>Stemonitis scintillans</i> Berk. & Broome	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Lamproderma</i> Rostaf., 1873	2006
	<i>Langermania gigantea</i> (Batsch: Pers.) Rostk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Langermannia</i>	2013,
	<i>Leccinellum corsicum</i> (Rolland) Bresinsky & Manfr. Binder = <i>Leccinum corsicum</i> (Rolland) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinellum</i> Bresinsky & Manfr.Binder	2013, 2021
	<i>Leccinellum crocipodium</i> (Letell.) Della Magg. & Trassin. = <i>Leccinum crocipodium</i> (Let.) Watl. = <i>Krombolziella crocipodia</i> (Let.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinellum</i> Bresinsky & Manfr.Binder	2013, 2021
	<i>Leccinellum lepidum</i> (H. Bouchet exEssette) Bresinsky & Manfr. Binder = <i>Leccinum lepidum</i> (H. Bouchet exEssette) Bon & Contu	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinellum</i> Bresinsky & Manfr.Binder	2013, 2021
	<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) Gray = <i>Leccinum quercinum</i> Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821	2021
	<i>Leccinum duriusculum</i> (Schulzer exKalchbr.) Singer = <i>Boletus duriusculus</i> Schulz. = <i>Boletus nigrescens</i> Heinr. Huber, 1935	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821	2013, 2021
	<i>Leccinum scabrum</i> (Bull.) Gray = <i>Leccinum roseofractum</i> Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Leccinum</i> Gray, 1821	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lentaria albovinacea</i> Pilát = <i>Clavaria albovinacea</i> Pilát, 1950	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Lentariaceae</i> Género: <i>Lentaria</i> Corner	2013, 2021
	<i>Lentinellus castoreus</i> (Fr.) Kühner & Maire = <i>Hemicybe castorea</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Hemicybe tomentella</i> (P. Karst.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Auriscalpiaceae</i> Género: <i>Lentinellus</i> P.Karst.	2021
	<i>Lentinellus cochleatus</i> (Hoffin.) Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Auriscalpiaceae</i> Género: <i>Lentinellus</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Lentinellus micheneri</i> (Berk. & M. A. Curtis) Pegler. = <i>Lentinellus americanus</i> (Peck) Singer = <i>Lentinellus omphalodes</i> Pearson & Dennis	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Auriscalpiaceae</i> Género: <i>Lentinellus</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Lentinus edodes</i> (Berk.) Sing. = <i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Lentinula</i> Earle	2021
	<i>Lentinus lepideus</i> Fr. = <i>Neolentinus lepideus</i> (Fr.) Redhead & Ginns	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Neolentinus</i> Redhead & Ginns	2013, 2021
	<i>Lentinus levis</i> (Berk. & M.A.Curtis) Murrill = <i>Panus strigosus</i> Berk. & M.A.Curtis	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Lentinus</i> Fr.	2013 -
	<i>Lentinus substrictus</i> (Bolton) Zmitr. & Kovalenko = <i>Polyporus ciliatus</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Lentinus</i> Fr.	2021
	<i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.: Fr.) Fr. = <i>Agaricus denticulatus</i> Schwein., 1822 = <i>Agaricus dunalii</i> DC. = <i>Panus tigrinus</i> (Bull.: Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Lentinus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Lenzites betulinus</i> (L.: Fr.) Fr. = <i>Agaricus betulinus</i> L. = <i>Agaricus coriaceus</i> Bull., 1792 = <i>Trametes betulina</i> (L.: Fr.) Pil	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Lenzites</i> Fr.	2021
	<i>Lenzites tricolor</i> Bourd. & Galz. = <i>Daedaleopsis confragrosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bull.: Fr.) Bondz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Lenzites</i> Fr.	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Leocarpus fragilis</i> (Dicks.) Rostaf., 1874 = <i>Diderma atrovirens</i> (Fr. & Lindgr.) Fr., 1829 = <i>Diderma ramosum</i> (Schumach.) Fr., 1829 = <i>Diderma vernicosum</i> Pers., 1795 = <i>Lycoperdon fragile</i> Dicks., 1785	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Leocarpus</i>	2013, 2021
	<i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers. = <i>Elvella lubrica</i> Scop. = <i>Fungius gelatinus</i> Vaillant = <i>Helvella gelatinosa</i> (Hill.) Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Leotiales</i> Familia: <i>Leotiaceae</i> Género: <i>Leotia</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Lepiota alba</i> Lloyd	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota aspera</i> (Pers. inHofm.: Fr.) Quélet. = <i>Cystolepiota aspera</i> (Pers.: Fr.) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota bruneoincarnata</i> Chod. & Mart.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota castanea</i> Quél. S. Canduso & Lanzoni.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota clypeolaria</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota cristata</i> (Bolton ex Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota echinella</i> Quél. & G.E.Bernard ≡ <i>Cystoderma echinellum</i> (Quél. & G.E.Bernard) Singer = <i>Lepiota minuta</i> J.E.Lange = <i>Lepiota rhodorhiza</i> P.D.Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013
	<i>Lepiota faeodisca</i>.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota felina</i> (Pers.) Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lepiota forquignonii</i> Quél. = <i>Lepiota olivaceobrunnea</i> P.D.Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013 -
	<i>Lepiota fulvella</i> Rea.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota grisea</i> Rick.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota griseovirens</i> Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota helveola</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota ignicolor</i> Bresadola.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota ignipes</i> Locquin exBon 1978 = <i>Lepiota castanea</i> Quél. = <i>Lepiota rufidula</i> Bres (1902)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota ignivolvata</i> Bousset & Joss. ex Joss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013 -
	<i>Lepiota incarnata</i> Clem. ex Sacc. YP. Syd.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota josserandii</i> Bon & Boiffard.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota laevigata</i> Lange. = <i>Lepiota oreadiformis</i> Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lepiota lepida</i> Guinb. & M.Bodin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013 -
	<i>Lepiota lilacea</i> Bresadola.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota ochraceodisca</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i> (Locquin) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013
	<i>Lepiota oreadiformis</i> Velen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota pratensis</i> (Bulliard) Bigeard & Guillemin.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021
	<i>Lepiota pseudolilacea</i> Huijsman ≡ <i>Lepiota pseudohelveola</i> Kühner = <i>Lepiota pseudohelveola</i> var. <i>sabulosa</i> Bon ≡ <i>Lepiotula pseudolilacea</i> (Huijsman) Wasser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013 -
	<i>Lepiota rufipes</i> Morgan = <i>Lepiota rufipes</i> f. <i>phaeophylla</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013 -
	<i>Lepiota subincarnata</i> Lange.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013, 2021
	<i>Lepiota sublaevigata</i> Bon-Boiffard	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013
	<i>Lepiota ventriosopora</i> Reid	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lepiota wasseri</i> Bon = <i>Lepiota kuehneriana</i> Locq.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lepiota</i> P.Browne, 1756	2013 -
	<i>Lepista caespitosa</i> (Bres.) Sing. = <i>Rhodopaxillus caespitosum</i> (Bres.) Sing. = <i>Clitocybe fasciculata</i> H. E. Bigelow & A. H. Sm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2013, 2021
	<i>Lepista gilva</i> (Pers.: Fr.) Roze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2021
	<i>Lepista glaucocana</i> (Bres.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2021
	<i>Lepista inversa</i> (Scop.: Fr.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2013, 2021
	<i>Lepista luscina</i> (Fr.) Singer ≡ <i>Agaricus luscinus</i> Fr. = <i>Clitocybe luscina</i> (Fr.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2021
	<i>Lepista nebularis</i> Batsch.: Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2021
	<i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cooke = <i>Collybia lilacea</i> Quél. = <i>Lepista nuda</i> var. <i>violacea</i> . (Bull. ex Fr.) Cooke = <i>Rhodopaxillus nudum</i> (Bull. Fr.) Mre. = <i>Tricholoma nudum</i> (Bull. Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2013, 2021
	<i>Lepista oreadiformis</i> Vel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2021
	<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) Karst. = <i>Agaricus calceolus</i> (Fr.) Fr. = <i>Clitocybe nimbata</i> (Batsch) Gillet = <i>Lepista luscina</i> (Fr.) Singer. = <i>Paxillus lepista</i> Fr. = <i>Tricholoma panaeolus</i> S (Fr.) Quél	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lepista personata</i> (Fr.) Cooke = <i>Agaricus anserinus</i> (Fr.) Eeden ≡ <i>Agaricus personatus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2022
	<i>Lepista ricekii</i> Bon = <i>Lepista piperita</i> RicekNonSs. Stevenson.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2021
	<i>Lepista saeva</i> (Fr.) Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2013, 2021
	<i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer = <i>Rhodopaxillus sordidus</i> (Schum.: Fr.) Mre. = <i>Lepista sordida</i> var. <i>obscura</i> . (Fr. ex Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Lepista</i> (Fries) W.G.Smith 1870.	2013, 2021
	<i>Leptoporus mollis</i> (Pers.) Quél. = <i>Bjerkandera alborosea</i> P. Karst. = <i>Boletus mollis</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Leptoporus</i> Quél.	2021
	<i>Leucoagaricus barssii</i> (Zeller) Vellinga ≡ <i>Lepiota barssii</i> Zeller = <i>Lepiota macrorrhiza</i> (Locq. ex E.Horak) Kühner & Romagn. = <i>Lepiota pinguipes</i> A.Pearson ≡ <i>Leucoagaricus macrorrhizus</i> Locq.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013 -
	<i>Leucoagaricus brunneolilacinus</i> Babos	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2021,
	<i>Leucoagaricus carneifolius</i> (Gillet) Wasser = <i>Leucoagaricus cinerascens</i> (Gillet) Vellinga	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2021
	<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini) Wasser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013, 2021
	<i>Leucoagaricus macrorrhizus</i> Locq. exHorak	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013
	<i>Leucoagaricus melanotrichus</i> (Malençon & Bertault) Trimbach. = <i>Lepiota melanotricha</i> Malençon & Bertault = <i>Leucoagaricus melanotrichus</i> var. <i>melanotrichus</i> (Malençon & Bertault) Trimbach.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon & Boiffard ≡ <i>Lepiota pilatiana</i> Demoulin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013 -
	<i>Leucoagaricus serenus</i> (Fr.) Bon & Boiffard ≡ <i>Sericeomyces serenus</i> (Fr.) Heinem.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013 -
	<i>Leucoagaricus subglobisporus</i> (Contu) Consiglio & Contu ≡ <i>Sericeomyces subglobisporus</i> Contu	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013 -
	<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (R. Kühner exHora) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2021
	<i>Leucoagaricus subvolvatus</i> (Malençon & Bertault) Bon ≡ <i>Lepiota subvolvata</i> Malençon & Bertault = <i>Leucoagaricus subvolvatus</i> f. <i>pictus</i> (Malençon & Bertault) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucoagaricus</i> Locq. ex Singer, 1948	2013 -
	<i>Leucocoprinus birnbaumii</i> (Corda) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucocoprinus</i>	2013
	<i>Leucocoprinus cretatus</i> Locquin ex. Lanzoni.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucocoprinus</i>	2021,
	<i>Leucocoprinus denudatus</i> (Rabenhorst) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Leucocoprinus</i>	2013
	<i>Leucocortinarius bulbifer</i> (A. Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucocortinarius</i>	2021
	<i>Leucogyrophana mollusca</i> (Fr.) Pouzar = <i>Merulius aurantiacus</i> Peck = <i>Merulius fugax</i> Fr. = <i>Merulius laeticolor</i> Berk. & Broome ≡ <i>Merulius molluscus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Hygrophoropsidaceae</i> Género: <i>Leucogyrophana</i> Pouzar	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Leucopaxillus albissimus</i> (Peck) Singer = <i>Agaricus albissimus</i> Peck = <i>Agaricus subhirtus</i> Peck = <i>Clitocybe albissima</i> (Peck) Sacc. = <i>Leucopaxillus albissimus</i> f. <i>euparadoxus</i> Singer & A.H.Sm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier	2013 -
	<i>Leucopaxillus cerealis</i> (Lasch) Sing. = <i>Leucopaxillus barbarus</i> (Maire) Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier	2021
	<i>Leucopaxillus gentianeus</i> (Quél.) Kotl. = <i>Clitocybe gentianeae</i> Quél. = <i>Clitocybe vulpecula</i> Kalchbr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier	2013, 2021
	<i>Leucopaxillus giganteus</i> (Sowerby) Singer = <i>Agaricus giganteus</i> Leysser = <i>Aspropaxillus giganteus</i> (Sowerby) Kühner & Maire = <i>Clitocybe cerussata</i> var. <i>monstrosa</i> (Sibth.) Singer = <i>Clitocybe geotropa</i> var. <i>gigantea</i> (Leysser) Bigeard & Guillemin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier	2013 -
	<i>Leucopaxillus malençonii</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier	2013,
	<i>Leucopaxillus paradoxus</i> (Cost. & Dufour) Bours. = <i>Leucopaxillus paradoxus</i> var. <i>albissima</i> . (Cost. & Dufour) Bours.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Leucopaxillus</i> Boursier	2021
	<i>Leucoscypha semiimmersa</i> (P. Karst.) Surcek	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Leucoscypha</i>	2013,
	<i>Licaethalium olivaceum</i> (Ehrenb.) Rostaf., 1875 = <i>Reticularia olivacea</i> (Ehrenb.) Fr., 1827	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Reticularia</i> Bull.	2013 -
	<i>Licea castanea</i> G. Lister, (1911)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Liceaceae</i> Género: <i>Licea</i>	2006
	<i>Licea denudescens</i> H.W.Keller & T.E.Brooks, 1977	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Liceaceae</i> Género: <i>Licea</i>	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Licea kleistobolus</i> G. W. Martín, 1942	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Liceaceae</i> Género: <i>Licea</i>	2006
	<i>Licea minima</i> Fr., 1829	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Liceaceae</i> Género: <i>Licea</i>	2006
	<i>Licea parasitica</i> (Zukal) G. W. Martin. (1942) = <i>Hymenobolus parasiticus</i> Zukal	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Liceaceae</i> Género: <i>Licea</i>	2006
	<i>Licea perexigua</i> T.E.Brooks & H.W.Keller, 1977	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Liceaceae</i> Género: <i>Licea</i>	2013 -
	<i>Licea variabilis</i> Schrad., 1797 = <i>Licea alutacea</i> Wallr., 1833 = <i>Licea flexuosa</i> Pers., 1801 ≡ <i>Trichia variabilis</i> (Schrad.) Poir., 1808 = <i>Tubifera flexuosa</i> (Pers.) E.Sheld., 1895	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Liceaceae</i> Género: <i>Licea</i>	2013 -
	<i>Lichenomphalia umbellifera</i> (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys = <i>Gerronema ericetorum</i> (Pers.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hygrophoraceae</i> Género: <i>Lichenomphalia</i> Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	2021
	<i>Limacella delicata</i> (Fr.) Earle ex Konrad & Maubl. = <i>Limacella glioderma</i> (Fr.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Limacella</i> (Earle 1909) Maire 1914.	2013 -
	<i>Limacella illinita</i> (Fr.) Murr. = <i>Lepiota illinita</i> Fr. = <i>Zhuliangomyces illinitus</i> (Fr.) Redhead	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Limacella</i> (Earle 1909) Maire 1914.	2013, 2021
	<i>Litschauerella clematidis</i> (Bourdot & Galzin) J.Erikss. & Ryvarden = <i>Aleurodiscus albus</i> (Burt) D.P.Rogers & H.S.Jacks. = <i>Hypochnus albus</i> Burt = <i>Tubulicium clematidis</i> (Bourd. & Galz.) Oberw. = <i>Xenasma clematidis</i> (Bourdot & Galzin) Liberta	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Trechisporales</i> Familia: <i>Hydnodontaceae</i> Género: <i>Litschauerella</i> Oberw.	2013 -
	<i>Lycogala epidendrum</i> Linnaeus, 1753 = <i>Lycoperdon epidendrum</i> L.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Cribariales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Lycogala</i> Adanson, 1763	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lycogala flavofuscum</i> (Ehrenb.) Rostaf., 1873 = <i>Diphtherium flavofuscum</i> Ehrenb.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Cribariales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Lycogala</i> Adanson, 1763	2013, 2021
	<i>Lycoperdon atropurpureum</i> Witt.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon echinatum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon ericaeum</i> Bonord. = <i>Lycoperdon ericaeum</i> var. <i>subareolatum</i> (Kreisel) Demoulin = <i>Lycoperdon muscorum</i> Morgan	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013 -
	<i>Lycoperdon foetidum</i> Bonorden.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2021
	<i>Lycoperdon lambinonii</i> Demoulin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013
	<i>Lycoperdon lividum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon molle</i> Pers. exPers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon nigrescens</i> Pers.: Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. = <i>Lycoperdon bonordenii</i> Massee = <i>Lycoperdon gemmatum</i> Batsch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon piriforme</i> Schaeff.: Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lycoperdon pratense</i> Pers. ≡ <i>Vascellum pratense</i> (Pers.) Kreisel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon radicatum</i> Durieu & Mont. = <i>Bovistella radicata</i> (Durieu & Mont.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Lycoperdon</i> P.Micheli, 1729	2013, 2021
	<i>Lyomyces crustosus</i> (Pers.) P. Karst. ≡ <i>Basidioradulum crustosum</i> (Pers.) Zmitr., Malysheva & Spirin ≡ <i>Grandinia crustosa</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Lyomyces</i>	2013 - 2021
	<i>Lyomyces juniperi</i> (Bourdot & Galzin) Riebesehl & Langer = <i>Hyphodontia juniperi</i> (Bourdot & Galzin) J.Erikss. & Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Lyomyces</i>	2013 -
	<i>Lyomyces pruni</i> (Lasch) Riebesehl & Langer = <i>Pteridomyces subsphaericosporus</i> Boidin, Duhem & Gilles = <i>Xylodon pruni</i> (Lasch) Hjortstam & Ryvarden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Lyomyces</i>	2013 -
	<i>Lyophyllum aggregatum</i> (Schaeff.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2021
	<i>Lyophyllum anthracophilum</i> (Lasch) M. Lange & Sivertsen.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Singer = <i>Agaricus aggregatus</i> Schaeff. = <i>Agaricus cinerescens</i> Bull. = <i>Lyophyllum conglobatum</i> (Vittad.) Bon = <i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.) P.D.Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Lyophyllum immundum</i> (Berk.) Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2021
	<i>Lyophyllum infumatum</i> (Bres.) Kühner.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Lyophyllum leucophaetum</i> (Karst.) Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2021
	<i>Lyophyllum loricatum</i> (Fr.) Kühn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Lyophyllum paelochroum</i> Cléménçon = <i>Lyophyllum immundum</i> Cléménçon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2022
	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i> Cléménçon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2013,
	<i>Lyophyllum transforme</i> (Britzelm) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Lyophyllum</i> P.Karst.	2013, 2021
M			
	<i>Macbrideola cornea</i> (G. Lister & Cran) Alexop (1967) = <i>Comatricha cornea</i> G. Lister & Cran	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Macbrideola</i>	2006
	<i>Macrocyttidia cucumis</i> (Pers: Fr.) Joss. = <i>Agaricus pisciodorus</i> Ces. = <i>Collybia mimica</i> (W. G. Sm.) Sacc. = <i>Derminus cucumis</i> (Pers.) J. Schröt.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Macrocyttidia</i> Joss.	2013, 2021
	<i>Macrolepiota excoriata</i> (Schaeff: Fr.) Wasser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2013, 2021
	<i>Macrolepiota fuliginosa</i> (Barla) Bon. = <i>Macrolepiota fuliginosa</i> var. <i>squarrosa</i> (Barla) Bon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2013, 2021
	<i>Macrolepiota gracilentia</i> (Krombh.) Wasser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Macrolepiota konradii</i> (Huijsman ex. Orton) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2021
	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2013, 2021
	<i>Macrolepiota olivascens</i> Singer ex M. M. Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2021
	<i>Macrolepiota phaeodisca</i> Bellú.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2013, 2021
	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Sing. = <i>Agaricus antiquatus</i> Batsch = <i>Agaricus colubrinus</i> Bull. = <i>Macrolepiota procera</i> var. <i>fuliginosa</i> (Barla) Bellú & Lanzoni. = <i>Macrolepiota procera</i> var. <i>pseudo-olivascens</i> Bellú & Lanzoni	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2013, 2021
	<i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vitt.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2013, 2021
	<i>Macrolepiota subsquarrosa</i> (Locquin) Bon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Macrolepiota</i> Singer	2021
	<i>Mallocybe fuscomarginata</i> (Kühner) Matheny & Esteve-Rav. ≡ <i>Inocybe fuscomarginata</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Mallocybe</i> (Kuyper) Matheny, Vizzini & Esteve-Rav., 2019	2013 -
	<i>Mallocybe malenconii</i> (R.Heim) Matheny & Esteve-Rav. = <i>Inocybe malenconii</i> var. <i>malenconii</i> = <i>Inocybe malenconii</i> var. <i>megaspora</i> J.Stangl & Bresinsky	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Mallocybe</i> (Kuyper) Matheny, Vizzini & Esteve-Rav., 2019	2013 -
	<i>Marasmius androsaceus</i> (Linn.: Fr.) Fr. = <i>Gymnopus androsaceus</i> (L.) Della Magg. & Trassin.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Gymnopus</i> (Pers.) Roussel	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Marasmius anomalus</i> (Perck)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Marasmius buxi</i> Fr. ≡ <i>Androsaceus buxi</i> (Fr.) Pat. ≡ <i>Chamaeceras buxi</i> (Fr.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013 -
	<i>Marasmius cohaerens</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Marasmius collinus</i> (Scop.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013 -
	<i>Marasmius corbariensis</i> (Roum.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Marasmius epiphyllus</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2021
	<i>Marasmius epodius</i> Bres. = <i>Marasmius anomalus</i> var. <i>microsporus</i> (Maire) Antonín	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013 -
	<i>Marasmius erythropus</i>.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2021
	<i>Marasmius hudsonii</i> (Pers: Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013,
	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr. = <i>Agaricus caryophyllaceus</i> Schaeff. = <i>Agaricus coriaceus</i> Lightf. = <i>Agaricus oreades</i> Bolton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Marasmius quercophyllus</i> Pouzar,	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Marasmius wynneae</i> Berk. & Broome = <i>Agaricus globularis</i> Weinm. = <i>Collybia globularis</i> (Fr.) Quél. = <i>Marasmius bresadolae</i> Schulzer = <i>Marasmius wynnei</i> Berk. & Broome.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Marasmius</i> Fr., 1836	2013 -
	<i>Marcelleina atrovioleacea</i> (Delile ex De seynes) Brumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Marcelleina</i>	2021,
	<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar = <i>Agaricus grammocephalus</i> Bull. ≡ <i>Agaricus platyphyllus</i> Pers. ≡ <i>Oudemansiella platyphylla</i> (Pers.) M. M. Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Megacollybia</i> Kotl. & Pouzar	2013, 2021
	<i>Melanogaster ambiguus</i> (Vitt.) L. & Ch. Tul., 1843 = <i>Hyperrhiza liquaminosa</i> Klotzsch = <i>Melanogaster ambiguus</i> var. <i>eurypermus</i> Zeller & C. W. Dodge	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Melanogaster</i> Corda	2013, 2021
	<i>Melanogaster variegatus</i> (Vittad.) Tul. & C.Tul. = <i>Bulliardia inquinans</i> Jungh. = <i>Hyperrhiza inquinans</i> (Jungh.) Rabenh. ≡ <i>Octaviania variegata</i> Vittad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Melanogaster</i> Corda	2022
	<i>Melanoleuca battaillei</i> Malençon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca brevipes</i> (Bull.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013, 2021
	<i>Melanoleuca cognata</i> (Fr.) Konrad & Maubl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013, 2021
	<i>Melanoleuca decembris</i> Metrod exBon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013, 2021
	<i>Melanoleuca evenosa</i> (Sacc.) Conrad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca excissa</i> (Fr.) Singer = <i>Tricholoma excisum</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Melanoleuca graminicola</i> (Velen.) Kühner & Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013, 2021
	<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013, 2021
	<i>Melanoleuca leucophylloides</i> (Bon) Bon = <i>Melanoleuca leucophylloides</i> var. <i>pruinatipes</i> G.Moreno & Bon = <i>Melanoleuca rasilis</i> var. <i>leucophylloides</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2022
	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca meridionalis</i> (G. Moreno & Barrasa)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca paedida</i> (Fr.) Kühner & Maire = <i>Agaricus paedidus</i> Fr. = <i>Gyrophila paedida</i> (Fr.) Quél. = <i>Tricholoma paedidum</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013 -
	<i>Melanoleuca polioleuca</i> (Fr.) Kühner & Maire = <i>Agaricus melaleucus</i> subsp. <i>polioleucus</i> Fr. = <i>Melaleuca vulgaris</i> Pat. = <i>Melanoleuca langei</i> (Boekhout) Bon = <i>Melanoleuca leucophylla</i> Métrod	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013 -
	<i>Melanoleuca pseudoluscina</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca pseudovenosa</i> Bon & Moreno.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca rasilis</i> (Fr.) Sin g.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca robusta</i> Bresadola.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Melanoleuca stridula</i> (Fr.) Singer = <i>Agaricus stridulus</i> Fr. = <i>Collybia stridula</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Gyrophila stridula</i> (Fr.) Quél. = <i>Melanoleuca pallidipes</i> (J.E.Lange) Bon:	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013 -
	<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca turrita</i> (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanoleuca vulgaris</i> (Pat.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2013, 2021
	<i>Melanuleuca excissa</i> (Fr.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melanuleuca melaleuca</i> (Pers.) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Melanoleuca</i> Pat., 1897	2021
	<i>Melastiza flavorubens</i> (Rehm) Pfister & Korf = <i>Melastiza chateri</i> Grélet & Le Gal	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Melastiza</i> Boud.	2013 -
	<i>Melzericium udicola</i> (Bourdot) Hauerlev = <i>Amylocorticium udicola</i> (Bourdot) Malençon & Bertault ≡ <i>Corticium udicola</i> Bourdot	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Melzericium</i> Hauerlev	2013 -
	<i>Mensularia nodulosa</i> (Fr.) T. Wagner & M. Fisch. = <i>Inonotus nodulosus</i> (Fr.) Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Mensularia</i> Lázaro Ibiza	2021
	<i>Meotatomyces dissimulans</i> (Berk. & Broome) Vizzini = <i>Pholiota ochroflavida</i> (Malençon) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Meotatomyces</i> Vizzini	2013 -
	<i>Meripilus giganteus</i> (Pers.) P. Karst. = <i>Agaricus aequivocus</i> (Holmsk.) E. H. L. Krause = <i>Agaricus multiplex</i> Dill., 1719 ≡ <i>Boletus giganteus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meripilaceae</i> Género: <i>Meripilus</i> P.Karst.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Merismodes anomalus</i> (Pers.) Singer = <i>Merismodes stipitatus</i> (Fuckel) Knudsen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Niaceae</i> Género: <i>Merismodes</i> Earlea	2013 -
	<i>Merismodes fasciculatus</i> (Schw.) Donk. = <i>Merismodes fasciculata</i> (Schwein.) Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Niaceae</i> Género: <i>Merismodes</i> Earlea	2021
	<i>Merulius tremellosus</i> Schrad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Mitrophora semilibera</i> (DC.: Fr.) Lév.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Mitrophora</i>	2013,
	<i>Mitrula elegans</i> (Berkeley) Fries	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Geoglossomycetes</i> Orden: <i>Geoglossales</i> Familia: <i>Geoglossaceae</i> Género: <i>Mitrula</i> E.M.Fries, 1821	2021
	<i>Montagnea radiosa</i> (Pall.) Šebek ≡ <i>Agaricus radiosus</i> Pall. = <i>Montagnites candollei</i> f. <i>isosporus</i> (Belli) Sacc. & Traverso = <i>Montagnites radiosus</i> (Pall.) Henn. = <i>Montagnites radiosus</i> var. <i>isosporus</i> Belli	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Montagnea</i> Fr.	2013 -
	<i>Morchella angusticeps</i> Peck = <i>Morchella angusticeps</i> var. <i>ovoideobrunnea</i> C.J.Mu	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013 -
	<i>Morchella conica</i> (Pers.) Boudier = <i>Morchella conica</i> var. <i>costata</i> (Vent.) Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013, 2021
	<i>Morchella costata</i> Pers. = <i>Morchella conica</i> var. <i>costata</i> (Vent.) Moser ≡ <i>Morchella elata</i> var. <i>costata</i> (Pers.) Kreisel = <i>Phallus costatus</i> Vent.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013 -
	<i>Morchella deliciosa</i> Fr. ≡ <i>Morchella conica</i> var. <i>deliciosa</i> (Fr.) Cetto = <i>Morchella deliciosa</i> var. <i>elegans</i> Boud. = <i>Morchella deliciosa</i> var. <i>purpurascens</i> Boud. ≡ <i>Morilla deliciosa</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Morchella elata</i> Fr. = <i>Boletus esculentus</i> var. <i>fuliginus</i> Pers. = <i>Boletus esculentus</i> var. <i>pinguis</i> (Thore) Pers. = <i>Morchella conica</i> var. <i>nigripes</i> M.M.Moser = <i>Morchella conico-papyracea</i> Jacquet., 1984	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013 -
	<i>Morchella elatoides</i> (Jacquetant)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013,
	<i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers. = <i>Helvella esculenta</i> (L.) Sowerby = <i>Morchella abietina</i> Leuba = <i>Morchella esculenta</i> var. <i>rotunda</i> Pers. = <i>Morchella conica</i> f. <i>cylindrica</i> (Velen.) Svrček	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013 -
	<i>Morchella eximia</i> Boud. = <i>Morchella conica</i> var. <i>acuminata</i> J.Kickx f. = <i>Morchella eximia</i> f. <i>acuminata</i> (J.Kickx f.) Clowez = <i>Morchella eximia</i> f. <i>multiformis</i> Clowez = <i>Morchella eximia</i> f. <i>schizocostata</i> Jacquet. ex Jacquet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013 -
	<i>Morchella intermedia</i> Boud., 1897 = <i>Morchella conica</i> var. <i>intermedia</i> Boud., 1897 = <i>Morchella elata</i> var. <i>intermedia</i> (Boud.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013 -
	<i>Morchella purpurascens</i> Jacquetant.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013,
	<i>Morchella semilibera</i> (DC.: Fr.) Lev.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Morchella</i> Dill. ex Pers.	2013, 2021
	<i>Mucilago crustacea</i> P. Micheli ex F. H. Wigg., 1780 = <i>Diderma spumariaeforme</i> Wallr., 1833 = <i>Mucilago spongiosa</i> (Leyss.) Morgan, 1897	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Didymiaceae</i> Género: <i>Mucilago</i> Battarra	2013, 2021
	<i>Mycena acicula</i> (Schaeff. ex Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Mycena alba</i> Bresad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena amicta</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena arcangeliana</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena atromarginata</i> (Lasch) P.Kumm	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena atropapillata</i> Kühner & Maire = <i>Marasmiellus atropapillatus</i> (Kühner & Maire) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena aurantiomarginata</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena avenacea</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2021
	<i>Mycena capillaripes</i> Peck s. Kühner.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena cinerella</i> (P.Karst.) P.Karst. = <i>Agaricus cinerellus</i> P.Karst. = <i>Mycena grisea</i> (Fr.) Kühner & Maire = <i>Omphalia cinerella</i> (P.Karst.) J.E.Lange = <i>Omphalia grisea</i> Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena clavicularis</i> (Fr.) Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Mycena corticola</i> (Pers. ex Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2021
	<i>Mycena diosma</i> Krieglest & Schowobel. 1982.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2021,
	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop.) Gray (*) = <i>Agaricus citrinellus</i> Pers ≡ <i>Agaricus epipterygius</i> Scop. = <i>Mycena epipterygia</i> var. <i>lignicola</i> A.H.Sm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2021
	<i>Mycena font-queri</i> Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2021,
	<i>Mycena galericulata</i> (Scop. ex Fr.) S. F. Gray.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena galopus</i> (Pers.) P.Kumm. = <i>Agaricus lactescens</i> Schrad., 1794 = <i>Agaricus leucogalus</i> Cooke = <i>Hiatula europaea</i> P.Karst. = <i>Mycena annae</i> Benedix	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena haematopus</i> (Pers.: Fr.) P. Kumm. = <i>Agaricus haematopus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013, 2021
	<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena leptcephala</i> (Pers.) Gillet = <i>Agaricus alcalinus</i> subsp. <i>leptocephalus</i> (Pers.) Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2021
	<i>Mycena meliigena</i> (Berk. & Cooke) Sacc. = <i>Agaricus meliigena</i> Berk. & Cooke = <i>Mycena meliigena</i> f. <i>alba</i> Courtec. = <i>Prunulus meliigena</i> (Berk. & Cooke) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena metata</i> (Secr. ex Fr.) P.Kumm. = <i>Agaricus collariatus</i> Fr. = <i>Agaricus laevigatus</i> Pers. = <i>Agaricus metatus</i> Secr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena mirata</i> (Peck) Sacc. = <i>Agaricus miratus</i> Peck = <i>Mycena supinoides</i> Kühner = <i>Prunulus miratus</i> (Peck) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Massee) Massee = <i>Mycena olivaceomarginata</i> f. <i>thymicola</i> (Velen.) Maas Geest.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena polygramma</i> (Bull.) Gray = <i>Mycena polygramma</i> f. <i>candida</i> J. E. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013, 2021
	<i>Mycena pseudoandrosacea</i> (Bull.) Z.S.Bi = <i>Omphalina pseudoandrosacea</i> (Bull.) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013, 2021
	<i>Mycena pura</i> (Pers.) P. Kumm. = <i>Agaricus ianthinus</i> Fr. = <i>Gymnopus purus</i> (Pers.) Gray = <i>Mycena pura</i> f. <i>alba</i> (Gillet) Kühner = <i>Mycena pura</i> var. <i>lutea</i> (Pers. ex Fr.) Kumm. (Gillet) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena purpureofusca</i> (Peck) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena quercus-ilicis</i> Kühner = <i>Mycena quercus-ilicilis</i> var. <i>citrina</i> Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Mycena renati</i> Quél. = <i>Agaricus flavipes</i> Quél. = <i>Mycena flavipes</i> Quél. = <i>Mycena luteo-alcalina</i> Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2021,
	<i>Mycena rosea</i> Gramberg = <i>Agaricus purus</i> var. <i>roseus</i> = <i>Agaricus roseus</i> Schaeff. = <i>Mycena rosea</i> f. <i>candida</i> Robich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013, 2021
	<i>Mycena rosella</i> (Fr.) P.Kumm. (*) ≡ <i>Agaricus rosellus</i> Fr. = <i>Mycena rosea</i> Sacc. = <i>Omphalia rosella</i> (Fr.) Anon. = <i>Prunulus roseolus</i> Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena seynii</i> Quél. = <i>Mycena seynii</i> f. <i>albida</i> Robich = <i>Mycena seynii</i> f. <i>pumila</i> Robich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806.	2013, 2021
	<i>Mycena smithiana</i> Kühner = <i>Mycena debilis</i> J.E.Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena stipata</i> Maas Geest. & Schwöbel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena stylobates</i> (Pers.) P.Kumm. = <i>Agaricus dilatatus</i> Fr. = <i>Agaricus torquatus</i> Fr. = <i>Basidopus stylobates</i> (Pers.) Anon. = <i>Marasmius torquatus</i> (Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycena supina</i> (Fr.) Quél. = <i>Agaricus supinus</i> Fr., 1821 = <i>Mycena supina</i> (Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013, 2021
	<i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) P.Kumm. ≡ <i>Agaricus vulgaris</i> Pers. = <i>Mycena vulgaris</i> (Pers.) Quel. = <i>Prunulus vulgaris</i> (Pers.) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806	2013 -
	<i>Mycenastrum corium</i> (Guers.) Desv. = <i>Lycoperdon corium</i> Guers. ex DC. & Lam. = <i>Mycenastrum chilense</i> Mont.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Mycenastrum</i> Desv.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Mycoacia aurea</i> (Fr.) J.Erikss. & Ryvarden = <i>Acia diaphana</i> (Schrad.) P.Karst., 1879 = <i>Dryodon nodulosum</i> (Fr.) Quél. = <i>Hydnum nodulosum</i> Fr. = <i>Mycoleptodon microcystidius</i>	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Mycoacia</i> Donk	2013 -
	<i>Mycoacia livida</i> (Pers.) Zmitr. = <i>Phlebia livida</i> (Pers.) Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Mycoacia</i> Donk	2013 -
	<i>Myriostoma coliforme</i> (With.: Pers.) Corda = <i>Geaster columnatum</i> Lév. = <i>Geaster hygrometricus</i> var. <i>coliformis</i> (With.) Quél. = <i>Geastrum coliforme</i> (Dicks.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gastrales</i> Familia: <i>Geastraceae</i> Género: <i>Myriostoma</i> Desv.	2013, 2021
	<i>Myxarium hyalinum</i> (Pers.) Donk = <i>Dacrymyces hyalinus</i> (Pers.) Quél. = <i>Tremella hyalina</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Hyaloriaceae</i> Género: <i>Myxarium</i> Wallr.	2013 -
	<i>Myxomphalia maura</i> (Fr.) Hora = <i>Agaricus maurus</i> Fr. = <i>Fayodia maura</i> (Fr.) Singer = <i>Gymnopus maurus</i> (Fr.) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Myxomphalia</i> Hora	2013, 2021
N			
	<i>Naucoria escharoides</i> (Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Naucoria</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Naucoria granulosa</i> . J. E. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Naucoria</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Naucoria melinoides</i> (Bull.) P. Kumm. = <i>Alnicola melinoides</i> (Bull.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Naucoria</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Naucoria pseudoamarescens</i> Kühner & Romagn	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Naucoria</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Naucoria subconspersa</i> Kühner exP. D. Orton = <i>Alnicola subconspersa</i> (Kühner exP. D. Orton) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Naucoria</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Nectria cinnabarina</i> (Tode) Fr. = <i>Tubercularia vulgaris</i> Tode	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Hypocreales</i> Familia: <i>Nectriaceae</i> Género: <i>Nectria</i> (Fr.) Fr., 1849	2013 -
	<i>Neoantrodia serialis</i> (Fr.) Audet = <i>Antrodia serialis</i> . (Fr.) Donk.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Neoantrodia</i> Audet	2021
	<i>Neodasyscypha cerina</i> (Pers.) Spooner = <i>Lachnum cerinum</i> (Pers.) Nannf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Lachnaceae</i> Género: <i>Neodasyscypha</i> Suková & Spooner	2013 -
	<i>Neournula pouchetii</i> (Berthet & Rioussset) Paden.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Chorioactidaceae</i> Género: <i>Neournula</i>	2013,
O			
	<i>Octospora grimmiae</i> Dennis & Itzerott = <i>Humaria leucoloma</i> var. <i>sphaerospora</i> Grélet = <i>Octospora leucoloma</i> var. <i>sphaerospora</i> (Grélet)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Octospora</i> Hedw.	2013 -
	<i>Octospora roxheimii</i> Denis & Itzerott	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Octospora</i> Hedw.	2013,
	<i>Oliveonia pauxilla</i> (H.S.Jacks.) Donk ≡ <i>Corticium pauxillum</i> H.S.Jacks. = <i>Heteromyces pauxillus</i> (H.S.Jacks.) L.S.Olive = <i>Oliveorhiza anapauxilla</i> P.Roberts	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Oliveoniaceae</i> Género: <i>Oliveonia</i> Donk	2013 -
	<i>Omphalia grisella</i> (Weinm.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2021
	<i>Omphalina obscurata</i> Kühner ex M. Lange	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2013, 2021
	<i>Omphalina oniscus</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.) Quél. = <i>Agaricus pyxidatus</i> Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2013, 2021
	<i>Omphalina rosella</i> (Lange) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2021
	<i>Omphalina setipes</i> (Fr.) Raithelh. = <i>Rickenella swartzii</i> (Fr.) Kreisel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2013 -
	<i>Omphalina sphagnicola</i> (Berk.) Mos	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2021
	<i>Omphalina umbellifera</i> L. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2021
	<i>Omphalina velutipes</i> Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Arrhenia</i> Fr	2013,
	<i>Omphalina vesuviana</i> (Brig.) Bellù & Lanz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Omphalina</i> Quél., 1886	2013, 2021
	<i>Omphalotus illudens</i> (Schwein.) Sacc. ≡ <i>Agaricus illudens</i> Schwein. = <i>Clitocybe illudens</i> (Schwein.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Omphalotus</i> Fayod	2013, 2021
	<i>Omphalotus olearius</i> (DC.) Singer = <i>Agaricus farneus</i> Fr. = <i>Agaricus olearius</i> DC.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Omphalotus</i> Fayod	2013, 2021
	<i>Onnia tomentosa</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Boletus tomentosus</i> (Fr.) Spreng. ≡ <i>Coltricia tomentosa</i> (Fr.) Murrill ≡ <i>Inonotus tomentosus</i> (Fr.) Teng	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Onnia</i> P.Karst.	2021
	<i>Onygena corvina</i> Alb & Schwein 1805	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Eurotiomycetes</i> Orden: <i>Onygenales</i> Familia: <i>Onygenaceae</i> Género: <i>Onygena</i> Pers.	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Orbilia auricolor</i> (A.Bloxam) Sacc. = <i>Arthrobotrys yunnanensis</i> M.H.Mo & K.Q.Zhang = <i>Calloria auricolor</i> (A.Bloxam) W.Phillips = <i>Hyalinia auricolor</i> (A.Bloxam) Boud. = <i>Peziza auricolor</i> A.Bloxam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Orbiliomycetes</i> Orden: <i>Orbiliales</i> Familia: <i>Orbiliaceae</i> Género: <i>Orbilia</i> Fr., 1836	2013 -
	<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers.) Redhead & Ginns = <i>Agaricus circinatus</i> Fr. = <i>Clitocybe circinata</i> (Gillet) P. Karst. = <i>Nothopanus lignatilis</i> (Pers.) Bon = <i>Pleurocybella lignatilis</i> (Pers.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Ossicaulis</i> Redhead & Ginns	2013, 2021
	<i>Osteina undosa</i> (Peck) Zmitr. = <i>Postia undosa</i> (Peck) Jülich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Osteina</i> Donk	2013 -
	<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Massee = <i>Aleuria alutacea</i> (Pers.) Gillet = <i>Helvella ochracea</i> Schaef.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Otidea</i> (Pers.) Bonord.	2013, 2021
	<i>Otidea bufonia</i> (Pers.) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Otidea</i> (Pers.) Bonord.	2013, 2021
	<i>Otidea cantharella</i> (Fr.) Quél. = <i>Otidea concinna</i> (Pers.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Otidea</i> (Pers.) Bonord.	2013 -
	<i>Otidea cochleata</i> (L.) Fuckel = <i>Otidea umbrina</i> (Pers.) Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Otidea</i> (Pers.) Bonord.	2013, 2021
	<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel. = <i>Aleuria abietina</i> (Pers.) Gillet = <i>Cochlearia abietina</i> (Pers.) Lambotte = <i>Discina abietina</i> (Pers.) Rehm	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Otidea</i> (Pers.) Bonord.	2013, 2021
	<i>Oudemansiella melanotricha</i> (Dörfelt) M. M. Moser = <i>Oudemansiella fraudulenta</i> (Métrod) Moser = <i>Xerula fraudulenta</i> Métrod, 1952	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Oudemansiella</i> Speg.	2013, 2021
P			
	<i>Pachyella violaceonigra</i> (Rehm) Pfister = <i>Aleuria barlaeana</i> (Bres.) Bres. = <i>Discina repanda</i> subsp. <i>stephensoniana</i> (Ellis) Sacc. = <i>Humaria violaceonigra</i> (Rehm) Sacc. = <i>Pachyella barlaeana</i> (Bres.) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Pachyella</i> Boud.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Panaeolina foenisecii</i> (Pers.) Maire = <i>Panaeolus foenisecii</i> (Pers.) Kühner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolina</i> Maire	2013 -
	<i>Panaeolus acuminatus</i> Schaeff. = <i>Coprinarius acuminatus</i> (Schaeff.) Quél., 1886	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Panaeolus caliginosus</i> (Jungh.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Panaeolus campanulatus</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Panaeolus cinctulus</i> (Bolton) Sacc. ≡ <i>Agaricus cinctulus</i> Bolton = <i>Agaricus fimicola</i> var. <i>cinctulus</i> (Bolton) Cooke = <i>Coprinus cinctulus</i> (Bolton) Gray = <i>Panaeolus dunensis</i> Bon & Courtec.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Panaeolus fimicola</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull. ex Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Panaeolus retirugis</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Panaeolus rickenii</i> Hora.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Panaeolus semiovatus</i> (Sowerby) S. Lundell & Nannf. = <i>Anellaria semiovata</i> (Sowerby) A. Pearson & Dennis	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Panellus stypticus</i> (Bull. Fr.) Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Panellus</i>	2013,
	<i>Panaeolus luscinus</i> (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Panaeolus</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Panus neostrigosus</i> Drechsler-Santos & Wartchow = <i>Lentinus strigosus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Panus</i> Fr.	2013 -
	<i>Panus rudis</i> Fr. = <i>Agaricus macrosporus</i> Mont.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Panus</i> Fr.	2021
	<i>Panus tigrinus</i> (Bull.: Fr.) Sing. = <i>Lentinus tigrinus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Panus</i> Fr.	2021
	<i>Paralepista flaccida</i> (Sowerby) Vizzini = <i>Clitocybe gilva</i> (Pers. ex Fr.) Roze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Paralepista</i> Raithelh.	2022
	<i>Parasola auricoma</i> (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple = <i>Coprinus auricomus</i> Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Parasola auricoma</i> Redhead, Vilgalys & Hopple	2013
	<i>Parasola auricoma</i> (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple ≡ <i>Coprinus auricomus</i> Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Parasola</i> Redhead, Vilgalys & Hopple	2021
	<i>Parasola galericuliformis</i> (Losa ex Watling) Redhead, Vilgalys & Hopple = <i>Coprinus galericuliformis</i> Losa	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Parasola</i> Redhead, Vilgalys & Hopple	2013 -
	<i>Parasola hemerobia</i> (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple ≡ <i>Coprinus hemerobius</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Parasola</i> Redhead, Vilgalys & Hopple	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Parasola plicatilis</i> (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple ≡ <i>Coprinus plicatilis</i> (Curtis) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Parasola</i> Redhead, Vilgalys & Hopple	2013, 2021
	<i>Paraxerula caussei</i> (Maire) R.H.Petersen = <i>Oudemansiella caussei</i> (Maire) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Paraxerula</i> R.H.Petersen	2013 -
	<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Paxillus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Paxillus filamentosus</i> (Scop.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Paxillus</i> Fr.	2021
	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Paxillus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Paxillus panuoides</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Paxillaceae</i> Género: <i>Paxillus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Paxina queletii</i> (Bres.) Stangl ≡ <i>Helvella queletii</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Helvellaceae</i> Género: <i>Paxina</i>	2013 -
	<i>Peniophora cinerea</i> (Pers.) Cooke = <i>Auricularia cinerea</i> (Pers.) Sowerby, 1803 = <i>Corticium bronzeum</i> Fr. ≡ <i>Corticium cinereum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora incarnata</i> (Pers.) P.Karst. = <i>Corticium aemulans</i> (P.Karst.) Bres. = <i>Corticium incarnatum</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora lilacea</i> Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora limitata</i> (Chaillet ex Fr.) Cooke = <i>Corticium fraxineum</i> (Pers.) Roum. = <i>Corticium limitatum</i> (Chaillet ex Fr.) Fr. = <i>Peniophora cinerea</i> var. <i>interrupta</i> (Pers.) Bourdot & Galzin = <i>Peniophora fraxinea</i> (Pers.) S.Lundell	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Peniophora lycii</i> (Pers.) Höhn. & Litsch. = <i>Corticium bupleuri</i> Roum. = <i>Corticium caesium</i> Bres. = <i>Corticium friesii</i> Grognaud	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013, 2021
	<i>Peniophora meridionalis</i> Boidin = <i>Peniophora carbonicola</i> var. <i>ravida</i> Bourd. & Galz. = <i>Peniophora versiformis</i> var. <i>ravida</i> Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora nuda</i> (Fr.) Bres. = <i>Corticium maculiforme</i> (Fr.) Fr. = <i>Corticium violaceolividum</i> subsp. <i>syringae</i> (P.Karst.) Sacc. = <i>Gloeopeniophora maculiformis</i> (Fr.) Höhn. & Litsch. = <i>Kneiffia nuda</i> (Fr.) Herter	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora proxima</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora pseudoversicolor</i> Boidin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora quercina</i> (Pers.) Cooke = <i>Auricularia corticalis</i> Bull. = <i>Corticium acerinum</i> subsp. <i>quercinum</i> (Pers.) Brinkmann, 1904 = <i>Corticium ciliatum</i> (Fr.) Fr., 1838	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013, 2021
	<i>Peniophora rufomarginata</i> (Pers.) Bourdot & Galzin = <i>Peniophora corticalis</i> subsp. <i>rufomarginata</i> (Pers.) Bourdot & Galzin = <i>Stereum rufomarginatum</i> (Pers.) Quél. = <i>Thelephora rufomarginata</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora versicolor</i> (Bres.) Sacc. & P.Syd. = <i>Corticium versicolor</i> Bres. = <i>Membranicium versicolor</i> (Bres.) Y.Hayashi = <i>Peniophora incarnata</i> subsp. <i>versicolor</i> (Bres.) Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophora violaceolivida</i> (Sommerf.) Massee = <i>Corticium cinctulum</i> Quél. = <i>Corticium violaceolividum</i> (Sommerf.) Fr. = <i>Gloeopeniophora violaceolivida</i> (Sommerf.) Y.Hayashi = <i>Peniophora cinctula</i> (Quél.) Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Peniophoraceae</i> Género: <i>Peniophora</i> Cooke, 1879	2013 -
	<i>Peniophorella pallida</i> (Bres.) K.H.Larss. = <i>Corticium pallidum</i> Bres. = <i>Gloeocystidium pallidum</i> (Bres.) Höhn. & Litsch. = <i>Hyphoderma pallidum</i> (Bres.) Donk = <i>Peniophora gilva</i> Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Rickenellaceae</i> Género: <i>Peniophorella</i> P.Karst.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Peniophorella praetermissa</i> (P.Karst.) K.H.Larss. = <i>Hyphoderma praetermissum</i> (P.Karst.) J.Erikss. & Å.Strid	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Rickenellaceae</i> Género: <i>Peniophorella</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Peniophorella pubera</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Hyphoderma puberum</i> (Fr.) Wallr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Rickenellaceae</i> Género: <i>Peniophorella</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Perenniporia rosmarini</i> A.David & Malençon ≡ <i>Poria rosmarini</i> (A.David & Malençon) Ginns	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Perenniporia</i> Murrill	2013 -
	<i>Perichaena chrysosperma</i> (Curr.) Lister (1894) = <i>Ophiotheca chrysosperma</i> Curr. 1854	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Perichaena</i> E.M. Fries, 1817	2006
	<i>Perichaena corticalis</i> (Batsch) Rost., Sluzowce monogr. (Paryz) 293 (1875) = <i>Lycoperdon corticale</i> Batsch	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Perichaena</i> E.M. Fries, 1817	2006
	<i>Perichaena depressa</i> . Libert, 1837	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Perichaena</i> E.M. Fries, 1817	2006
	<i>Perichaena vermicularis</i> (Schwein) 1876 = <i>Physarum vermiculare</i> Schwein. 1832	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Arcyriaceae</i> Género: <i>Perichaena</i> E.M. Fries, 1817	2006
	<i>Peziza ampliata</i> Pers. ≡ <i>Aleuria ampliata</i> (Pers.) Gillet = <i>Aleuria palustris</i> (Boud.) Le Gal ≡ <i>Galactinia ampliata</i> (Pers.) Le Gal	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013 -
	<i>Peziza badia</i> Pers. ex Mérat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2021
	<i>Peziza badioconfusa</i> Korf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Peziza celtica</i> (Bowd.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Peziza cerea</i> Bull.: Mérat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Peziza fimeti</i> (Fuckel) Seaver	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Peziza granulosa</i> Schumach.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2021
	<i>Peziza ninguis</i> Donadini & Trimbach = <i>Peziza fortoulia</i> Donadini & Neville = <i>Pezizia nivalis</i> Heim & Remy	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013 -
	<i>Peziza praetervisa</i> Bres. ≡ <i>Aleuria praetervisa</i> (Bres.) Bres. ≡ <i>Galactinia praetervisa</i> (Bres.) Boud. = <i>Peziza minor</i> (J.Moravec) T.Schumach., 2020 = <i>Pezizella obscurata</i> Rehm	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013 -
	<i>Peziza repanda</i> Pers. ex. Pers. = <i>Plicaria repanda</i> (Pers.) Fuckel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Peziza succosella</i> (Le Gal & Romagn.) M.M.Moser ex Aviz.-Hersh. & Nemlich	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013 -
	<i>Peziza vesiculosa</i> Bull. ex. St. Amans.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Peziza violacea</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Peziza</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Phaeoclavulina abietina</i> (Pers.) Giachini = <i>Ramaria abietina</i> (Pers.) Quél. = <i>Ramaria ochraceovirens</i> (Jungh.) Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Phaeoclavulina</i> Brinkmann, 1897	2013, 2021
	<i>Phaeoclavulina curta</i> (Fr.) Giachini = <i>Ramaria curta</i> (Fr.) Schild	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Phaeoclavulina</i> Brinkmann, 1897	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Phaeoclavulina decurrens</i> (Pers.) J.H.Petersen = <i>Ramaria decurrens</i> (Pers.) R.H.Petersen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Phaeoclavulina</i> Brinkmann, 1897	2013 -
	<i>Phaeoclavulina myceliosa</i> (Peck) Fanchi & M.Marchetti = <i>Ramaria myceliosa</i> (Peck) Corner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Phaeoclavulina quercus-ilicis</i> (Schild) Giachini ≡ <i>Ramaria quercus-ilicis</i> Schild	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat. = <i>Boletus maximus</i> Brotero = <i>Boletus sistotremoides</i> Alb. & Schwein. = <i>Calodon spadiceus</i> (Pers.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Phaeolus</i> (Pat.) Pat.	2013, 2021
	<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Scherff. ex Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Phaeomarasmius</i> Scherff.	2013, 2021
	<i>Phaeomarasmius rimulincola</i> (Rabenh.) Scherff. ≡ <i>Agaricus rimulincola</i> Rabenh. = <i>Galera horizontalis</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Phaeomarasmius</i> Scherff.	2013, 2021
	<i>Phaeophlebiopsis ravenelii</i> (Cooke) Zmitr. = <i>Phlebiopsis ravenelii</i> (Cooke) Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Phaeophlebiopsis</i> Floudas & Hibbett, 2015	2013 -
	<i>Phallus hadriani</i> Vent.: Pers. = <i>Hymenophallus hadriani</i> (Vent.) Nees	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Phallus</i> Junius ex L., 1753	2013, 2021
	<i>Phallus impudicus</i> Linn. = <i>Dictyophora duplicata</i> var. <i>obliterata</i> Malençon = <i>Hymenophallus togatus</i> Kalchbr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Phallales</i> Familia: <i>Phallaceae</i> Género: <i>Phallus</i> Junius ex L., 1753	2013, 2021
	<i>Phanerochaete jose-ferreirae</i> (D.A.Reid) D.A.Reid = <i>Byssomerulius jose-ferreirae</i> (D.A.Reid) Zmitr. ≡ <i>Corticium jose-ferreirae</i> D.A.Reid	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Phanerochaete</i> P.Karst., 1889	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Phanerochaete martelliana</i> (Bres.) J.Erikss. & Ryvarden = <i>Corticium martellianum</i> Bres. = <i>Grandiniella macrospora</i> (Bres.) Burds. = <i>Grandiniella martelliana</i> (Bres.) Zmitr. & Spirin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Phanerochaete</i> P.Karst., 1889	2013 -
	<i>Phanerochaete sordida</i> (P.Karst.) J.Erikss. & Ryvarden = <i>Cerocorticium albissimum</i> Rick = <i>Corticium allescheri</i> Bres. = <i>Corticium cremeum</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Phanerochaete</i> P.Karst., 1889	2013 -
	<i>Phanerochaete velutina</i> (DC.) P.Karst. = <i>Phanerochaete velutina</i> (DC.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Phanerochaete</i> P.Karst., 1889	2013 -
	<i>Phellinus igniarius</i> (L.) Quél. = <i>Agaricus igniarius</i> (L.) E. H. L. Krause = <i>Boletus fomentarius</i> subsp. <i>ungulatus</i> (Schaeff.) Pers., 1801 = <i>Boletus igniarius</i> L.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Phellinus</i> Quél., 1886	2013, 2021
	<i>Phellinus pini</i> (Brot.) Pilát = <i>Porodaedalea pini</i> (Brot.) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Phellinus</i> Quél., 1886	2013, 2021
	<i>Phellinus pomaceus</i> (Pers.) Maire = <i>Boletus fomentarius</i> var. <i>pomaceus</i> (Pers.) Pers. = <i>Boletus pomaceus</i> Pers. = <i>Phellinus tuberculosus</i> Niemelä	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Phellinus</i> Quél., 1886	2013, 2021
	<i>Phellinus torulosus</i> (Pers.: Pers.) Boud. & Galz. = <i>Fuscoporia torulosa</i> (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Fuscoporia</i> Murrill	2013, 2021
	<i>Phellodon melaleucus</i> (Sw. ex Fr.) P. Karst	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Phellodon</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Phellodon niger</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Calodon niger</i> (Fr.) Quél. = <i>Calodon nigrum</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Phellodon</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Phlebia lilascens</i> (Bourdot) J.Erikss. & Hjortstam = <i>Corticium lilascens</i> Bourdot = <i>Corticium pallidoincarnatum</i> Litsch. = <i>Lilaceophlebia lilascens</i> (Bourdot) Spirin & Zmitr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.	2013 -
	<i>Phlebia ryvardenii</i> Hallenb. & Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Phlebia subserialis</i> (Bourdot & Galzin) Donk = <i>Corticium subseriale</i> Bourdot & Galzin = <i>Lilaceophlebia subserialis</i> (Bourdot & Galzin) Spirin & Zmitr. = <i>Peniophora subserialis</i> (Bourdot & Galzin) Slysh	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.	2013 -
	<i>Phlebia subulata</i> J.Erikss. & Hjortstam = <i>Jacksonomyces subulatus</i> (J.Erikss. & Hjortstam) Sheng H.Wu & Z.C.Chen = <i>Lilaceophlebia subulata</i> (J.Erikss. & Hjortstam) Spirin & Zmitr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.	2013 -
	<i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone & Burds. = <i>Merulius imbricatus</i> Balf.-Browne = <i>Merulius tremellosus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.	2013 -
	<i>Phlebia unica</i> (H.S.Jacks. & Dearden) Ginns = <i>Phlebia cremeoalutacea</i> (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Phlebia</i> Fr.	2013 -
	<i>Phlebiopsis gigantea</i> (Fr.) Jülich = <i>Corticium giganteum</i> (Fr.) Fr. = <i>Kneiffia gigantea</i> (Fr.) Bres. = <i>Kneiffia lurideolivacea</i> Rick = <i>Peniophora crosslandii</i> Massee	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Phlebiopsis</i> Jülich	2013 -
	<i>Phloeomana minutula</i> (Sacc.) Redhead = <i>Mycena olida</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Porothelaeaceae</i> Género: <i>Phloeomana</i> Redhead	2013 -
	<i>Pholiota adiposa</i> (Batsch) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Pholiota aurivella</i> (Batsch) P. Kumm. = <i>Pholiota cerifera</i> (P. Karst.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Pholiota conissans</i> (Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk. = <i>Pholiota conissans</i> (Fr.) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Pholiota flavida</i> (Schaeff.: Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Pholiota graminis</i> (Quél.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Pholiota gummosa</i> (Lasch) Singer. = <i>Pholiota gummosa</i> var. <i>obscurifusca</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Quadr. = <i>Pholiota carbonaria</i> (Fr.: Fr.) Sing. non A. H. Smith	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Pholiota jahnii</i> (Tjall. & Bas)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013,
	<i>Pholiota lenta</i> (Pers. ex Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quél. = <i>Agaricus lucifer</i> Lasch = <i>Dryophila lucifera</i> (Lasch) Quél. = <i>Pholiota lucifera</i> subsp. <i>friesiana</i> P.Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Pholiota melaphila</i> Raithelh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Pholiota oedipus</i> (Cke.) P. D. Ort.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Meotomyces</i> Vizzini	2013,
	<i>Pholiota pinicola</i> Jacobsson	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Pholiota squarrosa</i> (Mull.: Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2021
	<i>Pholiota tuberculosa</i> (Fr. Schaef.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Pholiota</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Pholiotina vestita</i> (Fr. in Quel.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Bolbitiaceae</i> Género: <i>Conocybe</i> Fayod, 1889	2013
	<i>Phyllactinia guttata</i> (Wallr.) Lév. = <i>Alphitomorpha guttata</i> Wallr. = <i>Erysiphe betulae</i> DC. = <i>Erysiphe coryli</i> DC. = <i>Erysiphe guttata</i> (Wallr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Erysiphales</i> Familia: <i>Erysiphaceae</i> Género: <i>Phyllactinia</i> Lév., 1851	2013 -
	<i>Phyllactinia mali</i> (Duby) U.Braun = <i>Erysiphe guttata</i> var. <i>mespili</i> Castagne	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Erysiphales</i> Familia: <i>Erysiphaceae</i> Género: <i>Phyllactinia</i> Lév., 1851	2013 -
	<i>Phylloporia ribis</i> (Schumach.) Ryvar den = <i>Phellinus ribis</i> (Schumach.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Phylloporia</i> Murrill	2013, 2021
	<i>Physarum album</i> (Bull.) Chevall. 1826 = <i>Physarum nutans</i> Pers., 1795 = <i>Tilmadoche nutans</i> (Pers.) Rostaf. 1874	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum auripigmentum</i> G.W.Martin, 1948	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2013 -
	<i>Physarum bitectum</i> G. Lister, 1911	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum brunneolum</i> (W. Phillips) Masee (1892) = <i>Diderma brunneolum</i> W. Phillips	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum cinereum</i> (Batsch) Pers. 1794 = <i>Lycoperdon cinereum</i> Batsch	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum compressum</i> Alb. & Schwein. 1805	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum contextum</i> (Pers.) Pers., 1801 = <i>Diderma contextum</i> Pers. 1796	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Physarum decipiens</i> MA. Curtis, 1848 = <i>Badhamia chrysotricha</i> (Berk. & M. A. Curtis) Rostaf., 1876	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum leucophaeum</i> Fries, 1818 = <i>Didymium terrestre</i> Fr., 1836 = <i>Lignyidium granulatum</i> (Balf. f.) Kuntze, 1898	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum leucopus</i> Schumach. 1809.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum pezizoideum</i> (Jun) Pavill & Lagarde, 1903 = <i>Trichamphora pezizoidea</i> Jungh.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum pusillum</i> (Berk. & M.A.Curtis) G.Lister, 1911 = <i>Badhamia nodulosa</i> Massee, 1889 = <i>Craterium nodulosum</i> (Massee) Morgan, 1896 = <i>Didymium pusillum</i> Berk. & M.A.Curtis, 1873 = <i>Lignyidium calidris</i> (Lister) Kuntze, 1898	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2013 -
	<i>Physarum robustum</i> (Lister) Nann.-Bremek., 1973 = <i>Physarum nutans</i> subsp. <i>robustum</i> A.Lister = <i>Physarum nutans</i> var. <i>robustum</i> Lister, 1894 = <i>Physarum robustum</i> var. <i>coeruleum</i> Nann.-Bremek., 1973	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2013 -
	<i>Physarum straminipes</i> Lister, 1898	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2006
	<i>Physarum viride</i> (Bull.) Pers., 1795 = <i>Chondrioderma exiguum</i> Racib., 1889 = <i>Physarum aurantium</i> (Bull.) Pers., 1801 = <i>Physarum aureum</i> Pers., 1794 = <i>Physarum luteum</i> (Bull.) Pers., 1801	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Physarales</i> Familia: <i>Physaraceae</i> Género: <i>Physarum</i> Persoon, 1794	2013 -
	<i>Picipes rhizophilus</i> (Pat.) J. L. Zhou & B. K. Cui = <i>Polyporus rhizophilus</i> Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Picipes</i> Zmitr. & Kovalenko	2021
	<i>Piloderma byssinum</i> (P.Karst.) Jülich = <i>Athelia byssina</i> (P.Karst.) Parmasto = <i>Athelia byssina</i> f. <i>xanthella</i> (Bourdot & Galzin) Parmasto = <i>Byssocorticium byssinum</i> (P.Karst.) Bondartsev & Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Atheliales</i> Familia: <i>Atheliaceae</i> Género: <i>Piloderma</i> Jülich	2022

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.: Fr.) Karst. = <i>Fomitopsis betulina</i> (Bull.) B. K. Cui, M. L. Han & Y. C. Dai	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Fomitopsis</i> P.Karst., 1881	2013, 2021
	<i>Pisolithus arhizus</i> (Scop. exPers.) Rauschert	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Pisolithus</i> Alb.& Schwein.	2021
	<i>Pisolithus tinctorius</i> (Pers.) Coker & Couch = <i>Pisolithus arhizus</i> (Scop.) Rauschert	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Pisolithus</i> Alb.& Schwein.	2013, 2021
	<i>Pithya cupressina</i> (Batsch) Fuckel = <i>Dasyscypha cupressi</i> W.Phillips = <i>Helotium thujinum</i> Peck = <i>Humaria cupressina</i> (Batsch) Quél. = <i>Lachnella cupressi</i> (Batsch) W.Phillips	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Sarcoscyphaceae</i> Género: <i>Pithya</i> Fuckel, 1870	2013 -
	<i>Plagiostoma apiculatum</i> (Wallr.) L.C.Mejía = <i>Cryptodiaporthe salicina</i> Wehm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Diaporthales</i> Familia: <i>Gnomoniaceae</i> Género: <i>Plagiostoma</i> Fuckel, 1870	2013 -
	<i>Pleurocybella porrigens</i> (Pers.) Singer = <i>Nothopanus porrigens</i> (Pers.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Marasmiaceae</i> Género: <i>Pleurocybella</i> Singer	2021
	<i>Pleurotus cornucopiae</i> (Paul) Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2021
	<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers. ex Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Pleurotus eryngii</i> (D. C. ex Fr.) Quél. = <i>Pleurotus eryngii</i> var. <i>ferulae</i> (Lanzi) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Pleurotus nebrodensis</i> (Inzenga) Quél. = <i>Pleurotus eryngii</i> var. <i>nebrodensis</i> (Inzenga) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013 -
	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm. = <i>Agaricus convivarum</i> Dunal = <i>Agaricus fuliginus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Pleurotus pulmonarius</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pleurotaceae</i> Género: <i>Pleurotus</i> (Fr.) P.Kumm., 1871	2013, 2021
	<i>Plicaria atrospora</i> (Fuckel) Boud. ≡ <i>Peziza atrospora</i> Fuckel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Plicaria</i> Fuckel	2013 -
	<i>Plicaria endocarpoides</i> (Berk.) Rifai (*) ≡ <i>Peziza endocarpoides</i> Berk. = <i>Plicaria leiocarpa</i> (Curr.) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Plicaria</i> Fuckel	2013 -
	<i>Pluteus atromarginatus</i> (Sing.) Kühn. = <i>Pluteus nigrofloccosus</i> (R. Schulz.) F	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013,
	<i>Pluteus cervinus</i> P. Kumm = <i>Pluteus atricapillus</i> (Batsch) Fayod	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Pluteus cinereofuscus</i> Lange.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Pluteus cinereus</i> Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2021
	<i>Pluteus ephebeus</i> (Fr.) Gillet ≡ <i>Agaricus ephebeus</i> Fr. = <i>Pluteus drepanophyllus</i> (Schulzer) Singer = <i>Pluteus lepiotoides</i> A.Pearson = <i>Pluteus murinus</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013 -
	<i>Pluteus leoninus</i> (Schaff. ex Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Pluteus nanus</i> (Pers.: Fr.) P. Kumm. 1871. = <i>Agaricus nanus</i> Pers. = <i>Pluteus griseopus</i> P. D. Orton, 1960 (Vellinga & Schreurs, 1985). = <i>Pluteus nanus</i> f. <i>griseopus</i> (P. D. Ort.) Vellinga = <i>Pluteus satur</i> Kühner & Romagn. 1956.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2021
	<i>Pluteus nigrofloccosus</i> (R. Schulz.) Favre	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013,
	<i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet = <i>Agaricus cervinus</i> subsp. <i>patricius</i> Schulzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013 -
	<i>Pluteus plautus</i> (Weinm.) Gillet ≡ <i>Agaricus plautus</i> Weinm. = <i>Pluteus boidieri</i> P.D.Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013 -
	<i>Pluteus romelli</i> (Britzelm.) Lap.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Pluteus</i> Fr.	2021,
	<i>Podospaera aphanis</i> (Wallr.) U.Braun & S.Takam. = <i>Sphaerotheca aphanis</i> (Wallr.) U.Braun	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Erysiphales</i> Familia: <i>Erysiphaceae</i> Género: <i>Podospaera</i> Kunze	2013 -
	<i>Polyporus arcularius</i> Batsch: Fr. = <i>Lentinus arcularius</i> (Batsch) Zmitr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Lentinus</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Polyporus brumalis</i> Pers. = <i>Boletus brumalis</i> subsp. <i>brumalis</i> = <i>Leucoporus brumalis</i> (Pers.) Sacc., 1972	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Polyporus</i> P.Micheli ex Adans.	2021
	<i>Polyporus mori</i> (Pollini) Fr	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Neofavolus</i>	2013,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Polyporus tuberaster</i> (Jacq. ex Pers.) Fr. = <i>Boletus tuberaster</i> Jacq., 1796 = <i>Cerioporus boucheanus</i> (Klotzsch) Quél. = <i>Cerioporus forquignonii</i> (Quél.) Quél. = <i>Favolus boucheanus</i> Klotzsch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Polyporus</i> P.Micheli, 1729	2013 -
	<i>Poronia punctata</i> (L.) Fr. = <i>Hypoxylon punctatum</i> (L.) Grev. ≡ <i>Peziza punctata</i> L. = <i>Poronia truncata</i> (Bolton) Fr. = <i>Sphaeria poronia</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Xylariales</i> Familia: <i>Xylariaceae</i> Género: <i>Poronia</i> Willd., 1787	2013, 2021
	<i>Porostereum spadiceum</i> (Pers.) Hjortstam & Ryvarden = <i>Lopharia spadicea</i> (Pers.) Boidin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Porostereum</i> Pilát	2013 -
	<i>Postia sericeomollis</i> (Romell) Jülich ≡ <i>Amylocystis sericeomollis</i> (Romell) Teixeira = <i>Chaetoporellus asiaticus</i> (Pilát) M.P.Christ. = <i>Chaetoporellus litschaueri</i> (Pilát) Bondartsev = <i>Leptoporus asiaticus</i> (Pilát) Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Postia</i> Fr.	2013 -
	<i>Postia simanii</i> (Pilát) Jülich ≡ <i>Chaetoporellus simanii</i> Pilát ≡ <i>Leptoporus simanii</i> Pilát = <i>Oligoporus simanii</i> (Pilát) A.David	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Fomitopsidaceae</i> Género: <i>Postia</i> Fr.	2013 -
	<i>Protoglossum niveum</i> (Vittad.) T.W.May ≡ <i>Hymenogaster niveus</i> Vittad.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Cortinariaceae</i> Género: <i>Protoglossum</i> Massee, 1891	2013 -
	<i>Protomerulius dubius</i> (Bourdot & Galzin) V.Spirin & V.Malysheva = <i>Heterochaetella dubia</i> (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Exidiaceae</i> Género: <i>Protomerulius</i> Möller	2013 -
	<i>Protostropharia dorsipora</i> Esteve-Raventós & Barrasa. = <i>Psilocybe dorsipora</i> (Esteve-Rav. & Barrasa) Noordel. = <i>Stropharia dorsipora</i> Esteve-Rav. & Barrasa,	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Protostropharia</i> Redhead, Moncalvo & Vilgalys, 2013	2021,
	<i>Protostropharia luteonitens</i> (Fr.) Redhead = <i>Psilocybe luteonitens</i> (Fr.) Park.-Rhodes	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Protostropharia</i> Redhead, Moncalvo & Vilgalys, 2013	2013 -
	<i>Prototrichia metallica</i> (Berk.) Massee, 1889 = <i>Prototrichia chamaeleontina</i> Massee, 1892 = <i>Prototrichia cuprea</i> Massee, 1889 = <i>Prototrichia elegantula</i> Rostaf., 1876 = <i>Prototrichia flagellifer</i> (Berk. & Broome) Rostaf., 1876	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Prototrichia</i> Rostaf.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Psathyrell spadicea</i> (Schaeff.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Homophron</i> (Britzelm.) Örstadius & E.Larss.	2013,
	<i>Psathyrella bipellis</i> (Quél.) A. H. Sm. = <i>Drosophila bipellis</i> (Quél.) Quél. = <i>Pilosace barlae</i> (Bres.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. ex Fr.) Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella conopilus</i> (Fr. ex Fr.) Pears. & Dennis.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella dryophila</i> (Bull. ex Merat) Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Psathyrella gracilis</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella hirta</i> Peck. = <i>Psathyrella coprobia</i> (J.E.Lange) A.H.Sm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella hydrophila</i> (Bull. ex Merat) Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella involuta</i> (Romagn.) M.M.Moser ≡ <i>Drosophila involuta</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Psathyrella lacrymabunda</i> (Bull.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Psathyrella leucotephra</i> (Bk. & Bk.) Orton.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Psathyrella melanthina</i> (Fr.) Kits vanWav.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) A.H.Sm. = <i>Astylospora multipedata</i> (Peck) Murrill = <i>Drosophila fasciculata</i> Bertrand = <i>Drosophila stipitatissima</i> J.E.Lange = <i>Psathyra fasciculata</i> Vel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Psathyrella panaeoloides</i> (Maire) Arnolds = <i>Drosophila panaeoloides</i> (Maire) Kühner & Romagn. ≡ <i>Psathyra panaeoloides</i> Maire = <i>Psathyrella panaeoloides</i> (Maire) M.M.Moser	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Psathyrella pennata</i> (Fr.) Konrad & Maubl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Psathyrella pseudogracilis</i> (Romagn.) M. M. Moser = <i>Drosophila pseudogracilis</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013, 2021
	<i>Psathyrella sarcocephala</i> (Fr.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Sch.) R. Mre.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013,
	<i>Psathyrella spintrigera</i> (Fr.) Konrad & Maubl. = <i>Agaricus spintriger</i> Fr. = <i>Drosophila appendiculata</i> var. <i>spintrigera</i> (Fr.) Quél. = <i>Drosophila spintrigera</i> (Fr.) Kühner & Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2013 -
	<i>Psathyrella squamosa</i> (Karst.) Kühn. & Romag.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2021
	<i>Psathyrella velutina</i> (Pers. ex Fr.). = <i>Lacrymaria lacrymabunda</i> (Bull.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Lacrymaria</i> Pat.	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Psathyrella vinosofulva</i> O. D. Orton = <i>Psathyrella calcárea</i> (Romagn.) Mos. = <i>Psathyrella prona</i> var. <i>utriformis</i> Kits vanWav.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Psathyrellaceae</i> Género: <i>Psathyrella</i> (Fr.) Quél., 1872	2021,
	<i>Pseudaleuria fibrillosa</i> (Masse) J. Moravec = <i>Tricharina fibrillosa</i> (Masse) Chin S. Yang & Korf	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Pseudaleuria</i> Lusk	2022
	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.) Singer = <i>Agaricus aithopus</i> Holmsk. = <i>Agaricus cinerascens</i> Batsch = <i>Agaricus cyathiformis</i> Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Pseudoclitocybe</i> (Singer) Singer	2013, 2021
	<i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Pers.) Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Pseudoclitocybe</i> (Singer) Singer	2021
	<i>Pseudoclitocybe obbata</i> (Fr.) Singer = <i>Agaricus obbatus</i> Fr. = <i>Cantharellula obbata</i> (Fr.) Bousset = <i>Clitocybe cyathiformis</i> var. <i>obbata</i> (Fr.) Bigeard & Guillemin = <i>Clitocybe obbata</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Pseudoclitocybe</i> (Singer) Singer	2013 -
	<i>Pseudocraterellus undulatus</i> (Pers.) Rauschert = <i>Pseudocraterellus sinuosus</i> (Fr.) Corner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Pseudocraterellus</i> Corner	2013 -
	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.) P. Karst. = <i>Tremellodon gelatinosum</i> (Scop.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Exidiaceae</i> Género: <i>Pseudohydnum</i>	2021
	<i>Pseudoomphalina pachyphylla</i> (Frías: Tries) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Pseudoomphalina</i>	2013-
	<i>Pseudosperma cerinum</i> (Malençon) Matheny & Esteve-Rav. = <i>Inocybe rimosa</i> var. <i>cerina</i> (Malençon) Bon & Courtec.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Pseudosperma</i> Matheny & Esteve-Rav., 2019	2013, 2021
	<i>Pseudosperma perlatum</i> (Cooke) Matheny & Esteve-Rav. = <i>Inocybe rimosa</i> var. <i>perlata</i> (Cooke) Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Pseudosperma</i> Matheny & Esteve-Rav., 2019	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Pseudosperma rimosum</i> (Bull.) Matheny & Esteve -Rav. = <i>Inocybe rimos</i> a (Bull. ex Fr.) P. Kumm. = <i>Inocybe fastigiata</i> (Schaeff.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Pseudosperma</i> Matheny & Esteve-Rav., 2019	2013, 2021
	<i>Pseudotomentella nigra</i> (Höhn. & Litsch.) Svrček ≡ <i>Tomentella nigra</i> Höhn. & Litsch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Pseudotomentella</i> Svrček	2013 -
	<i>Psilocybe coprophila</i> (Bull.: Fr.) P. Kumm = <i>Deconica coprophila</i> (Bull.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Deconica</i> (W.G.Sm.) P.Karst.	2013, 2021
	<i>Psilocybe coronilla</i> (Bull.) Noordel. = <i>Stropharia coronilla</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Psilocybe</i> (Fr.) P.Kumm.	2013, 2021
	<i>Psilocybe ericaeoides</i> (P. D. Orton) Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Hypholoma</i>	2013 -
	<i>Psilocybe merdaria</i> (Fr.: Fr.) Ricken = <i>Deconica merdaria</i> (Fr.) Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Deconica</i> (W.G.Sm.) P.Karst.	2013, 2021
	<i>Psilocybe subcoprophila</i> (Britzelm.) Sacc. ≡ <i>Agaricus subcoprophilus</i> Britzelm. = <i>Deconica subcoprophila</i> (Britzelm.) E.Horak = <i>Geophila coprophila</i> var. <i>subcoprophila</i> (Britzelm.) Kühner & Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Hymenogastraceae</i> Género: <i>Psilocybe</i> (Fr.) P.Kumm.	2013 -
	<i>Ptychoverpa bohémica</i> (Krombholz) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Verpa</i> Sw.	2013,
	<i>Pulveroboletus gentilis</i> (Quélet) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Aureoboletus</i> Pouzar	2013,
	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.) P. Karst. ≡ <i>Boletus cinnabarinus</i> Jacq. = <i>Boletus coccineus</i> Bull., 1791	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Pycnoporus</i> P.Karst.	2013, 2021
R			

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Radulomyces confluens</i> (Fr.) M.P.Christ. ≡ <i>Cerocorticium confluens</i> (Fr.) Jülich & Stalpers = <i>Coniophora avellanea</i> Burt, 1917 = <i>Corticium albidum</i> Boud. = <i>Corticium caesioalbum</i> (P.Karst.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pterulaceae</i> Género: <i>Radulomyces</i> M.P.Christ.	2013 -
	<i>Radulomyces molaris</i> (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ. ≡ <i>Cerocorticium molare</i> (Chaillet ex Fr.) Jülich & Stalpers	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pterulaceae</i> Género: <i>Radulomyces</i> M.P.Christ.	2013 -
	<i>Ramaria apiculata</i> (Fr.) Donk = <i>Ramaria apiculata</i> var. <i>apiculata</i>	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2021
	<i>Ramaria aurea</i> (Schaeff.: Fr.) Quél. = <i>Clavaria aurea</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013, 2021
	<i>Ramaria cedretorum</i> (Maire) Malençon = <i>Clavaria cedretorum</i> (Maire) Sacc. & Trotter ≡ <i>Clavariella cedretorum</i> Maire = <i>Ramaria fennica</i> var. <i>cedretorum</i> (Maire) Schild	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Ramaria comitis</i> Schild	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Ramaria fennica</i> (P.Karst.) Ricken = <i>Ramaria fennica</i> var. <i>griseolilacina</i> Schild	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Ramaria flava</i> (Schaeff. ex Fr.) Quél. = <i>Clavaria flava</i> (Schaeff. ex Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013, 2021
	<i>Ramaria flavoides</i> Schild	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Ramaria formosa</i> (Pers.) Quél. = <i>Clavaria formosa</i> Fr. = <i>Corallium formosa</i> Pers = <i>Corallium formosum</i> (Pers.) G.Hahn = <i>Merisma formosa</i> (Pers.) Sprengel, 1827	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Ramaria fumigata</i> (Peck) Corner ≡ <i>Clavaria fumigata</i> Peck = <i>Clavaria versatilis</i> (Quél.) Bourd. & Galz., 1910 = <i>Ramaria fennica</i> var. <i>fumigata</i> (Peck) Schild	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Ramaria gracilis</i> (Pers.) Quél. = <i>Clavaria fragilis</i> var. <i>gracilis</i> (Pers.) Duby, 1830 = <i>Clavaria fragrantissima</i> G.F.Atk. = <i>Clavaria gracilis</i> Fr. = <i>Clavaria palmata</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Ramaria pallida</i> (Schaeff. exSchulzer) Ricken. ≡ <i>Clavaria pallida</i> Schaeff. ≡ <i>Ramaria mairei</i> Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2021
	<i>Ramaria stricta</i> (Fr.) Quél. = <i>Clavaria dendroidea</i> Fr. = <i>Clavaria kewensis</i> Masee	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013, 2021
	<i>Ramaria subtilis</i> (Coker) Schild = <i>Clavaria flava</i> f. <i>subtilis</i> (Coker) S.Imai = <i>Ramaria subtilis</i> var. <i>crassispota</i> Schild = <i>Ramaria subtilis</i> var. <i>microspora</i> R.H.Petersen & Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Ramaria suecica</i> (Fr.) Donk = <i>Clavaria circinans</i> Peck = <i>Clavariella suecica</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Merisma suecicum</i> (Fr.) Spreng. = <i>Ramaria circinans</i> (Peck) Marr & D.E.Stuntz	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gomphales</i> Familia: <i>Gomphaceae</i> Género: <i>Ramaria</i> Fr. ex.Bonord.	2013 -
	<i>Reddellomyces donkii</i> (Malençon) Trappe, Castellano & Malajczuk ≡ <i>Labyrinthomyces donkii</i> Malençon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Reddellomyces</i> J.M.Trappe, M.A.Castellano & N.Malajczuk, 1992	2013 -
	<i>Resiniporus resinascens</i> (Romell) Zmitr. = <i>Ceriporiopsis resinascens</i> (Romell) Domański ≡ <i>Polyporus resinascens</i> Romell = <i>Poria resinacens</i> (Romell) S. Lundell & Nannf. ≡ <i>Tyromyces resinascens</i> (Romell) Bondartsev & Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Resiniporus</i>	2013 -
	<i>Resupinatus alboniger</i> (Pat.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Resupinatus</i> Nees ex Gray, 1821	2021,
	<i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch: Fr.) S. F. Gray,	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Resupinatus</i> Nees ex Gray, 1821	2021,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Resupinatus silvanus</i> (Sacc.) Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Resupinatus</i> Nees ex Gray, 1821	2021
	<i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.) Sin ger.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Resupinatus</i> Nees ex Gray, 1821	2021
	<i>Reticularia liceoides</i> (Lister) Nann.-Bremek., 1973 ≡ <i>Enteridium liceoides</i> (Lister) G.Lister, 1919 ≡ <i>Enteridium olivaceum</i> subsp. <i>liceoides</i> Lister	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Reticularia</i> Bull.	2013 -
	<i>Reticularia lycoperdon</i> Bull. 1790 = <i>Enteridium lycoperdon</i> (Bull.) M. L. Farr. (1976)	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Liceales</i> Familia: <i>Tubiferaceae</i> Género: <i>Reticularia</i> Bull.	2006
	<i>Rheubarbariboletus armeniacus</i> (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi = <i>Xerocomus armeniacus</i> Anon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Rheubarbariboletus</i> Vizzini, Simonini & Gelardi	2013 -
	<i>Rheubarbariboletus persicolor</i> (H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert) Vizzini, Simonini & Gelardi ≡ <i>Xerocomus persicolor</i> H. Engel, Klofac, H. Grünert & R. Grünert	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Rheubarbariboletus</i> Vizzini, Simonini & Gelardi	2013, 2021
	<i>Rhizocybe vermicularis</i> (Fr.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno & Consiglio ≡ <i>Clitocybe vermicularis</i> (Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Rhizocybe</i> Vizzini, G. Moreno, P. Alvarado & Consiglio	2013 -
	<i>Rhizopogon luteolus</i> Fr. & Nordholm. = <i>Elaphomyces laevigatus</i> Lespault = <i>Rhizopogon induratus</i> Cooke = <i>Rhizopogon obtectus</i> (Spreng.) Rausch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Rhizopogonaceae</i> Género: <i>Rhizopogon</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda in Sturm) Th. M. Fries. = <i>Hysterangium rubescens</i> (Quél.) Pat. = <i>Hysterangium stoloniferum</i> var. <i>rubescens</i> (Tul. & C. Tul.) Zeller & C. W. Dodge = <i>Rhizopogon vulgaris</i> (Vittard.) M. Lange.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Rhizopogonaceae</i> Género: <i>Rhizopogon</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Rhodocollybia asema</i> (Fr.) Bendiksen & Dima, 2021 = <i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i> (Fr.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Rhodocollybia</i> Singer	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Bull.) Lennox = <i>Collybia butyracea</i> (Bull.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Rhodocollybia</i> Singer	2013, 2021
	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Singer = <i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schwein.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Rhodocollybia</i> Singer	2021
	<i>Rhodocollybia prolixa</i> (Fr.) Antonín & Noordel. = <i>Collybia prolixa</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Omphalotaceae</i> Género: <i>Rhodocollybia</i> Singer	2022
	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.) Raithelh. ≡ <i>Agaricus fibula</i> Bull. = <i>Agaricus fibula</i> var. <i>conica</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Rickenella</i>	2021
	<i>Ripartites metrodii</i> Huijism.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Ripartites</i> P.Karst.	2013, 2021
	<i>Ripartites tricholoma</i> (A. S.) Karst. = <i>Agaricus eriocephalus</i> DC.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Ripartites</i> P.Karst.	2021
	<i>Romagnesiella clavus</i> (Romagn.) Contu, Matheny, P. A. Moreau, Vizzini & DeHaan ≡ <i>Galerina clavus</i> Romagn. = <i>Romagnesiella clavus</i> f. <i>mediterranea</i> Contu & P. -A. Moreau	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Crassisporiaceae</i> Género: <i>Romagnesiella</i> Contu, Matheny, P.- A. Moreau, Vizzini & A. de Haan, 2014	2021,
	<i>Rubroboletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang ≡ <i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Rubroboletus</i> Kuan Zhao & Zhu L. Yang	2013 -
	<i>Rugosomyces carneus</i> (Bull.: Fr.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Rugosomyces</i>	2013,
	<i>Russula acrifolia</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula albonigra</i> (Krombh.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula amara</i> Kucera = <i>Russula caerulea</i> auct.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula amoena</i> Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021,
	<i>Russula amoenicolor</i> Romagn. ≡ <i>Russula amoenicolor</i> f. <i>nigrosanguinea</i> Romagn. = <i>Russula amoenicolor</i> f. <i>olivacea</i> Maire = <i>Russula amoenicolor</i> var. <i>fenoloviolasces</i> Donelli	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2022
	<i>Russula amoenolens</i> Romagn. = <i>Russula amoenolens</i> var. <i>alba</i> Derbsch & Schmitt	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,	2013, 2021
	<i>Russula anthracina</i> Romag. = <i>Russula anthracina</i> var. <i>carnifolia</i> . Romag	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula atramentosa</i> Sarnari	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula atropurpurea</i> Krombholz.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula aurata</i> (With.) ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula aurea</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021,
	<i>Russula badia</i> Quél. = <i>Russula freisii</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula caerulea</i> Fr. = <i>Agaricus caeruleus</i> Pers. = <i>Russula amara</i> Kučera = <i>Russula caerulea</i> var. <i>umbonata</i> Gillet = <i>Russula coerulea</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -
	<i>Russula cessans</i> (A. Pearson) = <i>Russula odorata</i> Romag.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula chamaleontina</i> (Fr.) Fr. s. Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula chloroides</i> (Krombh.) Bres. = <i>Russula chloroides</i> var. <i>trachyspora</i> (Romagn.) Sarnari	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula cicatricata</i> H. Romagn exBon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021,
	<i>Russula cistoadelpha</i> M.M.Moser & Trimbach = <i>Russula cistoadelpha</i> f. <i>pseudounicolor</i> Sarnari	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -
	<i>Russula claroflava</i> Grove.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula cutedructa</i> Cke.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr. = <i>Agaricus cyanoxanthus</i> Schaeff. = <i>Agaricus lividus</i> var. <i>angustatus</i> Pers. = <i>Hypophyllum virens</i> Paulet = <i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>cutedructa</i> Cooke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula decipiens</i> (Singer) Bon = <i>Russula maculata</i> var. <i>decipiens</i> Singer = <i>Russula romagnesii</i> Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula delica</i> Fr. = <i>Russula delica</i> var. <i>puta</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula densifolia</i> (secc.) Gill.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula drimeia</i> Cke.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula emetica</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula flava</i> Lindl.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula foetens</i> (Pers.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula fragilis</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula fusconigra</i> Moser.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula fuscorubra</i> (Bres.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula grisea</i> (Pers.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr. = <i>Russula heterophylla</i> var. <i>vesca</i> (Fr.) Bohus y Babos	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula illota</i> Romagnesi	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,	2021
	<i>Russula inamoena</i> Sarnari	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,	2021
	<i>Russula insignis</i> Quélet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,	2021
	<i>Russula integra</i> (L.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula ionochlora</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula laeta</i> Moll. & J. Schaeff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula laurocerasi</i> Melzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,	2021
	<i>Russula lutea</i> (Huds.) S. F. Gray.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula luteotacta</i> Rea 1922.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021,
	<i>Russula maculata</i> Quél. = <i>Russula maculata</i> var. <i>bresadolana</i> (Singer) Romagn. = <i>Russula straminea</i> f. <i>globispora</i> (Blum) Cl.Lejeune	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula monspeliensis</i> , Sarnari	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula mota</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula mustelina</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula nigricans</i> (Bull) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula ochroleuca</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula olivacea</i> (Shaeff.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula pallidospora</i> J. Blum ex Romagn. = <i>Russula pseudodelica</i> var. <i>pallidospora</i> J. Blum	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula parazurea</i> Jul. Schäff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula pectinata</i> (Bull.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula pectinatoides</i> Peck. = <i>Russula pectinatoides</i> var. <i>pseudoamoenolens</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula pelargonia</i> Niolle	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula persicina</i> Krombh. = <i>Russula intactor</i> Jul. Schäff. = <i>Russula luteotacta</i> subsp. <i>intactor</i> Jul. Schäff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula praetervisa</i> Sarnari	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,	2021
	<i>Russula pseudoaeruginea</i> (Romagn.) Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -
	<i>Russula queletii</i> Fr. Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula rascorubra</i> (Bres.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula risigallina</i> (Batsch.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula romelii</i> R. Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula rubroalba</i> (Singer) Romagnesi	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013,
	<i>Russula sanguinea</i> (Bull. exSt. Amans) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula sardonias</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula seperina</i> Dupain	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -
	<i>Russula sororia</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula straminea</i> Malençon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021,
	<i>Russula subazurea</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -
	<i>Russula subfoetens</i> W. G. Smith	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.,	2013, 2021
	<i>Russula torulosa</i> Bresad. = <i>Russula torulosa</i> var. <i>fusciorubra</i> Bresa = <i>Russula torulosa</i> var. <i>luteovirens</i> Boud. ex. Bon = <i>Russula fusciorubra</i> f. <i>olivovirens</i> (Blum) Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula turci</i> Bresad ss. Maire.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula urens</i> Romell.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula vesca</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013, 2021
	<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bres.) Romagn	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula violeipes</i> Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021
	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr. ≡ <i>Agaricus virescens</i> Schaeff. = <i>Russula virescens</i> f. <i>erythrocephala</i> Hongo = <i>Russula viridirubrolimbata</i> J.Z.Ying	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013 -
	<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff. ex Secr.) Fr. = <i>Russula xerampelina</i> var. <i>fuscoochracea</i> Michel & Schulzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Russula zvarae</i> Velen. = <i>Russula zvarae</i> var. <i>pusilla</i> Sarnari	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Russulaceae</i> Género: <i>Russula</i> Pers.	2013,
	<i>Rutstroemia conformata</i> (P. Karst.) Nannf. = <i>Ciboria conformata</i> (P. Karst.) Svrček	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Rutstroemiaceae</i> Género: <i>Rutstroemia</i> P.Karst., 1871	2013 -
	<i>Rutstroemia firma</i> (Pers.) P.Karst. = <i>Calycina firma</i> (Pers.) Gray = <i>Cenangium firmum</i> (Pers.) de Not. = <i>Ciboria firma</i> (Pers.) Fuckel = <i>Ciboria ochroleuca</i> (Bolton) Massee	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Rutstroemiaceae</i> Género: <i>Rutstroemia</i> P.Karst., 1871	2013 -
	<i>Rutstroemia sydowiana</i> (Rehm) W.L.White = <i>Ciboria sydowiana</i> Rehm = <i>Ombrophila sydowiana</i> Rehm = <i>Phialea sydowiana</i> (Rehm) Rick = <i>Poculum sydowianum</i> (Rehm) Dumont	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Rutstroemiaceae</i> Género: <i>Rutstroemia</i> P.Karst., 1871	2013 -
S			
	<i>Saproamanita singeri</i> (Bas) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu ≡ <i>Amanita singeri</i> Bas	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Saproamanita</i> Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu, 2016	2013
	<i>Saproamanita vittadinii</i> (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu = <i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Amanitaceae</i> Género: <i>Saproamanita</i> Redhead, Vizzini, Drehmel & Contu, 2016	2021
	<i>Sarcodon cyrneus</i> Maas Geest.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quélex P.Karst.	2013 -
	<i>Sarcodon fennicus</i> (P.Karst.) P.Karst. = <i>Hydnum fennicum</i> (P.Karst.) Sacc. = <i>Phaeodon fennicus</i> (P.Karst.) Henn. ≡ <i>Sarcodon scabrosus</i> var. <i>fennicus</i> P.Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quélex P.Karst.	2013 -
	<i>Sarcodon glaucopus</i> Maas Geest. & Nannf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quélex P.Karst.	2021
	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.) P. Karst. = <i>Bankera infundibulum</i> (Sw.) Pouzar = <i>Fungius imbricatus</i> (L.) Paulet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quélex P.Karst.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Bataille (*) = <i>Hydnellum joeides</i> (Pass.) E.Larss., K.H.Larss. & Kõljalg ≡ <i>Hydnum joeides</i> Pass.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quél.ex P.Karst.	2013 -
	<i>Sarcodon laevigatum</i> (Fr. exSow) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quél.ex P.Karst.	2021
	<i>Sarcodon leucopus</i> (Pers.) Maas Geest. & Nannf.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quél.ex P.Karst.	2013, 2021
	<i>Sarcodon scabrosus</i> (Fr.) P.Karst. ≡ <i>Hydnum scabrosum</i> Fr. = <i>Phaeodon scabrosus</i> (Fr.) Henn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Bankeraceae</i> Género: <i>Sarcodon</i> Quél.ex P.Karst.	2013 -
	<i>Sarcodontia pachyodon</i> (Pers.) Spirin = <i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers.) Kotl. & Pouzar	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Sarcodontia</i> Schulzer	2013, 2021
	<i>Sarcodontia spumea</i> (Sowerby) Spirin = <i>Spongipellis spumeus</i> (Sowerby) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Sarcodontia</i> Schulzer	2013, 2021
	<i>Sarcoscypha coccinea</i> (Scop.) Lambotte = <i>Elvella coccinea</i> Scop. = <i>Scypharia coccinea</i> (Scop.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Sarcoscyphaceae</i> Género: <i>Sarcoscypha</i> (Fr.) Boud.	2013, 2021
	<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J.Schröt. = <i>Sarcosphaera crassa</i> (Santi) Pouzar	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Sarcosphaera</i> Auersw.	2013 -
	<i>Scenidium nitidum</i> (Durand & Montagne) O. Kuntze = <i>Daedaleopsis nitida</i> (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Daedaleopsis</i> J.Schröt.	2013, 2021
	<i>Schizophyllum amplum</i> (Lév.) Nakasone = <i>Auricularia leveillei</i> Cooke & Quél., 1878 = <i>Auricularia syringae</i> Fuckel, 1873 = <i>Auriculariopsis ampla</i> (Lév.) Maire	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Schizophyllaceae</i> Género: <i>Schizophyllum</i> Fr., 1815	2013, 2021
	<i>Schizophyllum commune</i> Fr. = <i>Agaricus alneus</i> L. = <i>Agaricus alneus</i> Reichard = <i>Agaricus multifidus</i> Batsch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Schizophyllaceae</i> Género: <i>Schizophyllum</i> Fr., 1815	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.) Donk = <i>Agaricus versiporus</i> (Pers.) E. H. L. Krause = <i>Coriolus obliquus</i> (Schrad.) Pat. = <i>Daedalea mollis</i> Velen.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Schizopora</i> Velen.	2013, 2021
	<i>Schizostoma laceratum</i> (Ehrenb. Fr.) Lév = <i>Queletia laceratum</i> (Ehrenb. ex Fr.) S. Ahmad ≡ <i>Tulostoma laceratum</i> Ehrenb.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Schizostoma</i> Ehrenb. ex Lév.	2021
	<i>Scleroderma bovista</i> Fr. = <i>Phlyctospora fusca</i> Corda = <i>Scleroderma fuscum</i> (Corda) E. Fisch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Scleroderma</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Scleroderma cepa</i> Pers. = <i>Lycoperdon cepae-facie</i> Vaillant = <i>Scleroderma cepa</i> var. <i>erythraeum</i> Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Scleroderma</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Scleroderma</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Scleroderma meridionale</i> Demoulin & Malençon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Scleroderma</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Scleroderma polyrhizum</i> J. F. Gmel. ex. Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Scleroderma</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.) Pers. = <i>Lycoperdon verrucosum</i> Bull. = <i>Scleroderma cepa</i> var. <i>maculatum</i> (Peck) Lloyd = <i>Scleroderma maculatum</i> (Peck) Lloyd	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Sclerodermataceae</i> Género: <i>Scleroderma</i> Pers., 1801	2013, 2021
	<i>Scutellinia barlae</i> (Boud.) Maire ≡ <i>Ciliaria barlae</i> Boud. = <i>Lachnea barlae</i> (Boud.) Gillet = <i>Rubelia barlae</i> (Boud.) Nieuwl. = <i>Scutellinia barlae</i> (Boud.) Le Gal	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Scutellinia</i> (Cooke) Lambotte, 1888	2013 -
	<i>Scutellinia crucipila</i> (Cooke & W. Phillips) J. Moravec = <i>Cheilymenia crucipila</i> (Cooke & W. Phillips) LeGal	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Scutellinia</i> (Cooke) Lambotte, 1888	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Scutellinia scutellata</i> (L.) Lambotte = <i>Allophylaria terrigena</i> P.Karst. ≡ <i>Ciliaria scutellata</i> (L.) Quél. = <i>Elvella ciliata</i> Schaeff. = <i>Humaria ciliata</i> (Schaeff.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Scutellinia</i> (Cooke) Lambotte, 1888	2013 -
	<i>Scutellinia trechisperma</i> Donadini = <i>Scutellinia trechisperma</i> f. <i>macropilifera</i> Donadini = <i>Scutellinia trechisperma</i> f. <i>micropilifera</i> Donadini = <i>Scutellinia trechisperma</i> f. <i>nigromarginata</i> Donadini	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Scutellinia</i> (Cooke) Lambotte, 1888	2013 -
	<i>Scytinostroma alutum</i> Lanq.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Lachnocladiaceae</i> Género: <i>Scytinostroma</i> Donk, 1956	2013 -
	<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Agaricus enchymosus</i> (Fr.) Fr. = <i>Agrocybe centunculus</i> (Fr.) Romagn., 1963 = <i>Hylophila centunculus</i> (Fr.) Quél. = <i>Naucoria centunculus</i> (Fr.) P.Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Simocybe</i> P.Karst., 1879	2013 -
	<i>Simocybe haustellaris</i> (Fr.) Watling = <i>Simocybe rubi</i> (Berk.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Simocybe</i> P.Karst., 1879	2013, 2021
	<i>Simocybe sumptuosa</i> (P.D.Orton) Singer = <i>Agrocybe sumptuosa</i> (P.D.Orton) Romagn., 1963 ≡ <i>Naucoria sumptuosa</i> P.D.Orton = <i>Ramicola centunculus</i> var. <i>luxurians</i> Romagn. = <i>Ramicola sumptuosa</i> (P.D.Orton) Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Inocybaceae</i> Género: <i>Simocybe</i> P.Karst., 1879	2013 -
	<i>Sistotrema brinkmannii</i> (Bres.) J.Erikss. = <i>Corticium catonii</i> Burgeff = <i>Corticium masculi</i> Sprau = <i>Corticium varians</i> Kniep = <i>Odontia brinkmannii</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Sistotrema</i> Fr.	2013 -
	<i>Sistotrema confluens</i> Pers. = <i>Corticium rutilans</i> Bref., 1889 = <i>Hydnum sublamellosum</i> Bull. = <i>Irpex anomalus</i> Wettst. = <i>Polyporus rutrosus</i> Rostk., 1848 = <i>Sistotrema confluens</i> Pers. ex Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Sistotrema</i> Fr.	2013,
	<i>Sistotrema diademiferum</i> (Bourdot & Galzin) Donk ≡ <i>Corticium diademiferum</i> Bourdot & Galzin = <i>Diplonema diademiferum</i> (Bourdot & Galzin) Park.-Rhodes = <i>Trechispora diademifera</i> (Bourdot & Galzin) D.P.Rogers	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Sistotrema</i> Fr.	2013 -
	<i>Sistotrema muscicola</i> (Pers.) S.Lundell = <i>Grandinia muscicola</i> (Pers.) Bres. = <i>Hydnum diaphanum</i> var. <i>muscicola</i> (Pers.) Sacc. = <i>Hydnum limonicolor</i> Berk. & Broome, 1878	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Sistotrema</i> Fr.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Sistotrema octosporum</i> (J.Schröt. ex Höhn. & Litsch.) Hallenb. = <i>Corticium muscicola</i> Bres. = <i>Corticium octosporum</i> J.Schröt. = <i>Sistotrema camshadalicum</i> Parmasto = <i>Sistotrema commune</i> J.Erikss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Cantharellaceae</i> Género: <i>Sistotrema</i> Fr.	2013 -
	<i>Skeletocutis albocrema</i> A.David	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Skeletocutis</i> Kotl. & Pouzar	2013 -
	<i>Skeletocutis amorpha</i> (Fr.) Kotl. & Pouzar = <i>Agaricus kymatodes</i> (Rostk.) E.H.L.Krause = <i>Bjerkandera mollusca</i> P.Karst. = <i>Coriolus kymatodes</i> (Rostk.) Bourdot & Galzin = <i>Gloeoporus amorphus</i> (Fr.) Clém. & Shear	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Skeletocutis</i> Kotl. & Pouzar	2013 -
	<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Jean Keller = <i>Incrustoporia nivea</i> (Jungh.) Ryvarden = <i>Microporus niveus</i> (Jungh.) Kuntze = <i>Polyporus hymenicola</i> Murrill, 1920 = <i>Trametes nivea</i> (Jungh.) Corner	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Skeletocutis</i> Kotl. & Pouzar	2013 -
	<i>Skeletocutis percandida</i> (Malençon & Bertault) Jean Keller = <i>Incrustoporia percandida</i> (Malençon & Bertault) A.David = <i>Poria percandida</i> Malençon & Bertault	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Skeletocutis</i> Kotl. & Pouzar	2013 -
	<i>Skeletocutis subincarnata</i> (Peck) Jean Keller = <i>Incrustoporia subincarnata</i> (Peck) Domański = <i>Poria attenuata</i> var. <i>subincarnata</i> Peck = <i>Poria calcea</i> var. <i>fragilis</i> Bourdot & Galzin, 1925 = <i>Poria subincarnata</i> (Peck) Murrill	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Skeletocutis</i> Kotl. & Pouzar	2013 -
	<i>Smardaea planchonis</i> (Dunal ex Boud.) Korf & W.Y.Zhuang (*) = <i>Pulparia planchonis</i> (Dunal ex Boud.) Korf, Pfister & J.K.Rogers	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Smardaea</i> Svrček	2013 -
	<i>Sowerbyella radiculata</i> (Sowerby) Nannf. = <i>Aleuria petaloidea</i> (Cooke & W.Phillips) Boud. = <i>Aleuria radiculata</i> (Sowerby) Gillet = <i>Femsjonina radiculata</i> (Sowerby) G.W.Martin = <i>Geopyxis cookei</i> Massee	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Sowerbyella</i> Nannf.	2013 -
	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr. = <i>Clavaria crispa</i> (Scop.) Sacc. = <i>Clavaria crispa</i> Wulfen = <i>Elvela ramosa</i> Schaeff., 1774	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Sparassidaceae</i> Género: <i>Sparassis</i> Fr.	2013, 2021
	<i>Sparassis laminosa</i> Fr. = <i>Masseola laminosa</i> (Fr.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Sparassidaceae</i> Género: <i>Sparassis</i> Fr.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Sphaerobolus stellatus</i> Tode = <i>Carpobolus albicans</i> P. Micheli exWilld. = <i>Carpobolus cyclophorus</i> Desm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Gaeastrales</i> Familia: <i>Gaeastraceae</i> Género: <i>Sphaerobolus</i> Tode	2013, 2021
	<i>Steccherinum ciliolatum</i> (Berk. & M.A.Curtis) Gilb. & Budington = <i>Acia ciliolata</i> (Berk. & M.A.Curtis) Pat. = <i>Hydnum ciliolatum</i> Berk. & M.A.Curtis = <i>Irpex ciliolatus</i> (Berk. & M.A.Curtis) Kotir. & Saaren. = <i>Odontia ciliolata</i> (Berk. & M.A.Curtis) Rick	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Steccherinum</i> Gray	2013 -
	<i>Steccherinum fimbriatum</i> (Pers.) J.Erikss. = <i>Gloiodon fimbriatus</i> (Pers.) Donk = <i>Hydnum fimbriatum</i> (Pers.) Poir., 1808 = <i>Hydnum fimbriatum</i> var. <i>denudatum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Steccherinum</i> Gray	2013 -
	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) Gray = <i>Acia denticulata</i> (Pers.) P.Karst. = <i>Climacodon ochraceus</i> (Pers. ex J.F.Gmel.) P.Karst. = <i>Gloiodon pudorinus</i> (Fr.) P.Karst. = <i>Hydnum daviesii</i> Sowerby, 1796	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Steccherinum</i> Gray	2013 -
	<i>Stemonitis axifera</i> (Bulliard) Macbride, 1889 = <i>Trichia axifera</i> Bull. 1790	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Stemonitis</i> Roth, 1787	2006
	<i>Stemonitis fusca</i> Roth, 1787 = <i>Stemonitis castillensis</i> T. Macbr., 1893 = <i>Stemonitis nigrescens</i> Rex, 1891	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Stemonitis</i> Roth, 1787	2013, 2021
	<i>Stemonitis smithii</i> T. Macbr. (1893) = <i>Stemonitis axifera</i> (Bull.) T. Macbr.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Stemonitis</i> Roth, 1787	2006
	<i>Stemonitis splendens</i> Rostaf. 1874 = <i>Stemonitis acuminata</i> Massee, 1892 = <i>Stemonitis baeuerlinii</i> Massee, 1892	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Stemonitis</i> Roth, 1787	2006
	<i>Stemonitopsis amoena</i> (Nann. -Bremek.) Nann. -Bremek. (1975) = <i>Comatricha amoena</i> Nann. -Bremek.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Stemonitopsis</i> (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek	2006
	<i>Stemonitopsis reticulata</i> (H. C. Gilbert) Nann. -Bremek. & Y. Yamam, 1995 = <i>Comatricha reticulata</i> H. C. Gilbert, 1932 = <i>Stemonitis reticulata</i> (H.C.Gilbert) Hertel, 1956	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Stemonitopsis</i> (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek	2006

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Stemonitopsis typhina</i> (F. H. Wigg.) Nann. = <i>Stemonitis typhina</i> F. H. Wigg.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Stemonitidales</i> Familia: <i>Stemonitidaceae</i> Género: <i>Stemonitopsis</i> (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek	2006
	<i>Stereophlebia tuberculata</i> (Berk. & M. A. Curtis) Zmitr. = <i>Basidioradulum tuberculatum</i> (Berk. & M. A. Curtis) Hjortstam = <i>Phlebia albida</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Meruliaceae</i> Género: <i>Stereophlebia</i> Zmitr., 2018	2013 -
	<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr = <i>Cladoderris gausapata</i> (Fr.) Fr. = <i>Haematostereum gausapatum</i> (Fr.) Pouzar	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers. = <i>Auricularia aurantiaca</i> Schumach. = <i>Auricularia aurantiaca</i> var. <i>hirsuta</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schwein.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2013 -
	<i>Stereum ostrea</i> (Blume & T. Nees) Fr. = <i>Stereum fasciatum</i> (Schwein.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2021
	<i>Stereum reflexulum</i> Lloyd	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2013 -
	<i>Stereum rugosum</i> Pers. = <i>Corticium boltonii</i> Fr., 1838 ≡ <i>Gymnoderma rugosum</i> (Pers.) Hoffm. ≡ <i>Haematostereum rugosum</i> (Pers.) Pouzar = <i>Stereofomes stratosus</i> (Berk. & Broome) Rick	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2013 -
	<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schw. ex Fr.) Fr. = <i>Auricularia sanguinolenta</i> (Alb. & Schwein.) Grev. = <i>Haematostereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schwein.) Pouzar	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Stereum subtomentosum</i> Pouzar = <i>Stereum ochroleucum</i> subsp. <i>arcticum</i> Fr. = <i>Stereum ochroleucum</i> var. <i>arcticum</i> (Fr.) Cooke & Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Russulales</i> Familia: <i>Stereaceae</i> Género: <i>Stereum</i> Hill ex Pers., 1794	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Strobilurus stephanocystis</i> (Kühner & Romagn. ex Hora) Singer = <i>Collybia conigena</i> Pers. = <i>Collybia stephanocystis</i> Kühner & Romagn. = <i>Marasmius esculentus</i> subsp. <i>pini</i> Singer = <i>Pseudohiatula esculenta</i> subsp. <i>pini</i> (Sing.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Strobilurus</i> Singer	2013 -
	<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.) Singer = <i>Agaricus stoloniferus</i> Jungh. = <i>Agaricus tenacellus</i> Pers. = <i>Collybia clavus</i> (Schaeff.) = <i>Collybia stolonifera</i> (Jungh.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Strobilurus</i> Singer	2013 -
	<i>Stropharia aeruginosa</i> (Curtis) Quél. = <i>Agaricus acuminatus</i> Scop. = <i>Agaricus aeruginosa</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Stropharia</i> (Fr.) W.Saunders & W.G.Sm., 1870	2013, 2021
	<i>Stropharia inuncta</i> (Fr.) Quél = <i>Agaricus inunctus</i> Fr. = <i>Fungus inunctus</i> (Fr.) Kuntze = <i>Geophila inuncta</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Stropharia</i> (Fr.) W.Saunders & W.G.Sm., 1870	2021,
	<i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch.: Fr.) Quél. = <i>Protostropharia semiglobata</i> (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Protostropharia</i> Redhead, Moncalvo & Vilgalys, 2013, 2021	2013, 2021
	<i>Stropharia squamosa</i> (Pers.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Strophariaceae</i> Género: <i>Leratiomyces</i>	2013,
	<i>Subulicystidium longisporum</i> (Pat.) Parmasto = <i>Aegerita tortuosa</i> Bourdot & Galzin = <i>Aegeritina tortuosa</i> (Bourdot & Galzin) Jülich = <i>Hypochnus euphorbiae</i> Pat. = <i>Hypochnus euphrasiae</i> Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Trechisporales</i> Familia: <i>Hydnodontaceae</i> Género: <i>Subulicystidium</i> Parmasto	2013 -
	<i>Suillellus poikilochromus</i> (Pöder, Cetto & Zuccher.) Blanco-Dios = <i>Boletus poikilochromus</i> Pöder, Cetto & Zuccher. *	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Suillellus</i> Murrill	2013 - 2021
	<i>Suillellus queletii</i> (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi = <i>Boletus queletii</i> Schulzer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Suillellus</i> Murrill	2013 -
	<i>Suillus bellini</i> Inzenga ex Watling	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Suillus bovinus</i> (L. ex Fr.) Roussel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray	2013, 2021
	<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) O. Kuntze.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray	2013, 2021
	<i>Suillus granulatus</i> (L.: Fr.) Kuntze	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray	2013, 2021
	<i>Suillus luteus</i> (L. ex Fr.) Roussel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray	2013, 2021
	<i>Suillus mediterraneensis</i> (Jacquet. & Blum) Redeuilh.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray	2013, 2021
	<i>Suillus variegatus</i> (Sw.) Richon & Roze = <i>Boletopsis squalida</i> (Fr.) Beck = <i>Boletus aureus</i> Schaeff. = <i>Boletus guttatus</i> Pers. = <i>Boletus squalidus</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Suillaceae</i> Género: <i>Suillus</i> Gray	2022
	<i>Szczepkamyces campestris</i> (Quél.) Zmitr. = <i>Dichomitus campestris</i> (Quél.) Domański & Orlicz	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Szczepkamyces</i>	2013, 2021
T			
	<i>Tapinella panuoides</i> (Fr.) E. J. Gilbert = <i>Agaricus acheruntius</i> Humb. = <i>Agaricus atrotomentosus</i> var. <i>panuoides</i> (Fr.) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Tapinellaceae</i> Género: <i>Tapinella</i> E. J. Gilbert	2021
	<i>Tarzetta catinus</i> (Holmsk.) Korf & J. K. Rogers = <i>Acetabula albida</i> (Gillet) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Tarzetta</i> (Cooke) Lambotte	2013, 2021
	<i>Tarzetta cupularis</i> (L.) Lambotte	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Tarzetta</i> (Cooke) Lambotte	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tephrocye anthracophila</i> (Lasch) P.D.Orton = <i>Agaricus anthracophilus</i> Lasch = <i>Collybia anthracophila</i> (Lasch) P.Kumm. = <i>Collybia carbonaria</i> (Velen.) P.D.Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Tephrocye</i> Donk, 1962	2013 -
	<i>Tephrocye atrata</i> (Fr.) Donk ≡ <i>Agaricus atratus</i> Fr. = <i>Agaricus atratus</i> L. = <i>Collybia atrata</i> (Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Lyophyllaceae</i> Género: <i>Tephrocye</i> Donk, 1962	2021
	<i>Terana caerulea</i> (Lam.) Kuntze = <i>Athelia caerulea</i> (Lam.) Chevall., 1826 ≡ <i>Byssus caerulea</i> Lam. = <i>Pulcherricium caeruleum</i> (Lam.) Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Phanerochaetaceae</i> Género: <i>Terana</i> Adans.	2013, 2021
	<i>Terfezia albida</i> Ant. Rodr., Muñoz-Mohedano & Bordallo	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Terfezia</i> (Tul. & C.Tul.) Tul. & C.Tul.	2021,
	<i>Terfezia arenaria</i> (Moris) Trappe = <i>Choiromyces arenarius</i> (Moris) Quél. = <i>Rhizopogon leonis</i> (Tul. & C.Tul.) Payer = <i>Terfezia goffartii</i> Chatin = <i>Terfezia leonis</i> (Tul. & C.Tul.) Tul. & C.Tul.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Terfezia</i> (Tul. & C.Tul.) Tul. & C.Tul.	2013 -
	<i>Terfezia claveryi</i> Chatin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Terfezia</i> (Tul. & C.Tul.) Tul. & C.Tul.	2021,
	<i>Terfezia leptoderma</i> (Tul. & C.Tul.) Tul. & C.Tul. = <i>Choiromyces leptodermus</i> (Tul. & C.Tul.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pezizaceae</i> Género: <i>Terfezia</i> (Tul. & C.Tul.) Tul. & C.Tul.	2013 -
	<i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Pers. = <i>Thelephora caryophyllea</i> (Schaeff.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.	2013, 2021
	<i>Thelephora terrestris</i> Ehrh. = <i>Coniophora eradians</i> (Fr.) Fr. = <i>Hyphoderma terrestre</i> (Ehrh.) Wallr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Thelephora</i> Ehrh. ex Willd.	2013, 2021
	<i>Tomentella badia</i> (Link) Stalpers = <i>Alytosporium badium</i> (Link) Steud. = <i>Thelephora floridana</i> Ellis & Everh. = <i>Tomentella atrovioleacea</i> Litsch. = <i>Tomentella fimbriata</i> M.P.Christ.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tomentella bryophila</i> (Pers.) M.J.Larsen = <i>Botrytis bryophila</i> (Pers.) Sacc. = <i>Hypochnus obscuratus</i> P.Karst. = <i>Hypochnus pallidofulvus</i> (Peck) Burt = <i>Sporotrichum bryophilum</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2013 -
	<i>Tomentella lapida</i> (Pers.) Stalpers = <i>Acladium ramosissimum</i> (Berk. & M.A.Curtis) M.B.Ellis = <i>Coriolus violaceofuscus</i> (Sacc.) Pat. = <i>Hypochnus fuliginus</i> Burt = <i>Hypochnus spinifer</i> Burt, 1916	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2013 -
	<i>Tomentella lapida</i> (Pers.) Stalpers = <i>Tomentella violaceofusca</i> (Sacc.) M.J.Larsen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2013 -
	<i>Tomentella lateritia</i> Pat. = <i>Hypochnus lateritius</i> (Pat.) Sacc. & P.Syd. = <i>Thelephora lateritia</i> (Pat.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2013 -
	<i>Tomentella lilacinogrisea</i> Wakef. = <i>Tomentella neobourdotii</i> M.J.Larsen	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2013 -
	<i>Tomentella subclavigera</i> Litsch. = <i>Tomentella bohémica</i> Svrček	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2013 -
	<i>Tomentella terrestris</i> (Berk. & Broome) M. J. Larsen = <i>Tomentella badiofusca</i> Bourdot & Galzin = <i>Tomentella porulosa</i> f. <i>lutricolor</i> Bourdot & Galzin, 1924	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Thelephorales</i> Familia: <i>Thelephoraceae</i> Género: <i>Tomentella</i> Pers. ex Pat.	2021
	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Pilát = <i>Boletus wulfenii</i> Humb., 1793 = <i>Coriolus hirsutus</i> (Wulfen) Quél., 1886	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trametes</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Trametes multicolor</i> (Schaeff.) Jül.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trametes</i> Fr., 1836	2021
	<i>Trametes ochracea</i> (Pers.) Gilb. & Ryvarden = <i>Agaricus multicolor</i> (Schaeff.) E.H.L.Krause = <i>Bjerkandera zonata</i> (Nees) P.Karst. = <i>Boletus multicolor</i> Schaeff. = <i>Boletus ochraceus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trametes</i> Fr., 1836	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Trametes pubescens</i> (Schum. ex Fr.) Pilát.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trametes</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Trametes trogii</i> Berk. = <i>Funalia trogii</i> (Berk.) Bondartsev & Singer = <i>Tricholoma trogii</i> Berk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trametes</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Pilát = <i>Boletus atrofusculus</i> Schaeff., 1774 = <i>Boletus cyaneus</i> Pers., 1794 = <i>Cellularia cyathiformis</i> Bull., 1788 = <i>Coriolus hirsutulus</i> (Schwein.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trametes</i> Fr., 1836	2013, 2021
	<i>Trechispora alnicola</i> (Bourdot & Galzin) Liberta = <i>Cristella alnicola</i> (Bourdot & Galzin) Donk ≡ <i>Grandinia alnicola</i> Bourdot & Galzin = <i>Phlebiella alnicola</i> (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Trechisporales</i> Familia: <i>Hydnodontaceae</i> Género: <i>Trechispora</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Trechispora cohaerens</i> (Schwein.) Jülich & Stalpers = <i>Corticium byssinum</i> var. <i>microsporum</i> Bres. = <i>Corticium microsporum</i> (Bres.) Herter = <i>Cristella submicrospora</i> (Litsch.) M.P.Christ. ≡ <i>Sporotrichum cohaerens</i> Schwein.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Trechisporales</i> Familia: <i>Hydnodontaceae</i> Género: <i>Trechispora</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Trechispora farinacea</i> (Pers.) Liberta = <i>Acia farinacea</i> (Pers.) P.Karst. = <i>Corticium sphaerosporum</i> Maire = <i>Cristella farinacea</i> (Pers.) Donk = <i>Grandinia stimulispora</i> Cejp	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Trechisporales</i> Familia: <i>Hydnodontaceae</i> Género: <i>Trechispora</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Trechispora invisitata</i> (H.S.Jacks.) Liberta ≡ <i>Corticium invisitatum</i> H.S.Jacks. ≡ <i>Cristella invisitata</i> (H.S.Jacks.) Donk	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Trechisporales</i> Familia: <i>Hydnodontaceae</i> Género: <i>Trechispora</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Trechispora microspora</i> (P.Karst.) Liberta ≡ <i>Athelia microspora</i> (P.Karst.) Gilb. ≡ <i>Cristella microspora</i> (P.Karst.) Parmasto ≡ <i>Grandinia microspora</i> P.Karst. ≡ <i>Phlebiella microspora</i> (P.Karst.) Bondartsev & Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Trechisporales</i> Familia: <i>Hydnodontaceae</i> Género: <i>Trechispora</i> P.Karst.	2013 -
	<i>Tremella aurantia</i> Weinm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Tremella</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Tremella dactylobasidia</i> J.C.Zamora	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Tremella</i> Linnaeus, 1753	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tremella encephala</i> Willd. = <i>Dacrymyces fragiformis</i> (Pers.) Nees	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Tremella</i> Linnaeus, 1753	2021
	<i>Tremella fimbriata</i> Pers ex, Pers. = <i>Phaeotremella foliacea</i> (Pers.) Wedin, J. C. Zamora & Millanes = <i>Tremella foliacea</i> (Pers. ex S. f. Gray) Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Phaeotremella</i> Rea	2013, 2021
	<i>Tremella indecorata</i> Sommerf. ≡ <i>Exidia indecorata</i> (Sommerf.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Tremella</i> Linnaeus, 1753	2013 -
	<i>Tremella mesenterica</i> Retz. = <i>Helvella mesenterica</i> Schaeff. = <i>Hormomyces aurantiacus</i> Bonord. = <i>Oncomyces mesentericus</i> (Retz.) Klotzsch	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Tremellomycetes</i> Orden: <i>Tremellales</i> Familia: <i>Tremellaceae</i> Género: <i>Tremella</i> Linnaeus, 1753	2013, 2021
	<i>Tremiscus helvelloides</i> (DcPers.) Donk = <i>Guepinia helvelloides</i> (DC.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Auriculariales</i> Familia: <i>Incertae sedis</i> Género: <i>Guepinia</i>	2013, 2021
	<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. ex J. F. Gmel.) Ryvarden = <i>Agaricus parasiticus</i> E. H. L. Krause, 1932 = <i>Bjerkandera abietina</i> (Pers. ex J. F. Gmel.) P. Karst. = <i>Hirschioporus abietinus</i> (Dickson: Fr.) Pilát	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trichaptum</i>	2013, 2021
	<i>Trichaptum biforme</i> (Fr.) Ryvarden = <i>Bjerkandera biformis</i> (Fr.) P. Karst. = <i>Coriolus biformis</i> (Fr.) Pat. = <i>Coriolus elongatus</i> (Berk.) Pat.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trichaptum</i>	2013, 2021
	<i>Trichaptum bulbocystidiatum</i> Ryvarden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trichaptum</i>	2013 -
	<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb.) Ryvarden = <i>Acia hollii</i> (J. C. Schmidt) P. Karst. = <i>Agaricus decipiens</i> Willd. = <i>Boletus decipiens</i> J. F. Gmel. = <i>Tricholonopsis rutilans</i> (Schaeff. ex Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Polyporaceae</i> Género: <i>Trichaptum</i>	2013, 2021
	<i>Tricharina gilva</i> (Boud. ex Cooke) Eckblad = <i>Ascorhizoctonia gilva</i> Chin S. Yang & Korf = <i>Ciliaria lapidaria</i> (Cooke ex W. Phillips) Boud.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Tricharina</i> Eckblad	2013, 2021
	<i>Trichia botrytis</i> (J. F. Gmel.) Pers 1794 = <i>Stemonitis botrytis</i> Pers.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Trichia</i> Haller, 1768	2006

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Trichia contorta</i> G.H.Otth	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Trichia</i> Haller, 1768	2013 -
	<i>Trichia decipiens</i> (Pers.) T.Macbr., 1899 = <i>Arcyria decipiens</i> Pers., 1795 = <i>Lycoperdon pusillum</i> Hedw., 1780 = <i>Trichia cerina</i> Ditmar, 1814 = <i>Trichia decipiens</i> var. <i>decipiens</i> (Pers.) T. Macbc.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Trichia</i> Haller, 1768	2006
	<i>Trichia flavicoma</i> (Lister) Ing, 1967 = <i>Trichia botrytis</i> subsp. <i>flavicoma</i> A.Lister = <i>Trichia botrytis</i> var. <i>flavicoma</i> Lister, 1894 = <i>Trichia munda</i> f. <i>fusca</i> Meyl., 1931	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Trichia</i> Haller, 1768	2013 -
	<i>Trichia lutescens</i> (Lister) , 1897 = <i>Trichia contorta</i> var. <i>lutescens</i> Lister	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Trichia</i> Haller, 1768	2006
	<i>Trichia varia</i> (Pers.) Pers., 1794 = <i>Stemonitis varia</i> Pers.	Reino: <i>Protozoa</i> Filo: <i>Mycetozoa</i> Clase: <i>Myxomycetes</i> Orden: <i>Trichiales</i> Familia: <i>Trichiaceae</i> Género: <i>Trichia</i> Haller, 1768	2006
	<i>Trichoglossum hirsutum</i> (Pers.) Boud. = <i>Geoglossum americanum</i> (Cooke) Sacc. = <i>Geoglossum capitatum</i> Lloyd = <i>Geoglossum hirsutum</i> Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Geoglossomycetes</i> Orden: <i>Geoglossales</i> Familia: <i>Geoglossaceae</i> Género: <i>Trichoglossum</i> Boud., 1885	2013 -
	<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull.) Vent.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.) P. Kumm. = <i>Agaricus albobrunneus</i> Pers. = <i>Agaricus albobrunneus</i> f. <i>glutinosus</i> Fr. = <i>Agaricus albobrunneus</i> var. <i>dispar</i> Pers	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma atosquamosum</i> Cheval = <i>Agaricus atosquamosum</i> (Chev.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Tricholoma atosquamosum</i> Sacc. = <i>Tricholoma atosquamosum</i> var. <i>squarrulosum</i> (Bres.) Mort.Chr. & Noordel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma auratum</i> (Fr.) Guillet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tricholoma basirubens</i> (Bon) A.Riva & Bon = <i>Tricholoma orirubens</i> var. <i>basirubens</i> Bon	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Tricholoma batschii</i> Gulden = <i>Tricholoma subnnulatum</i> (Batsch) Bres. = <i>Tricholoma fracticum</i> (Britz.) Kreisel	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Tricholoma bufonium</i> (Pers.) Gillet = <i>Agaricus bufonius</i> Pers. = <i>Gyrophila bufonia</i> (Pers.) Quél. = <i>Gyrophila sulfurea</i> var. <i>bufonia</i> (Pers.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma cedretorum</i> (Bon) A. Riva.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almf.) Jacob. = <i>Tricholoma cingulatum</i> var. <i>alboflavescens</i> Bidaud & Thévenard (*)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.) P.Kumm. = <i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013 -
	<i>Tricholoma equestre</i> (L. ex Fr.) Quélet. = <i>Tricholoma flavovirens</i> (Pers.: Fr.) Lundell.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma fracticum</i> (Britzelm.) Kreisel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma gausapatum</i> (Fr.) Quél. = <i>Agaricus gausapatus</i> Fr. = <i>Agaricus opicus</i> subsp. <i>gausapatus</i> (Fr.) Pers. = <i>Cortinellus gausapatus</i> (Fr.) P. Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. ex Fr.) Kummer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma myomyces</i> (Pers.: Fr.) J. E. Lang = <i>Tricholoma terreum</i> (Schaeff.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Tricholoma populinum</i> J. E. Lange = <i>Agaricus stans</i> f. <i>campestris</i> Fr. = <i>Tricholoma pessundatum</i> f. <i>campestre</i> (Fr.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.) Quél. = <i>Agaricus psammopus</i> Kalchbr. = <i>Gyrophila psammopus</i> (Kalchbr.) Quél. = <i>Tricholoma psammopodum</i> Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.) P.Kumm. = <i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>lavedanum</i> Rolland = <i>Tricholoma saponaceum</i> var. <i>squamosus</i> (Cooke) Rea.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma sciodes</i> (Secret.) Mart. ss. str. Ciennen.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Tricholoma sejunctum</i> (Sowerby ex Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma squarrulosum</i> (Bres.) Kéner & Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma striatum</i> Sacc. = <i>Tricholoma albobrunneum</i> P.P.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma sulphureum</i> (Bull. ex Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaff. ex Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma tridentinum</i> Singer.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma triste</i> (Scop.) Quél. = <i>Agaricus tristis</i> Scop. = <i>Cortinellus tristis</i> (Scop.) P. Karst. = <i>Gyrophila triste</i> (Scop.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2021
	<i>Tricholoma ustale</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma ustaloides</i> Romag.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholoma virgatum</i> (Fr. ex Fr.) Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013, 2021
	<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Schaeff.) Singer = <i>Agaricus albofimbriatus</i> Trog = <i>Agaricus aurantius</i> Batsch = <i>Agaricus rutilans</i> Schaeff.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholomopsis</i> Singer	2013, 2021
	<i>Trichopezizella barbata</i> (Kunze ex Fr.) Raitv. = <i>Dasyscyphus barbatus</i> (Kunze ex Fr.) Massee = <i>Lasiobelonium barbatum</i> (Kunze) Raitv.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Leotiomycetes</i> Orden: <i>Helotiales</i> Familia: <i>Solenopezizaceae</i> Género: <i>Trichopezizella</i> Dennis ex Raitv.	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Trichophaeopsis bicuspis</i> (Boud.) Korf & Erb ≡ <i>Ciliaria bicuspis</i> Boud. ≡ <i>Lachnea bicuspis</i> Boud. = <i>Lachnea eichleri</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Pyronemataceae</i> Género: <i>Trichophaeopsis</i> Korf & Erb	2013 -
	<i>Tsicholoma basirubens</i> (Bon) Riva et, Bon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tricholomataceae</i> Género: <i>Tricholoma</i> (Fr.) Staude	2013,
	<i>Tubaria conspersa</i> (Pers.) Fayod.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tubariaceae</i> Género: <i>Tubaria</i> (W.G.Sm.) Gillet	2013, 2021
	<i>Tubaria dispersa</i> (Pers.) Singer = <i>Agaricus autochthonus</i> Berk. & Broome = <i>Agaricus dispersus</i> L.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tubariaceae</i> Género: <i>Tubaria</i> (W.G.Sm.) Gillet	2013 -
	<i>Tubaria furfuracea</i> (Pers. ex Fr.) Gillet. ≡ <i>Agaricus furfuraceus</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tubariaceae</i> Género: <i>Tubaria</i> (W.G.Sm.) Gillet	2021
	<i>Tubaria hiemalis</i> Romagn. ExBon.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tubariaceae</i> Género: <i>Tubaria</i> (W.G.Sm.) Gillet	2013,
	<i>Tubaria pellucida</i> (Bull.) Sacc., 1887 = <i>Tubaria pellucida</i> (Bull.) Gillet	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tubariaceae</i> Género: <i>Tubaria</i> (W.G.Sm.) Gillet	2013 -
	<i>Tubaria praestans</i> (Romagn.) M.M.Moser ≡ <i>Naucoria praestans</i> Romagn.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tubariaceae</i> Género: <i>Tubaria</i> (W.G.Sm.) Gillet	2013 -
	<i>Tubaria romagnesiana</i> Arnolds	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Tubariaceae</i> Género: <i>Tubaria</i> (W.G.Sm.) Gillet	2013 -
	<i>Tuber aestivum</i> Vittad. = <i>Aschion nigrum</i> Wallr. = <i>Tuber aestivalis</i> = <i>Tuber aestivum</i> var. <i>meridionale</i> G.Chev. & Rioussset	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -
	<i>Tuber canaliculatum</i> Gilkey = <i>Tuber borchii</i> Kauffman	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tuber excavatum</i> Vittad. = <i>Aschion fuscum</i> Wallr. ≡ <i>Rhizopogon excavatus</i> (Vittad.) Rabenh. = <i>Tuber excavatum</i> f. <i>globispora</i> Vaček = <i>Tuber excavatum</i> subsp. <i>lapideum</i> (Mattir.) E.Fisch.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -
	<i>Tuber gennadii</i> (Chatin) Patouillard = <i>Delastreopsis gennadii</i> (Chatin) Reichert = <i>Loculotuber gennadii</i> (Chatin) Trappe, Parlade & I. F. Alvarez ≡ <i>Terfezia gennadii</i> Chatin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2021,
	<i>Tuber melanosporum</i> Vittad. = <i>Tuber melanosporum</i> var. <i>moschatum</i> Ferry & H.Bonnet = <i>Tuber nigrum</i> Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -
	<i>Tuber nitidum</i> Vittad. ≡ <i>Tuber rufum</i> var. <i>nitidum</i> (Vittad.) E.Fischer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -
	<i>Tuber oligospermum</i> (Tul. & C.Tul.) Trappe = <i>Choiromyces leptodermus</i> var. <i>oligospermus</i> (Tul. & C.Tul.) Quél. = <i>Delastreopsis oligosperma</i> (Tul. & C.Tul.) Mattir. = <i>Tuber asa</i> Tul. & C.Tul.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -
	<i>Tuber panniferum</i> Tul. & C.Tul.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -
	<i>Tuber rufum</i> Picco, 1788	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Tuberaceae</i> Género: <i>Tuber</i> P.Micheli ex F.H.Wigg.	2013 -
	<i>Tubulicrinis calothrix</i> (Pat.) Donk ≡ <i>Corticium calothrix</i> Pat. = <i>Peniophora calothrix</i> (Pat.) D.P.Rogers & H.S.Jacks. = <i>Peniophora delectans</i> Overh. = <i>Tubulicrinis pirinus</i> Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Tubulicrinis</i> Donk	2013 -
	<i>Tubulicrinis glebulosus</i> (Fr.) Donk = <i>Corticium glebulosum</i> (Fr.) Bres. = <i>Kneiffia glebulosa</i> (Fr.) Bres. ≡ <i>Peniophora glebulosa</i> (Fr.) Sacc. & P.Syd. = <i>Peniophora glebulosa</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Tubulicrinis</i> Donk	2013 -
	<i>Tubulicrinis sororius</i> (Bourdot & Galzin) Oberw. = <i>Peniophora glebulosa</i> subsp. <i>juniperina</i> Bourdot & Galzin ≡ <i>Peniophora glebulosa</i> subsp. <i>sororia</i> Bourdot & Galzin	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Tubulicrinis</i> Donk	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Tubulicrinis subulatus</i> (Bourdot & Galzin) Donk = <i>Corticium subulatum</i> Bourdot & Galzin = <i>Peniophora erikssonii</i> f. <i>subulata</i> (Bourdot & Galzin) J.Erikss. = <i>Peniophora glebulosa</i> f. <i>subulata</i> (Bourdot & Galzin) J.Erikss.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Hymenochaetaceae</i> Género: <i>Tubulicrinis</i> Donk	2013 -
	<i>Tulasnella violea</i> (Quél.) Bourdot & Galzin = <i>Corticium roseolum</i> P.Karst. = <i>Corticium violeum</i> (Quél.) Costantin & L.M.Dufour = <i>Hypochnus violeus</i> Quél. = <i>Pachysterigma incarnatum</i> Olsen-Sopp	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Cantharellales</i> Familia: <i>Tulasnellaceae</i> Género: <i>Tulasnella</i> J.Schröt.	2013 -
	<i>Tulostoma brumale</i> Pers. = <i>Lycoperdon mammosum</i> P. Micheli = <i>Lycoperdon pediculatum</i> Bull.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Tulostoma</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Tulostoma caespitosum</i> Trab.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Tulostoma</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr. = <i>Tulostoma brumale</i> var. <i>fimbriatum</i> (Fr.) Quél. = <i>Tulostoma campestre</i> Morgan	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Tulostoma</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Tulostoma lloydii</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Tulostoma</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Tulostoma simulans</i> Lloyd = <i>Tulostoma mammosum</i> var. <i>simulans</i> (Lloyd) Sacc. & Trotter	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Tulostoma</i> Pers., 1794	2013 -
	<i>Tulostoma squamosum</i> (J. F. Gmel.) Pers. = <i>Lycoperdon squamosum</i> J. F. Gmel.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Agaricaceae</i> Género: <i>Tulostoma</i> Pers., 1794	2013, 2021
	<i>Typhula juncea</i> (Alb. & Schwein.) P.Karst. = <i>Macrotyphula juncea</i> (Alb. & Schwein.) Berthier	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Typhulaceae</i> Género: <i>Typhula</i> (Pers.) Fr., 1818	2013 -
V			
	<i>Valsa salicina</i> (Pers.) Fr. = <i>Engizostoma salicinum</i> (Pers.) Kuntze = <i>Sphaeria salicina</i> Pers.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Diaporthales</i> Familia: <i>Valsaceae</i> Género: <i>Valsa</i> Fr.	2013 -

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Valsella laschii</i> (Nitschke) Sacc. = <i>Engizostoma laschii</i> (Nitschke) Kuntze ≡ <i>Valsa laschii</i> Nitschke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Diaporthales</i> Familia: <i>Valsaceae</i> Género: <i>Valsella</i> Fuckel	2013 -
	<i>Verpa bohemica</i> (Krombh.) J.Schröt. = <i>Mitrophora bohemica</i> (Krombh.) Gillet = <i>Morchella bispora</i> Sorokīn ≡ <i>Morchella bohemica</i> Krombh. = <i>Morchella gigaspora</i> Cooke	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Verpa</i> Sw.	2013 -
	<i>Verpa conica</i> (O.F.Müll.) Sw. = <i>Helvella relhanii</i> Sowerby = <i>Leotia conica</i> (O.F.Müll.) Pers. = <i>Morchella agaricoides</i> DC. = <i>Morchella verpoides</i> L.Marchand	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Pezizomycetes</i> Orden: <i>Pezizales</i> Familia: <i>Morchellaceae</i> Género: <i>Verpa</i> Sw.	2013 -
	<i>Volvariella bombycina</i> (Schaeff.) Singer = <i>Agaricus denudatus</i> Batsch = <i>Amanita bombycina</i> (Schaeff.) Pers. = <i>Pluteus bombycinus</i> (Schaeff.) Fr. = <i>Volvaria bombycina</i> (Schaeff.) P.Kumm.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvariella</i> Speg., 1898	2013 -
	<i>Volvariella caesiointincta</i> Orton	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvariella</i> Speg., 1898	2013,
	<i>Volvariella hypopithys</i> (Fr.) Shaffer ≡ <i>Agaricus hypopithys</i> Fr. = <i>Agaricus pubescentipes</i> Peck.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvariella</i> Speg., 1898	2013, 2021
	<i>Volvariella volvacea</i> (Bull. ex Fr.) Sing.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvariella</i> Speg., 1898	2021
	<i>Volvopluteus gloiocephalus</i> (DC.) Vizzini, Contu & Justo = <i>Volvariella gloiocephala</i> var. <i>speciosa</i> (Fr.) Bon = <i>Volvariella speciosa</i> (Fr. ex Fr.) Singer. = <i>Volvariella speciosa</i> var. <i>gloiocephala</i> (DC.) Singer	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Pluteaceae</i> Género: <i>Volvopluteus</i> Vizzini, Contu & Justo	2013, 2021
	<i>Vuilleminia alni</i> Boidin, Lanq. & Gilles ≡ <i>Vuilleminia coryli</i> subsp. <i>alni</i> (Boidin, Lanq. & Gilles) Krieglst., 1999 ≡ <i>Vuilleminia coryli</i> var. <i>alni</i> (Boidin, Lanq. & Gilles) Krieglst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Vuilleminia</i> Maire	2013 -
	<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees) Maire = <i>Corticium botrytes</i> (Fr.) Quél. = <i>Corticium carlylei</i> Massee	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Vuilleminia</i> Maire	2013, 2021

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Vuilleminia coryli</i> Boidin, Lanq. & Gilles	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Vuilleminia</i> Maire	2013 -
	<i>Vuilleminia cystidiata</i> Parmasto	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Vuilleminia</i> Maire	2013 -
	<i>Vuilleminia macrospora</i> (Bres.) Hjortstam = <i>Laeticorticium macrosporum</i> (Bres.) J.Erikss. & Ryvarden	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Vuilleminia</i> Maire	2013 -
	<i>Vuilleminia megalospora</i> Bres. = <i>Aleurodiscus megalosporus</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Corticiales</i> Familia: <i>Corticaceae</i> Género: <i>Vuilleminia</i> Maire	2013 -
W			
	<i>Wakefieldia macrospora</i> (Hawker) Hawker ≡ <i>Sclerogaster macrosporus</i> Hawker	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Wakefieldia</i> Corner & Hawker	2013 -
X			
	<i>Xenasma pulverulentum</i> (H.S.Jacks.) Donk = <i>Ceratobasidium striisporum</i> Rick = <i>Corticium pulverulentum</i> Litsch. ≡ <i>Peniophora pulverulenta</i> H.S.Jacks.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Xenasmataceae</i> Género: <i>Xenasma</i> Donk	2013 -
	<i>Xenasmatarella vaga</i> (Fr.) Stalpers = <i>Phlebiella vaga</i> (Fr.) Liberta	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Polyporales</i> Familia: <i>Xenasmataceae</i> Género: <i>Xenasmatarella</i> Oberw.	2013 -
	<i>Xerocomus chrysenteron</i> (Bull.) Quél.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Xerocomellus</i> Šutara	2013, 2021
	<i>Xerocomus ferrugineus</i> (Schaeff.) Bon = <i>Boletus ferrugineus</i> Schaeff. = <i>Xerocomus subtomentosus</i> var. <i>ferrugineus</i> (Schaeff.) Krieglst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Boletus</i> L.	2021
	<i>Xerocomus moravicus</i> (Vaek) Herink.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Aureoboletus</i> Pouzar	2021,

num	ESPE/CIE	taxonomía	año
	<i>Xerocomus subtomentosus</i> (L. ex Fr.) Quélet.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Boletales</i> Familia: <i>Boletaceae</i> Género: <i>Xerocomus</i> Quél., 1887	2013, 2021
	<i>Xeromphalina caudicinalis</i> (Fr.) Kühner & Maire ≡ <i>Marasmius caudicinalis</i> Fr. = <i>Marasmius fulvobulbillosus</i> O.R.Fr. = <i>Omphalia parvibulbosa</i> Kauffman & A.H.Sm. = <i>Omphalia pubescentipes</i> Peck	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Mycenaceae</i> Género: <i>Xeromphalina</i> Kühner & Maire	2013 -
	<i>Xerula pudens</i> (Pers.) Singer = <i>Oudemansiella longipes</i> (Quél.)	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Agaricales</i> Familia: <i>Physalacriaceae</i> Género: <i>Xerula</i> Maire	2013, 2021
	<i>Xylaria carpophila</i> (Pers.) Fr. = <i>Cordyceps carpophila</i> (Pers.) Fr. = <i>Cordylia carpophila</i> (Pers.) Fr. = <i>Hypoxylon carpophilum</i> (Pers.) Link	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Xylariales</i> Familia: <i>Xylariaceae</i> Género: <i>Xylaria</i> Hill ex Schrank, 1789	2021
	<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.) Grev. ≡ <i>Clavaria hypoxylon</i> L. = <i>Cordyceps hypoxylon</i> (L.) Fr.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Ascomycota</i> Clase: <i>Sordariomycetes</i> Orden: <i>Xylariales</i> Familia: <i>Xylariaceae</i> Género: <i>Xylaria</i> Hill ex Schrank, 1789	2013, 2021
	<i>Xylodon bugellensis</i> (Ces.) Hjortstam & Ryvarden = <i>Hyphodontia bugellensis</i> (Ces.) J.Erikss. ≡ <i>Odontia bugellensis</i> Ces. = <i>Odontia cremorina</i> Bres.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Xylodon</i> (Pers.) Gray	2013 -
	<i>Xylodon sambuci</i> (Pers.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin ≡ <i>Hyphodontia sambuci</i> (Pers.) J.Erikss. ≡ <i>Lyomyces sambuci</i> (Pers.) P.Karst.	Reino: <i>Fungi</i> Filo: <i>Basidiomycota</i> Clase: <i>Agaricomycetes</i> Orden: <i>Hymenochaetales</i> Familia: <i>Schizoporaceae</i> Género: <i>Xylodon</i> (Pers.) Gray	2013 -